

**Pharmakologische Wirkung von Adrenalin (Suprarenin)  
und Noradrenalin (Arterenol) auf  
Kreislauf- und Atmungsparameter bei  
Neugeborenen und Frühgeborenen**

Hans Kramer

**1975**







Aus der Kinderklinik der Universität München

Direktor: Professor Dr. med. K. Betke

---

Pharmakologische Wirkung von Adrenalin (Suprarenin) und  
Noradrenalin (Arterenol) auf Kreislauf- und  
Atmungsparameter bei Neugeborenen und Frühgeborenen

Inaugural-Dissertation  
zur Erlangung der Doktorwürde in der gesamten Medizin  
verfaßt und vorgelegt einer Hohen Medizinischen Fakultät  
der Ludwig-Maximilians-Universität zu München



von

Hans Kramer

Walchstadt

München 1975

Gedruckt mit Genehmigung der Medizinischen Fakultät  
der Universität München

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1. Berichterstatter: | Prof. Dr. K. Riegel |
| 2. Berichterstatter: | Prof. Dr. K. Betke  |
| Dekan:               | Prof. Dr. W. Spann  |

Tag der mündlichen Prüfung: 16.12.1975



# INHALTSVERZEICHNIS

|                                                                                                    | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I Einleitung                                                                                       | 1     |
| II Klinischer Zustand der untersuchten Neugeborenen, Untersuchungsbedingungen und Standardtherapie | 3     |
| III Methoden                                                                                       | 6     |
| 1. Katheterisierung der Umbilikalarterien                                                          | 6     |
| 2. Blutdruckmessung                                                                                | 6     |
| 3. Temperaturmessung                                                                               | 6     |
| 4. Herzfrequenzbestimmung                                                                          | 6     |
| 5. Blutgasbestimmung                                                                               | 7     |
| 6. Bestimmung der Atemfunktionsgrößen                                                              | 7     |
| 7. Polarographische Analysen des Atemgases                                                         | 9     |
| 8. Spirometrische Berechnungen                                                                     | 9     |
| 9. Herzminutenvolumen, Schlagvolumen                                                               | 10    |
| 10. Peripherer Widerstand                                                                          | 11    |
| IV Statistik                                                                                       | 12    |
| V Kritik der Methoden                                                                              | 12    |
| VI Untersuchte Pharmaka und deren Applikation                                                      | 13    |
| VII Ergebnisse                                                                                     | 15    |
| 1. Adrenalin                                                                                       | 16    |
| 1.1. Atemparameter                                                                                 | 17    |
| 1.1.1. Atemminutenvolumen                                                                          | 17    |
| 1.1.2. Atemfrequenz                                                                                | 18    |
| 1.1.3. Anatomische alveolare Ventilation                                                           | 20    |
| 1.1.4. Atemzugvolumen                                                                              | 20    |
| 1.1.5. Atemtotraum                                                                                 | 22    |
| 1.1.6. Totraumventilation                                                                          | 22    |
| 1.1.7. Verhältnis Totraum zu Atemzugvolumen                                                        | 22    |
| 1.1.8. Alveolo-arterielle Kohlendioxyddifferenz                                                    | 23    |
| 1.1.9. Physiologische alveolare Ventilation                                                        | 23    |
| 1.1.10. Physiologischer Totraum                                                                    | 25    |
| 1.1.11. Verhältnis physiologischer Totraum zu Atemzugvolumen                                       | 25    |

|                                                                | Seite |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| 1.1.12. Alveolares Atemäquivalent                              | 25    |
| 1.2.      Kreislaufparameter                                   | 26    |
| 1.2.1.    Herzfrequenz                                         | 26    |
| 1.2.2.    Herzminutenvolumen                                   | 26    |
| 1.2.3.    Herzschlagvolumen                                    | 28    |
| 1.2.4.    Mittlerer peripherer Widerstand                      | 28    |
| 1.3.      Stoffwechselformparameter                            | 28    |
| 1.3.1.    Sauerstoffverbrauch                                  | 29    |
| 1.3.2.    Kohlendioxidproduktion                               | 29    |
| 1.3.3.    Respiratorischer Quotient                            | 31    |
| 1.3.4.    Körpertemperatur                                     | 31    |
| 2.        Noradrenalin                                         | 32    |
| 2.1.      Atemparameter                                        | 33    |
| 2.1.1.    Atemminutenvolumen                                   | 33    |
| 2.1.2.    Atemfrequenz                                         | 33    |
| 2.1.3.    Anatomische alveolare Ventilation                    | 35    |
| 2.1.4.    Atemzugvolumen                                       | 35    |
| 2.1.5.    Atemtotraum                                          | 36    |
| 2.1.6.    Totraumventilation                                   | 36    |
| 2.1.7.    Verhältnis Totraum zu Atemzugvolumen                 | 38    |
| 2.1.8.    Alveolo-arterielle Kohlendioxiddifferenz             | 38    |
| 2.1.9.    Physiologische alveolare Ventilation                 | 38    |
| 2.1.10.   Physiologischer Totraum                              | 40    |
| 2.1.11.   Verhältnis physiologischer Totraum zu Atemzugvolumen | 50    |
| 2.1.12.   Alveolares Atemäquivalent                            | 40    |
| 2.2.      Kreislaufparameter                                   | 41    |
| 2.2.1.    Herzfrequenz                                         | 41    |
| 2.2.2.    Herzminutenvolumen                                   | 43    |
| 2.2.3.    Herzschlagvolumen                                    | 43    |
| 2.2.4.    Mittlerer peripherer Widerstand                      | 43    |
| 2.3.      Stoffwechselformparameter                            | 43    |
| 2.3.1.    Sauerstoffverbrauch                                  | 44    |
| 2.3.2.    Kohlendioxidproduktion                               | 44    |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 2.3.3. Körpertemperatur         | 46 |
| VIII Diskussion                 | 47 |
| Adrenalin                       | 47 |
| 1. Einfluß auf die Atmung       | 48 |
| 2. Einfluß auf den Kreislauf    | 54 |
| 3. Einfluß auf den Stoffwechsel | 55 |
| Noradrenalin                    | 57 |
| 1. Einfluß auf die Atmung       | 58 |
| 2. Einfluß auf den Kreislauf    | 60 |
| 3. Einfluß auf den Stoffwechsel | 62 |
| IX Zusammenfassung              | 64 |
| X Formelsammlung                | 69 |
| XI Literaturverzeichnis         | 71 |
| XII Anhang                      | 78 |



## I. Einleitung

Bei der Geburt wird der plazentare durch den pulmonalen Gasaustausch ersetzt. Dieser abrupte Wechsel geht nicht immer ohne Schwierigkeiten vonstatten. Entsprechend der Vielfalt der beteiligten Systeme und Funktionen sind zahlreiche Atemstörungen möglich: Aspirationssyndrome, Lungenblutungen, Infektionen, Mißbildungen und das idiopathische Atemnotsyndrom, um nur die Wichtigsten zu nennen.

Die Pathogenese des idiopathischen Atemnotsyndroms wird seit Jahren lebhaft diskutiert. Entscheidend für diese auch 'Membransyndrom' genannte Erkrankung ist die eingeschränkte Alveolarbelüftung und die gestörte Alveolardurchblutung.

Was die postnatale Belüftungsstörung anbetrifft, so scheint diese hauptsächlich durch das Fehlen des "surfactant factors" bedingt zu sein (48). Ein Oberflächenfilm bedeckt die Alveolen der reifen Lunge. Er besteht aus Phospholecitin und Sphingomyelin (8, 15). Durch diesen Film wird die Oberflächenspannung verringert und eine Stabilität der entfalteten Alveolen erreicht. Der 'surfactant factor' wird zwar bereits von der 23. Schwangerschaftswoche an gebildet, sein atemphysiologisch wirksames Mischungsverhältnis erreicht er jedoch erst in der 35. Schwangerschaftswoche. Ein Mangel führt trotz aller kompensatorischer Atemanstrengungen des Neugeborenen zu disseminierten Atelektasen und damit zu fortschreitender Einschränkung der Atemfläche.

Neben der erwähnten Unreife wird die Produktion des Oberflächenfilms auch durch Hypoxie und Acidose beeinträchtigt. Darüberhinaus können Plasmabestandteile (Fibrinogen), die in die Lunge austreten, über Komplexbildung den Film inaktivieren (11).

Derselbe Pathomechanismus, der den Austritt der Plasmabestandteile bewirken kann, scheint für eine weitere Ursache des Atemnotsyndroms, die gestörte Alveolardurchblutung, mitverantwortlich zu sein: Es wird dabei an eine direkte und indirekte Wirkung von Adrenalin und Noradrenalin gedacht.

So meint CHEEK, daß beim Geburtsstreß und der intrauterin-intranatalen Asphyxierung vermehrt Katecholamine freigesetzt werden. Andererseits schließt er nicht aus, daß in Folge eines altersbedingten o-Methyltransferasemangels die Katecholamine nicht oder nur sehr langsam abgebaut werden.

Beides würde jedenfalls die intravasale Gerinnungsstörung über die Vasokonstriktion mit Praestase und Stase, Extravasatbildung und vaskuläre Kongestion mit 'sludge'-Phänomen erklären.

Demgegenüber fanden Stern und Mitarbeiter einen ausgesprochen niedrigen Katecholaminspiegel im Harn bei den Früh- und Neugeborenen. Dies veranlaßte auch IVANHOE und BRAUN (20, 7), den gehäuft bei Frühgeborenen anzutreffenden Hypotonus mit Katecholaminen zu behandeln.

Angesichts der erwähnten Meinungsvielfalt war es Ziel dieser Arbeit, eingehende, reproduzierbare Untersuchungen der Atmung und des Kreislaufs bei Früh- und Neugeborenen anzustellen, die unter Adrenalin- und Noradrenalineinfluß standen.

Die Analyse der Reaktionen und Wirkungsmechanismen sollte dann zu Rückschlüssen auf die Bedeutung der postulierten Pathomechanismen genützt werden und, davon ausgehend, auf eine mögliche therapeutische Verwendbarkeit der Katecholamine eingehen.

## II. Klinischer Zustand der untersuchten Neugeborenen, Untersuchungsbedingungen und Standardtherapie.

Die Kreislauf- und Atemuntersuchungen wurden an 11 Frühgeborenen und 10 reifen Neugeborenen vorgenommen. Die als "Risikokinder" wegen postpartaler Störungen in die Kinderklinik überwiesenen Neugeborenen kamen aus den umliegenden Frauenkliniken.

Ein Teil der Probanden adaptierte sich in klinischer Obhut gut an die neuen Umweltsbedingungen und verhielt sich annähernd wie ein normales Neugeborenen-Kollektiv. Andere entwickelten das Bild des Atemnotsyndroms und mußten mitunter künstlich beatmet werden.

Der daraus ersichtlichen, unterschiedlichen Lebensprognose rechnungstragend, wurden die untersuchten Neugeborenen nach dem 'Discriminant-Score' von RIEGEL und AHNEN (36) in zwei Gruppen aufgeteilt:

Gruppe I : ausreichend adaptierte Neugeborene

Gruppe II: adaptationsgestörte Neugeborene

Dieser 'Score' (Prognoseziffer für die Überlebenswahrscheinlichkeit der Neugeborenen) berücksichtigt die Körpertemperatur bei Klinikaufnahme, das Geburtsgewicht, den arteriellen  $pO_2$  und arteriellen pH-Wert, sowie die Plasma-Kalium-Konzentration.

Die mittleren Punktezahlen der untersuchten Neugeborenen lagen zwischen 4565 und 5462. Die Einteilung der Neugeborenen in Gruppe I und II erfolgte nach dem Gesichtspunkt der Überlebenswahrscheinlichkeit, die bei mehr als 5110 Punkten mit 100%iger Sicherheit angenommen werden kann. Kinder, die über diesem Limit lagen, wurden dem ersten Kollektiv ( $n = 10$ ), die darunter lagen, dem zweiten Kollektiv ( $n = 11$ ) zugeteilt. Die mittlere Punktezahl betrug in Gruppe I 5220 Punkte, in Gruppe II 4946 Punkte.

Im Hinblick auf das Gewicht ergab sich bei einer Schwankungsbreite von insgesamt 1400g bis 3600g ein Mittel von 3010g im ersten und 2485g im zweiten Kollektiv.

Erwartungsgemäß war die Mortalität bei den gut adaptierten Neugeborenen null, während in Gruppe II ein Neugeborenes am fünften Lebenstag starb.

Die Entbindungsarten verteilten sich wie folgt:

Spontangeburt: 8 (Gruppe II); 4 (Gruppe I)

Sectio Caesarea: 3 (Gruppe II); 6 (Gruppe I)

Die Häufigkeitsverteilung der Hauptdiagnose ergibt folgendes Bild:

|           | Kongen.<br>Hz.Vitium | Idiop.<br>Atemnots. | Asphyx. | Ikterus<br>gravis | Down<br>Syndr. | Früh-<br>Geb. |
|-----------|----------------------|---------------------|---------|-------------------|----------------|---------------|
| Gruppe I  | 1                    | 1                   | 6       | 1                 | -              | 1             |
| Gruppe II | -                    | 5                   | 1       | 1                 | 2              | 2             |

Weitere klinische Daten sind in den Tabellen 1 a b c, 2 a b c zu finden.

Die Risikoneugeborenen wurden unter standardisierten Bedingungen versorgt. Durch konstante externe Wärmezufuhr im Inkubator wurde eine Rektaltemperatur des Neugeborenen zwischen 36,5° und 37°Celsius einzustellen versucht.

Bei Hypoxämie wurde der Sauerstoffgehalt der Inkubatorluft vorübergehend bis zu maximal 85% erhöht, um einen arteriellen Sauerstoffpartialdruck von 50-90 Torr gewährleisten zu können. blieb trotz dieser Maßnahmen die arterielle O<sub>2</sub>-Spannung längere Zeit hindurch unter 50 mm Hg, so wurde, ähnlich wie bei Apnoeanfällen, Schnappatmung und massiver Dyspnoe, maschinell beatmet.

Im Rahmen der Basistherapie erhielten alle Neugeborenen eine Dauertropfinfusion; bei gut adaptierten Neugeborenen wurde zusätzlich nach 12 Stunden, beginnend mit 5%iger Glucose, eine Umstellung auf enterale Ernährung angestrebt. Die schlecht adaptierten Neugeborenen wurden während der ersten drei Lebenstage vorwiegend nur parenteral ernährt (150ml/kg/die 5% Glucoselösung, 90 mg/kg/die Calcium, 2g/kg/die Humanalbumin und je nach Bedarf Elektrolyte).

Wurde anhand der kutanen und arteriellen Blutproben eine Acidämie (pH unter 7,2) festgestellt, so wurde, um den Soll-

wert von 7,3 - 7,5 zu erreichen, Bikarbonat bzw. Tromethamol zum Ausgleich des Basendefizites infundiert (37).

### III. Methoden

#### 1. Katheterisierung der Umbilikalarterien.

Indiziert durch die Notwendigkeit der Intensivüberwachung und -therapie wurde, wenn möglich, in den ersten drei Lebensstunden ein Pharmaseal-Mikrokatheter in eine der beiden Nabelarterien vorgeschoben<sup>\*)</sup>. Das Einführen des Katheters erfolgte stets unter sterilen Bedingungen und unter ständiger Perfusion mit 5%iger Glucoselösung bei Zusatz von 1 E Heparin pro ml. Die richtige Lage des Katheters knapp oberhalb der Bifurcatio aortae wurde röntgenologisch gesichert. Der Katheter lag maximal 60 Std. in situ.

#### 2. Blutdruckmessung

- a) Unblutig, durch Messung nach einer indirekten elektrooszillographischen Methode (28).
- b) Blutig über die Nabelkatheter durch Registrierung von arteriellen Druckkurven mittels einer Drucksonde (Hansen-Manometer HB) auf einem EKG-Direktschreiber (Schwarzer). Hierbei wurde der arterielle Mitteldruck mitaufgezeichnet (17, 24).

#### 3. Temperatur

Die rektale Körpertemperatur wurde mit einem Sekundenkontakt-Thermometer gemessen.

#### 4. Herzfrequenz

Zur Kontrolle der Herzfrequenz standen zwei Methoden zur Verfügung: a) Das direkte Ablesen der Herzfrequenz von dem EKG-Monitor (Sirecust BS 1)  
b) Das Auszählen der Pulsation anhand der aufgezeichneten arteriellen Druckkurven.

---

<sup>\*)</sup> Die Katheterisierung wurde von Dr. Schöber durchgeführt.

## 5. Blutgase

Die Blutproben für die Gasanalysen wurden, um die Kinder nicht zu irritieren, über den Aortenkatheter entnommen. Unmittelbar nach Entnahme wurde der pH-Wert, der  $pO_2$ - und der  $pCO_2$ -Wert im IL-Microgasanalyser 113 (Instrumentation Lab., Bosten) bei 37°C gemessen. Vor jeder Blutgasanalyse wurde das Gerät mit Gasen bekannter Zusammensetzung (Wösthoff Gasmischpumpen) bzw. mit Standardpuffern geeicht. Die gemessenen Daten wurden mit Gas/Blut-Eichfaktoren korrigiert und mittels der Temperaturfaktoren (38, 43) auf die rektal gemessene Körpertemperatur umgerechnet. Zudem wurden die Werte auf den zur Zeit der Messung herrschenden Barometerdruck bezogen (BTPS-Bedingungen nach SEVERINGHAUS).

## 6. Methodik zur Bestimmung der Atemfunktionsgrößen

Die spirometrischen Untersuchungen wurden im 'offenen System' durchgeführt. Dabei machte man sich beim Sammeln der Atemgase über die Nase zunutze, daß das Neugeborene während der ersten 6 Wochen ausschließlich ein "Nasematmer" ist.

Die Technik des Gassammelns wird von NELSON et al. (31) eingehend beschrieben. Die Expirationsluft gelangt über ein modifiziertes RAHN'sches Ventil (Abb. 1 u. 2) in einen volumengeeichten Sammelspirometer (34, 16). Zusätzlich konnte mit dem von uns benützten Ventil, wie aus der Abbildung hervorgeht, der expiratorische Anteil des Ausatemgases, Alveolarluft, gesammelt werden. Volumenänderungen des Spirometers wurden auf einer Skala (mm) abgelesen. 10-15% des Atemzeitvolumens gingen durch Klappenschluß verloren. Dieser Anteil wurde vor jeder Untersuchung neu ermittelt und als Ventiltfaktor bei der Berechnung des Atemzeitvolumens berücksichtigt. Der Totraum des Ventils betrug 1 ml. Der durch die Ventilkappen hinzukommende Atemwegswiderstand betrug 1mm  $H_2O$  pro 10 ml Luft x sec.



Abb. 1: Modifiziertes Rahnsches Ventil. Ventilklappen links in Einatemstellung, rechts in Ausatemstellung.



Abb. 2: Sammlung der Expirationsluft und der Alveolarluft mit Hilfe eines Rahnschen Ventils. (Vgl. Text).

Untersuchungsgang: Um durch das Einführen der Ventilansatzstücke in die Nasenlöcher die Neugeborenen nicht zu irritieren, wurde die Schleimhaut des antrum nasi mit Xylocainsalbe<sup>R</sup> lokal anästhesiert. Vor Beginn der Sammlung spülten wir den Totraum des spirometrischen Systems dreimal mit Expirationsluft. Atmeten die Kinder mit eingeführtem Ventil über eine gewisse Beobachtungszeit hinaus ruhig und gleichmäßig, so wurde über einen Zeitraum von zwei Minuten Expirationsluft und fraktioniert Alveolarluft gesammelt.

Gleichzeitig wurde die Atemfrequenz über die Bewegungen des Gummibalges im Ventil bzw. über Thoraximpedanceschreibung (Air-Shields Apnea Monitor) registriert. Die Atemgas-sammlung wurde unterbrochen, sobald das Neugeborene Unruhe zeigte.

#### 7. Polarographische Analysen des Atemgases

Im Anschluß an die Sammlung überführte man die Inspirations-, Expirations- und Alveolarluft-Proben mit Ganzglasspritzen, deren Kolben mit Öl abgedichtet waren, in die Meßkammer des IL-Gasanalyzers. Es wurde gemessen: Inspiratorischer  $pO_2$

Expiratorischer  $pO_2, pCO_2$

Alveolärer  $pO_2$  und  $pCO_2$

Der mittlere Fehler bei Doppelbestimmungen betrug für den  $pCO_2$  und für den  $pO_2$ -Wert unter 100 Torr  $\pm 0,7$  Torr.

Für  $pO_2$ -Werte über 200 Torr betrug er  $\pm 5$  Torr.

#### 8. Spirometrische Berechnungen

Mit den aus Atemgasanalyse, Atemvolumenmessung und Atemfrequenzzählung ermittelten Daten lassen sich folgende Parameter berechnen: Atemminutenvolumen, Atemzugvolumen, Alveolare Ventilation, Atemtotraum, Sauerstoffverbrauch, Kohlendioxydproduktion und respiratorischer Quotient. (Die zur Berechnung notwendigen Formeln sind Seite 69, im Anhang, zusammengestellt).

Alle statistischen und dynamischen Atemfunktionsgrößen wur-

den auf BTPS-Bedingungen umgerechnet: Gasvolumen bei Körpertemperatur, herrschendem Barometerdruck und vollständiger Wasserdampfsättigung (43).

## 9. Bestimmung von Herzminutenvolumen und Schlagvolumen

### a) Herzminutenvolumen:

Nach dem FICK'schen Prinzip (14) benötigt man zur Herzminutenvolumenbestimmung die Sauerstoffaufnahme  $\dot{V}O_2$  pro Minute und die arteriovenöse Sauerstoffdifferenz ( $AVDO_2$ ). Es wurde bei Neugeborenen ermittelt, bei denen gleichzeitig Atem- und Kreislaufuntersuchungen durchgeführt werden konnten.

$$\dot{Q} = \frac{\dot{V}O_2}{AVDO_2} \quad (\text{ml/kg} \times \text{min})$$

Die arteriovenöse Sauerstoffdifferenz konnte von uns nicht eigens gemessen werden. Nach BARTELS et al. (5) wurde angenommen, daß die  $AVDO_2$  eine altersunabhängige Konstante sei. Sie hängt allerdings von der arteriellen  $O_2$ -Sättigung ab. Diese ermittelten wir, indem der aktuelle  $pO_2$ -Wert bei  $37^\circ\text{C}$  mit dem Bohr-Faktor auf pH 7,40 umgerechnet wurde. Anhand dieses korrigierten  $pO_2$ -Wertes konnte die Sauerstoffsättigung an der Standard- $O_2$ -Dissoziationskurve für Neugeborenenblut abgelesen werden (6, 35).

Mittels der arteriellen  $O_2$ -Sättigung wurde bei unseren Neugeborenen die  $AVDO_2$  auf der von LINDERKAMP und SCHÖBER angegebenen Regressionsgeraden ( $AVDO_2$  gegen arterielle  $O_2$ -Sättigung aufgetragen) abgelesen und für die Berechnung des Herzminutenvolumens benützt.

### b) Herzschlagvolumen

Das Schlagvolumen entspricht dem Quotienten aus Herzzeitvolumen und Herzfrequenz:

$$SV = \frac{\dot{Q}}{f} \quad (\text{ml/kg})$$

# 10. Peripherer Gesamtwiderstand

Sind der mittlere Aortendruck<sup>\*)</sup> und das Herzzeitvolumen bekannt, so läßt sich der periphere Gesamtwiderstand berechnen (49). Der Druck im rechten Vorhof wurde vernachlässigt.

$$\text{TPR} = \frac{80000 \cdot P_m \text{ (mmHg)}}{\dot{Q} \text{ (ml/min/kg)}} \quad (\text{dyn} \cdot \text{sec} \cdot \text{kg} \cdot \text{cm}^{-5})$$

Der Faktor 80000 ergibt sich aus der Umrechnung von mmHg · min · kg · ml<sup>-1</sup> auf dyn · sec · kg · cm<sup>-5</sup>.

---

\*) Die 'Druckmessungen' wurden in Zusammenarbeit mit Dr. Schöber vorgenommen (51, 26)

#### IV. Statistik

Aus den Einzeldaten eines Kollektivs errechneten wir den Mittelwert  $\bar{x}$ , die mittlere Streuung der Einzelwerte  $s\bar{x}_i$  und die mittlere Streuung des Mittelwertes  $s\bar{x}$ .

Die Prüfung, ob sich zwei Mittelwerte signifikant unterscheiden, erfolgte nach dem STUDENT-Test. Die Signifikanzprüfung von Paardifferenzen erfolgte nach WILCOXON (50). Sämtlichen statistischen Berechnungen wurden die wissenschaftlichen Tabellen von GEIGY (7. Aufl. 1968) und das Statistikbuch von SACHS (1969) zugrunde gelegt (40).

#### V. Kritik der Methoden

Da in unsere Berechnungen Konstanten eingesetzt wurden, die im Einzelfall nicht überprüft werden konnten, lassen sich gewisse Fehler nicht ausschließen. Andererseits liegen bei der Bestimmung einzelner Parameter im Meßverfahren Fehlermöglichkeiten.

##### 1) $AVDO_2$

Unseren Berechnungen liegen Näherungswerte der  $AVDO_2$  zugrunde. Da beim Neugeborenen die fetalen Blutwege noch offen sein können, werden für die  $AVDO_2$ -Bestimmung mehrere gleichzeitige Blutentnahmen nötig: Aus der vena cava superior, der vena cava inferior, dem rechten Vorhof, der rechten Herzkammer, der arteria pulmonalis und der arteria radialis. Dies aber war den Kindern nicht zuzumuten.

Unsere Ergebnisse weichen im Einzelfall bis zu 25%, bei gemittelten Werten bis 12% von den tatsächlichen Verhältnissen ab (42). Der aufgezeigte Fehler betrifft auch sämtliche Größen, bei deren Berechnung die  $AVDO_2$  mit eingeht: Herzzeitvolumen, Schlagvolumen und peripherer Widerstand.

##### 2) Alveolarer $pCO_2$

Um die alveolare  $CO_2$ -Spannung bestimmen zu können, muß man reine Alveolarluft gewinnen. Dies gelingt bei ruhiger, lang-

samer Atmung, da die Alveolarluft trotz nicht zu gewährleistender laminarer Störung relativ unvermischt als "end-tidalgas" zur Nase gelangt.

Bei hochfrequenter Atmung ( $f \geq 70$ ), wie dies bei Kindern mit Atemnotsyndrom häufig der Fall ist, kommt es leichter zu Turbulenzen: die Alveolarluft vermischt sich mit der Totraumluft, bevor sie die Nase verläßt. Es besteht dann die Gefahr, daß zu niedrige alveolare  $p\text{CO}_2$ -Werte gemessen werden, da man den  $p\text{CO}_2$  von "Mischluft" bestimmt. Daraus errechnet sich eine zu große alveolare Ventilation, ein zu niedriger anatomischer Totraum und ein zu kleiner Quotient  $V_D/V_T$ .

3) Einflüsse des RAHN'schen Ventils auf die Ventilation  
Durch Vorsetzen des RAHN'schen Ventils (34) vor die Atemwege wird der anatomische Totraum um einen ml/Atemzug vergrößert. Außerdem erhöhen die Ventilklappen den Atemwiderstand um 1 mm  $\text{H}_2\text{O}/10$  ml Luft. Beide Faktoren bedingen eine Hyperventilation der Neugeborenen, sodaß die Werte des von uns bestimmten Atemzugvolumens, Atemminutenvolumens und der Atemfrequenz etwas zu hoch liegen dürften.

#### 4) Herzzeitvolumen

Wie Untersuchungen (2, 39, 47) zeigten, befinden sich bei normalen Neugeborenen am ersten Lebenstag der 'große' und der 'kleine' Kreislauf noch teils parallel geschaltet. Bei adaptionsgestörten Neugeborenen lassen sich bidirektionale Kurzschlüsse für Tage und Wochen noch nachweisen (44, 39). Beide Tatsachen machen es verständlich, daß das von uns bestimmte Herzzeitvolumen nur als Näherungswert zu betrachten ist, welcher im wesentlichen das Aortenzeitvolumen ohne den Links-Rechts-Kurzschluß beinhaltet.

### VI. Untersuchte Pharmaka und deren Applikation

Adrenalin und Noradrenalin sind körpereigene Hormone. In Stress- und Notsituationen vermehrt sezerniert, gehören sie

zur Standard-Therapie bei Kreislaufstillstand und anaphylaktischen Schockzuständen. Demzufolge handelte es sich hier nicht um ein "Menschenexperiment" mit unbekannten Substanzen, sondern um eine andernorts übliche und bewährte Therapie, von der man lediglich bisher nicht wußte, in welcher Art sie bei Neugeborenen die wichtigsten vitalen Funktionsgrößen beeinflusst.

a) Adrenalin-HCL ( $C_9 H_{13} O_3 N - HCl$ )

Dieses Pharmakon<sup>\*)</sup> wurde mit 5%iger Glukoselösung verdünnt und mit Hilfe einer Infusionspumpe (Perfusor B. BRAUN-MEL-SUNGEN) intraaortal oder intravenös infundiert. Durch Änderungen der Infusionsgeschwindigkeit wurde die Dosis variiert zwischen 0,05 - 0,1 - 0,2 Mikrogramm/kg/min. Die Infusionsrate der verdünnten Lösung betrug 3 - 6 - 12 ml/std. Jede Infusionsstufe wurde 15 Minuten beibehalten, sodaß in 45 Minuten pro Kg 5,25 µg Adrenalin zugeführt wurden.

b) Noradrenalin-HCL ( $C_8 H_{11} O_3 N - HCl$ )

Dieses Pharmakon<sup>\*)</sup> wurde wie Adrenalin zusammen mit 5%iger Glukoselösung in einer Infusionsrate von 0,1 - 0,2 - 0,4 µg/kg/min intraaortal oder intravenös infundiert. Die Dauer einer Infusionsrate betrug hier ebenfalls 15 min, sodaß in einer Dreiviertelstunde 10,5 µg Noradrenalin zugeführt wurden (pro Kg Körpergewicht).

In Vorversuchen mußte die Dosis des jeweilig zu applizierenden Pharmakons ermittelt werden. Die Infusion mußte vom Neugeborenen toleriert werden und daneben auch eine pharmakonabhängige Reaktion garantieren. Die nunmehr in unseren Versuchen verwendete geringste wirksame Dosis wurde für Adrenalin in 13, für Noradrenalin in 19 Versuchen ermittelt und erprobt. Der Infusion eines Pharmakons gingen stets mehrstündige Ruhemessungen voraus. In dieser Zeit wurden

---

<sup>\*)</sup> Arterenol<sup>R</sup> und Suprarenin<sup>R</sup> wurden uns freundlicherweise von der Firma Hoechst zur Verfügung gestellt.

außer der Standard-Therapie keine therapeutischen Maßnahmen durchgeführt. Mit der Infusion wurde begonnen, wenn die über eine Stunde gesammelten Ruhewerte ein konstantes Niveau zeigten. Bei 30% der pharmakologischen Untersuchungen traten Störungen auf: Aspiration, Verlegung des Tubus mit Schleim und motorische Unruhe des Neugeborenen<sup>\*)</sup>. Da hier eine Beurteilung der Wirkung des Pharmakons nicht zulässig war, mußten diese Versuche verworfen werden.

## VII. Ergebnisse

Der Vielzahl der Einzelergebnisse wegen und um Wiederholungen auf ein Mindestmaß zu beschränken, erschien es angebracht, Vergleiche mit Literaturunterlagen bereits im Ergebnisteil abzuhandeln. Es wurde versucht, möglichst solche Literaturdaten zum Vergleich heranzuziehen, die mit vergleichbarer Methodik erarbeitet wurden. Jedoch ließen sich nur wenige andere Untersuchungsreihen, mit identischer oder vergleichbarer Methodik durchgeführt, auffinden. Zusätzlich unterschied sich die Basistherapie unserer Neugeborenen von jener anderer Autoren. Die Schwierigkeit des Vergleichs mit anderen, in der Literatur zu findenden Daten wurde von vornherein in Rechnung gestellt. Das war auch der Grund, weshalb wir stets in der eigenen Untersuchungsreihe eine Gruppe gut adaptierter Risikoneugeborener (Gruppe I) einer zweiten Gruppe schlecht adaptierter Neugeborener (Gruppe II) gegenüberstellten. Ein Vergleich der Ergebnisse dieser beiden Gruppen war zulässig, da die Ergebnisse mit derselben Methodik erarbeitet worden waren. Hinsichtlich der Frage, ob die von uns untersuchten Pharmaka beim gut adaptierten Neugeborenen anders wirken, als beim schlecht adaptierten, waren wir ganz auf die eigenen Daten angewiesen. Eine vergleichbare Studie ist bisher nicht durchgeführt wor-

---

<sup>\*)</sup> Sie sind Begleiterscheinungen der Intensivtherapie und nicht Folge der Katecholaminzufuhr.

den. Vorauszuschicken ist noch, daß unsere Messungen auch bei den Neugeborenen der Gruppe II nur in 'kompensiertem' Zustand des Kindes stattfanden.

### 1) Adrenalin

Adrenalin ist ein Hormon, das vom Nebennierenmark und vom übrigen chromaffinen Gewebe des Körpers sezerniert wird. Seine bekannten pharmakologischen Wirkungen betreffen hauptsächlich das kardio-vaskuläre System und den Stoffwechsel.

Nach zusammenfassenden Darstellungen von AVIADO, GOODMAN und GILMAN ergibt sich folgendes Bild (4): Adrenalin erregt sowohl  $\alpha$ - als auch  $\beta$ -Rezeptoren. Stimulationen der  $\alpha$ -Rezeptoren bewirken am Gefäßsystem eine Konstriktion der glatten Muskulatur. Stimulationen der  $\beta$ -Rezeptoren hingegen führen zu einer Dilatation der glatten Muskulatur. In niedriger Adrenalinosis überwiegt im allgemeinen die  $\beta$ -Stimulation, in hoher Dosierung die  $\alpha$ -Stimulation. Erwähnenswert erscheint noch, daß die verschiedenen Stromgebiete sehr unterschiedlich mit  $\alpha$ - und  $\beta$ -Rezeptoren ausgestattet sind. Auf diese Weise führt Adrenalin zu einer sehr uneinheitlichen Beeinflussung des peripheren Widerstandes und damit der Durchblutung in den verschiedenen Organen. In mittlerer Dosis (0,1 bis 0,4  $\mu\text{g/kg/min}$ ) führt Adrenalin beim Erwachsenen zu einer Mehrdurchblutung des Herzens, der Muskulatur, der Leber und des Gehirns. Gedrosselt wird dagegen die Durchblutung der Haut und der Niere; der gesamte periphere Widerstand im großen Kreislauf wird etwas reduziert, der Lungengefäßwiderstand bleibt unverändert oder steigt mäßig an. Das Herzminutenvolumen nimmt zu, ebenso das Herzschlagvolumen. Der systolische Blutdruck steigt, der diastolische fällt. Daraus resultiert ein gleichbleibender oder mäßiger Anstieg des mittleren Blutdrucks. Am Herzen wirkt Adrenalin positiv inotrop und chronotrop. Die zentrale Atemstimulation ist schwach ausgeprägt und setzt zuweilen nach einer kurzen Adrenalinapnoe ein. An der Bronchialmuskulatur bewirkt das Pharmakon eine kräftige

Bronchodilatation. Die Stoffwechselwirkung betrifft vornehmlich den Kohlenhydratstoffwechsel (Glycogenolyse und Hyperglycämie). Auch der Fettstoffwechsel ist mit nachweislichem Anstieg der freien Fettsäuren im Blut beteiligt (25, 19). Der beschriebenen Adrenalinwirkung entsprechend nimmt auch der  $O_2$ -Verbrauch im Mittel um 20-30% zu.

Bei den Neugeborenen hingegen gibt es bisher nur wenige Mitteilungen über die pharmakologische Wirkung von Adrenalin: ADAMS et al. erzielten eine Tachycardie durch Injektion von Adrenalin in den rechten Ventrikel (1). MULLIGAN und SCHWARTZ beobachteten einen Anstieg der Blutglucose nach Adrenalin.

### 1.1. Atemparameter

Entsprechend der Vielfalt der beim pulmonalen Gasaustausch beteiligten Systeme besteht eine enge Verknüpfung der Ventilation der Lunge und deren Durchblutung sowie der Durchblutung des großen Kreilaufes. Änderungen der Lungenbelüftung bedingen Änderungen der Lungendurchblutung und haben weiter Einfluß auf die gesamte Körperdurchblutung. Es bietet sich daher an, vor den Kreislaufparametern die Ventilationsparameter darzustellen.

#### 1.1.1. Atemminutenvolumen $\dot{V}_E$ (Abb. 3)

Die Bestimmung des Atemminutenvolumens erbrachte sowohl bei den besser adaptierten, als auch bei den schlechter adaptierten Neugeborenen signifikante Änderungen. Durch eine viertelstündliche Anhebung der Infusionsgeschwindigkeit wurde die verabreichte Adrenalinosis dreimal erhöht (0,05-0,1-0,2  $\mu\text{g/kg/Körpergewicht/min}$ ). Die Neugeborenen der Gruppe I ( $n = 8$ ) steigerten das Minutenvolumen während der ersten beiden Infusionsperioden um 21% ( $p < 0,05$ ), bzw. 39% ( $p < 0,01$ ). Die dritte Infusionsstufe erbrachte eine weitere Zunahme des Atemminutenvolumens um 63% auf

358 ml/kg/min. Ausgegangen wurde bei diesem Versuch von einem mittleren Ruhewert von 219 ml/kg/min.

Bei den Untersuchungen an schlecht adaptierten Neugeborenen konnte von dem gleichen mittleren Wert ausgegangen werden. Die Steigerung des Atemminutenvolumens erreichte hier, in der mittleren Infusionsphase ( $0,1 \mu\text{g/kg/min}$ ) und während der höchsten Adrenalinosis ( $0,2 \mu\text{g/kg/min}$ ) mit 41% ( $p < 0,01$ ) bzw. 49% ( $p < 0,01$ ) signifikante Werte. Bei Erwachsenen ist unter vergleichbaren Versuchsbedingungen während des Adrenalineinflusses keine derartige Stimulation des Atemminutenvolumens nachweisbar. Bei beiden Gruppen stellte sich der Ausgangswert erst eine halbe Stunde nach Infusionsstop wieder ein.

#### 1.1.2. Atemfrequenz F (Abb. 3)

Während der 45-minütigen, dosisvariierten Adrenalingabe nahm auch die Atemfrequenz erwartungsgemäß bei beiden Gruppen signifikant zu. In der Gruppe I ( $n = 8$ ) erhöhte sich die Frequenz während der ersten ( $0,05 \mu\text{g/kg/min}$ ) und zweiten Infusionsstufe ( $0,1 \mu\text{g/kg/min}$ ) um 4% ( $p < 0,05$ ), bzw. um 16% ( $p < 0,01$ ). Während der dritten Infusionsstufe stieg die Atemfrequenz sogar auf 72 Atemzüge/min, was einer signifikanten Steigerung von 26% entspricht ( $p < 0,01$ ). Bei diesem Versuch war man von einem mittleren Ruhewert von 57 Atemzügen/min ausgegangen.

In Gruppe II ( $n = 8$ ) lag die Ausgangsfrequenz mit 55/min etwas niedriger als beim ersten Kollektiv. Hier vergrößerte sich die Zahl der Atemzüge erst während der zweiten und dritten Infusionsperiode ( $0,1-0,2 \mu\text{g/kg/min}$ ) um 24%, bzw. 29% ( $p < 0,05$ ) auf 71 Atemzüge/min. Nach Absetzen der Adrenalingabe erreichte Gruppe I bereits 15 Minuten später die Ausgangslage, bei Gruppe II dauerte das Einpendeln auf die Ruhewerte etwa doppelt solange.




Abb. 3: Einfluß von Adrenalin auf die Ventilation, in Gruppe I ( ——— ) und Gruppe II ( - - - - - ) - Das Atemminutenvolumen ( $\dot{V}_E$ ), die alveolare Ventilation ( $\dot{V}_A$ ) und die Atemfrequenz (F) nehmen in beiden Gruppen signifikant zu.

### 1.1.3. Anatomische alveolare Ventilation $\dot{V}_A$ (Abb. 3)

Die alveolare Ventilation, die sich aus dem Verhältnis  $\text{CO}_2$ -Produktion zu alveolarem Partialdruck errechnet, umfaßt das Gasvolumen sämtlicher Alveolen, auch solcher, die zwar belüftet, aber nicht durchblutet sind. Entsprechend der bereits erwähnten Parameter war auch hier bei beiden Gruppen eine signifikante Steigerung zu erwarten. Der Ruhewert betrug bei beiden Kollektiven 170 ml/kg/min. Während der fraktionierten Adrenalingabe (0,05-0,1-0,2  $\mu\text{g/kg/min}$ ) verbesserte sich die alveolare Ventilation der weniger adaptionsgestörten Kinder von 16%, bzw. 34%, auf 43% ( $p < 0,01$ ) bei einem 'Atemvolumen' von 250 ml/kg/min. Die zweite Gruppe vergrößerte die alveolare Belüftung um 26% während der ersten (0,05  $\mu\text{g/kg/min}$ ), bzw. um 30% während der zweiten Infusionsperiode (0,1  $\mu\text{g/kg/min}$ ). Die über die letzten 15 Minuten hin applizierte Adrenalin-höchst-dosis (0,2  $\mu\text{g/kg/min}$ ) erbrachte sogar eine Belüftungszunahme von 37% auf 232 ml/kg/min ( $p < 0,01$ ). Bei beiden Kollektiven stellte sich allerdings erst nach einstündiger Ruhe die Ausgangslage wieder ein.

### 1.1.4. Atemzugvolumen $V_T$ (Abb. 4)

Unter Adrenalineinfluß machte sich auch eine Vertiefung der Atmung bemerkbar, eine signifikante Änderung der Werte zeigte sich jedoch erst während der höchsten Infusionsstufe (0,2  $\mu\text{g/kg/min}$ ). Das mittlere, pro Atemzug aufgenommene Volumen steigerte sich bei den Neugeborenen der Gruppe I um 26% ( $p < 0,02$ ) auf 4,98 ml/kg. Der mittlere Ruhewert lag bei dieser Versuchsserie bei 3,95 ml/kg/Atemzug. Bei Gruppe II hingegen steigerte sich das Atemzugvolumen bereits nach 15-minütiger Adrenalininfusion (0,05  $\mu\text{g/kg/min}$ ) signifikant um 29% ( $p < 0,02$ ) auf 5,57 ml/kg. Auf der zweiten und dritten Infusionsstufe (0,1-0,2  $\mu\text{g/kg/min}$ ) fiel das Volumen pro Atemzug etwas ab, um etwas früher als bei der Gruppe I, nach 30 Minuten, in die Ruhelage mit 4,32 ml/kg einzupendeln.




Abb. 4: Einfluß von Adrenalin auf Atemtotraum und Atemzugvolumen. Gruppe I (—), Gruppe II (-----). Unter der Adrenalininfusion nimmt das Atemzugvolumen ( $V_T$ ) in beiden Gruppen, der Atemtotraum ( $V_D$ ) nur in Gruppe I signifikant zu. Die Änderungen des Quotienten  $V_D/V_T$  sind ebenfalls nur in Gruppe I signifikant.

#### 1.1.5. Atemtotraum $\dot{V}_D$ (Abb. 4)

Der Atemtotraum erhöht sich bei Gruppe I nach den bei den ersten Infusionsraten (0,05 - 0,1  $\mu\text{g/kg/min}$ ) um 11% und 13%. Eine signifikante Steigerung, ausgehend von einem mittleren Ruhewert von 1 ml/kg, tritt mit 45% und 1,45 ml pro kg auf Infusionsstufe 3 (0,2  $\mu\text{g/kg/min}$ ) ein ( $p < 0,02$ ). Bei Gruppe II ist nach den ersten 15 Infusionsminuten eine 11%ige und nach weiteren 15 Minuten eine 17%ige, jedoch nicht signifikante Steigerung des Totraums zu verzeichnen. Auf der dritten Stufe war nurmehr eine 9%ige Volumenvergrößerung zu bemerken. Die Ausgangslage von 1,15 ml/kg war nach dreiviertelstündiger Infusionsruhe wieder erreicht.

#### 1.1.6. Totraumventilation $\dot{V}_D$

Bei der Ermittlung der Totraumventilation zeigten sich bei beiden Gruppen signifikante Änderungen. So vergrößerte sich das 'Totraumvolumen' bei Gruppe I ( $n = 8$ ) nach 15-minütiger Infusion (0,05  $\mu\text{g/kg/min}$ ) auf 29%. Nach 30-, bzw. 45-minütiger Adrenalingabe (0,1 - 0,2  $\mu\text{g/kg/min}$ ) stieg die Totraumbelüftung im Mittel ausgehend von 52 ml/kg/min etwa um die Hälfte, bzw. auf das Doppelte ( $p < 0,01$ ) auf 108 ml/kg/min an. Das zweite Kollektiv ging von dem gleichen Ruhewert aus. Zunächst ließ sich hier eine 'Volumensteigerung' von 31% registrieren, die signifikant bei der zweiten Infusionsperiode um 68% ( $p < 0,01$ ) auf 88 ml/kg/min zunahm und dann wieder leicht absank. Der Ruhewert war bei beiden Gruppen nach halbstündiger Infusionspause wieder erreicht.

#### 1.1.7. Verhältnis Totraum zu Atemzugvolumen $V_D/V_T$ (Abb.4)

Das Verhältnis Totraum zu Atemzugsvolumen nahm bei beiden Neugeborenenkollektiven geringfügig zu. Gruppe I ( $n = 8$ ) zeigte während der dreistufigen Adrenalininfusion eine Zunahme des Quotienten um 8%, 9% und 27% ( $p < 0,05$ ). Bei

den schlechter adaptatierten Neugeborenen nahm der Quotient nach den ersten 15 Minuten der Adrenalingabe ( $0,05 \mu\text{g/kg/min}$ ) geringfügig ab, stieg dann aber auf 19, bzw. 11% während der nächsten beiden Infusionsphasen an. Wegen des großen Streubereiches der Werte war keine Signifikanz nachzuweisen.

#### 1.1.8. Alveolo-arterielle $p\text{CO}_2$ -Differenz $\text{AaDCO}_2$ (Abb.5)

Die an einem kleinen Neugeborenenkollektiv ( $n = 7$ ) durchgeführte Bestimmung der alveolo-arteriellen  $p\text{CO}_2$ -Differenz ergab während der dosisvariierten Adrenalininfusion ( $0,05 - 0,1 - 0,2 \mu\text{g/kg/min}$ ) eine 2%ige, 5%ige, bzw. 16%ige Steigerung. Die Änderungen waren nicht signifikant. Die Ruhewerte ( $11,16$  Torr gemittelt) stellten sich 15 Minuten nach Absetzen des Pharmakons wieder ein. Die hohen Ruhewerte, beim normalen, gesunden Neugeborenen werden Normalwerte von 2 bis 4 Torr angegeben (31, 33), zeigen, daß das adaptationsgestörte Neugeborene eine erhöhte alveolo-arterielle  $p\text{CO}_2$ -Differenz hat. Dies ist Ausdruck einer ventilatorischen Verteilungsstörung.

Da für die Bestimmung der nun folgenden Parameter wegen der notwendigen experimentellen Anforderungen, nur ein kleines Neugeborenen-Kollektiv zur Verfügung stand, mußte auf eine Gruppeneinteilung verzichtet werden. Die Untersuchungen wurden nur an Kindern vorgenommen, deren 'discriminant score' 5018 war. Deswegen sind diese Neugeborenen eher als Exponenten der Gruppe I als der Gruppe II zu betrachten.

#### 1.1.9. Physiologische alveolare Ventilation $\dot{V}_A$ phys (Abb. 5)

Neben der anatomischen alveolaren Ventilation untersuchten wir noch die physiologische oder funktionelle alveolare Ventilation. Sie errechnet sich aus dem Verhältnis  $\text{CO}_2$ -Produktion zu arteriellem  $\text{CO}_2$ -Partialdruck.




Abb. 5: Einfluß des Adrenalin auf die alveolo-arterielle  $p\text{CO}_2$ -Differenz ( $Aa\text{DCO}_2$ ) auf das alveolare Atemäquivalent ( $\dot{V}_A \text{ phys}/\dot{V}_{O_2}$ ), auf das Verhältnis physiologischer Totraum zu Atemzugvolumen ( $V_D/V_T$ ), auf den physiologischen Totraum ( $V_D \text{ phys}$ ) und auf die physiologisch alveolare Ventilation ( $\dot{V}_A \text{ phys}$ ) bei Gruppe I.

Die funktionelle alveolare Ventilation erhöhte sich bereits unter geringer Adrenalinapplikation ( $0,05 \mu\text{g/kg/min}$ ) um 12%. Während der zweiten und dritten Infusionsphase ( $0,1 - 0,2 \mu\text{g/kg/min}$ ) nahm das 'Belüftungsvolumen' sogar um 15% bzw. 20% ( $p < 0,05$ ) auf  $183 \text{ ml/kg/min}$  zu. Bereits 25 Minuten nach Beendigung der Adrenalingabe hatten sich bei den Neugeborenen wieder die mittleren Ruhewerte von  $152 \text{ ml/kg/min}$  eingestellt.

#### 1.1.10. Physiologischer Totraum $V_{D\text{phys}}$ (Abb. 5)

Der physiologische Totraum nahm während der dosisvariierten Adrenalininfusion gemessen an dem mittleren Ausgangswert von  $2,05 \text{ ml/kg}$  in der ersten Infusionsphase ( $0,05 \mu\text{g/kg/min}$ ) um 2% zu. Die folgenden beiden Infusionsstufen ( $0,1 - 0,2 \mu\text{g/kg/min}$ ) erbrachten eine weitere 15, bzw. 19%ige Steigerung des 'Totraumes' auf  $2,64 \text{ ml/kg}$ . Die Änderungen liegen aber im Streubereich der Ruhewerte und lassen daher keine Aussage über eine möglich Beeinflussung durch Adrenalin zu. Die Ausgangslage war 30 Minuten nach Infusionsstop wieder erreicht.

#### 1.1.11. Verhältnis: physiologischer Totraum zu Atemzugvolumen $V_{D\text{phys}}/V_T$ (Abb. 5)

Das Verhältnis physiologischer Totraum zu Atemzugvolumen verringerte sich während der ersten 15-minütigen Adrenalingabe ( $0,05 \mu\text{g/kg/min}$ ) geringfügig um 4%, um auf den folgenden beiden Infusionsstufen ( $0,1 - 0,2 \mu\text{g/kg/min}$ ) um 2%, bzw. 7% zuzunehmen. Auch diese Änderungen liegen im Streubereich der Ausgangswerte mit einem Anteil des physiologischen Totraumes an dem Atemzugvolumen von gemittelt 48%.

#### 1.1.12. Alveolares Atemäquivalent $\dot{V}_{A\text{phys}}/\dot{V}_{O_2}$ (Abb.5)

Das alveolare Atemäquivalent soll, als Maß für die Ventilationslage, bei gesunden Neugeborenen zwischen 19 und 20 liegen (5, 31). Unser Ausgangswert von 20,5 deutet

dementsprechend eine leichte Hyperventilation der untersuchten Neugeborenen an. Die 13, 16 bzw. 17%ige Steigerung während der 45-minütigen, fraktionierten Adrenalininfusion ( $0,05 - 0,1 - 0,2 \mu\text{g/kg/min}$ ) war allerdings nicht signifikant. Die Werte der Ruhelage waren auch nach 25 Minuten wieder erreicht.

## 1.2. Kreislaufparameter

### 1.2.1. Herzfrequenz (Abb. 6)

Die Herzfrequenz nahm bei beiden Gruppen während der 45-minütigen Adrenalingabe signifikant zu. Bei den gut adaptierten Neugeborenen ( $n = 8$ ) zeigte sich während der ersten und zweiten Infusionsperiode ( $0,05 - 0,1 \mu\text{g/kg/min}$ ) eine Frequenzsteigerung von 9%, bzw. 17% ( $p < 0,05$ ). Die höchste Adrenalindosis ( $0,2 \mu\text{g/kg/min}$ ) brachte eine Steigerung der Herzfrequenz um 22% auf 149 Schläge pro Minute. Bereits 17 Minuten nach Absetzen des Pharmakons stellte sich der mittlere Ausgangswert von 123 Herzschlägen pro Minute wieder ein.

In Gruppe II ( $n = 8$ ) mit einer höheren Ausgangsfrequenz von 135 Schlägen pro Minuten vergrößerte sich die Zahl der Pulsationen um 6% ( $p < 0,02$ ), bzw. um 10% ( $p < 0,01$ ) bei niedriger und mittlerer Adrenalindosierung. Auch in diesem Kollektiv lag die größte Frequenzsteigerung mit 13% und 152 Herzschlägen pro Minute im dritten Infusionsabschnitt. Bei diesem Kollektiv stellten sich die Ruhewerte erst nach einstündiger Infusionspause ein.

### 1.2.2. Herzminutenvolumen $\dot{Q}$ (Abb. 6)

Bei der Bestimmung des Herzminutenvolumens unter Adrenalineinfluß ( $n = 7$ ) zeigte sich nur auf der dritten Infusionsstufe ( $0,2 \mu\text{g/kg/min}$ ) eine signifikante Änderung ( $p < 0,05$ ). Nach 15-, bzw. 30-minütiger Adrenalinapplikation ( $0,05 - 0,1 \mu\text{g/kg/min}$ ) ließ sich, gemessen an dem mittleren Ausgangswert von  $204 \text{ ml/kg/min}$  eine Herzminu-




Abb. 6: Einfluß von Adrenalin auf den Kreislauf:  
 Signifikante Zunahme von Puls (Gruppe I: —, Gruppe II: ----) und Herzminutenvolumen ( $\dot{Q}$ ).  
 Die Änderungen des Schlagvolumen (SV), sowie  
 des mittleren peripheren Widerstandes (TPR)  
 sind statistisch nicht signifikant.

tenvolumensteigerung von 6, bzw. 19% nachweisen. Auf Infusionsstufe 3 war eine weitere Anhebung des Herzminutenvolumens um 23% auf 250 ml/kg/min zu registrieren.

#### 1.2.3. Herzschlagvolumen SV (Abb. 6)

Das 'Schlagvolumen' erhöhte sich während der dosisvari-  
ierten Adrenalininfusion (0,05 - 0,1 - 0,2  $\mu\text{g/kg/min}$ )  
um 4%, 13% und 16%. Da der Bestimmung des Herzschlagvo-  
lomens auch nur ein kleines Neugeborenenkollektiv ( $n =$   
7) zur Verfügung stand, mußte auf eine Gruppeneinteilung  
verzichtet werden. 20 Minuten nach Beendigung der Ver-  
suchsreihe hatten die Neugeborenen wieder ein der Aus-  
gangslage entsprechendes Herzschlagvolumen. Vergleicht  
man unsere Resultate mit Beobachtungen an Erwachsenen  
(AVIADO, RIECO et al.), so ergeben sich keine nennens-  
werten Abweichungen.

#### 1.2.4. Mittlerer peripherer Widerstand TPR (Abb. 6)

Die untersuchten Neugeborenen reagierten auf die 15-mi-  
nütige Adrenalininfusion (0,05  $\mu\text{g/kg/min}$ ) mit einer 14%-  
igen 'Widerstandsanhebung'. Auf den beiden folgenden In-  
fusionsstufen (0,1 - 0,2  $\mu\text{g/kg/min}$ ) blieb der periphere  
Gesamtwiderstand im Mittel um 20% erhöht, um nach 45 Mi-  
nuten in die Ausgangslage zurückzukehren. Der geringen  
Zahl der Meßdaten wegen waren diese Ergebnisse nicht  
signifikant.

#### 1.3. Stoffwechselfparameter

Wie die dargelegte Adrenalinstimulation des cardio-respi-  
ratorischen Systems erwarten ließ, zeigte sich eine all-  
gemeine Aktivierung des Stoffwechsels mit Steigerung des  
Sauerstoffverbrauchs, der Kohlendioxydproduktion und der  
rektalen Körpertemperatur.

### 1.3.1. Sauerstoffverbrauch $\dot{V}O_2$ (Abb. 7)

Bei den besser adaptierten Neugeborenen ( $n = 8$ ) zeigte sich bereits nach viertelstündiger Adrenalininfusion ( $0,05 \mu\text{g/kg/min}$ ) eine signifikante Zunahme des Sauerstoffverbrauches von 29% ( $p < 0,05$ ). Bei mittlerer und höherer Pharmakondosis steigerte er sich um 32% ( $p < 0,02$ ) bzw. um 48% auf  $11,79 \text{ ml/kg/min}$ . Eine derartige Zunahme des  $O_2$ -Verbrauchs ist bei vergleichbaren Untersuchungen an Erwachsenen nie beschrieben worden. Vierzig Minuten nach Absetzen der Adrenalinzufuhr stellte sich die Ruhelage bei einem mittleren Wert von  $7,97 \text{ ml/kg/min}$  ein.

In Gruppe II ( $n = 8$ ) hatten die Neugeborenen einen höheren Sauerstoffgrundbedarf von gemittelt  $8,11 \text{ ml/kg/min}$ . Ihr  $O_2$ -Bedarf steigerte sich während der ersten Infusionsstufe insignifikant um 8% und bei mittlerer und höchster Adrenalinosis um 17% auf  $9,5 \text{ ml/kg/min}$ . Die Ruhelage war hier 30 Minuten später wieder erreicht.

### 1.3.2. Kohlendioxidproduktion $\dot{V}CO_2$ (Abb. 7)

Auch bei der Kohlendioxidproduktion zeigten die von uns untersuchten Neugeborenen während der dreistufigen Adrenalingabe signifikante Änderungen. So vergrößerte sich bei Gruppe I ( $n = 8$ ) das abgegebene  $CO_2$ -Volumen kontinuierlich um 15 bzw. 30% unter der fraktionierten Adrenalingabe ( $0,05 - 0,1 \mu\text{g/kg/min}$ ). Auf der höchsten Infusionsstufe ( $0,2 \mu\text{g/kg/min}$ ) nahm die Kohlendioxidproduktion sogar um 45% ( $p < 0,01$ ) auf  $8,89 \text{ ml/kg/min}$  zu. Auch hier entsprachen 40 Minuten nach Infusionsstop die ermittelten Daten der mittleren Ausgangslage von  $6,12 \text{ ml/kg/min}$ .

Bei den schlechter adaptierten Neugeborenen, die von einer niedrigeren  $CO_2$ -Ruheproduktion von  $5,81 \text{ ml/kg/min}$  ausgingen, nahm nach Infusionsbeginn die abgeatmete Kohlendioxidmenge um 31% zu. Die beiden folgenden Infusionsstufen ( $0,1 - 0,2 \mu\text{g/kg/min}$ ) brachten mit einer 36%igen




Abb. 7: Signifikante Zunahme von rektaler Temperatur (°Celsius) Sauerstoffverbrauch ( $\dot{V}_{O_2}$ ) und Kohlendioxyd ( $\dot{V}_{CO_2}$ )

während der Infusion von Adrenalin.

(Gruppe I: —)

(Gruppe II: ----)

und einer 35%igen Steigerung ( $p < 0,01$ ) nurmehr geringfügige Änderungen. Die Neugeborenen dieser Gruppe erreichten erst nach einer einstündigen Infusionspause wieder ihre Ausgangswerte.

#### 1.3.3. Respiratorischer Quotient RQ

Der respiratorische Quotient aus den beiden eben besprochenen Parametern ändert sich während der dreistufigen Adrenalingabe nicht bzw. nur geringfügig. Zudem liegen die Änderungen oft im Streubereich der Ruhewerte. Während in der Neugeborenen-Gruppe I keine Aussage über eine mögliche Beeinflussung durch Adrenalin gemacht werden kann, zeigt sich beim Kollektiv II eine 23%ige insignifikante Steigerung des RQ von 0,77 auf 0,95. Dieser "Glucoseeffekt" ist 40 Minuten nach Infusionsstopp nicht mehr nachweisbar.

#### 1.3.4. Körpertemperatur Temp (Abb. 7)

Die Körpertemperatur der besser adaptierten Neugeborenen stieg unter der dosisvariieren Adrenalingabe (0,05-0,1 - 0,2  $\mu\text{g/kg/min}$ ) von 36,9 °C auf 37,2°C ( $p < 0,01$ ). Ein ähnliches Bild, nur auf einem niedrigeren Niveau lieferte die gleichstarke Gruppe II ( $n = 8$ ).

Bei 36,8°C mittlerer Ausgangs-Körpertemperatur wurden hier nach der 45-minütigen Adrenalininfusion im Mittel 37,1°C gemessen. Eine Stunde nach Absetzen des Pharmakons hatten die Neugeborenen wieder ihre normale Körpertemperatur erreicht.

Diese 'Temperaturveränderungen' stellen ebenfalls ein Versuchsergebnis dar, das sich von der in der Literatur beschriebenen Wirkung von Adrenalin auf die Erwachsenen unterscheidet. Bemerkenswert ist ferner die gegenüber den Stoffwechselparametern verhältnismäßig kurze Abklingzeit der cardio-respiratorischen Effekte. Die hierfür wahrscheinlichste Erklärung ist, daß unter Adrenalineinfluß eine Kette von Stoffwechselreaktionen in Gang gebracht wird mit einer eigengesetzlichen, geringen Abklingquote.

## 2. Noradrenalin

Noradrenalin ist ein Hormon, das an den postganglionären, adrenergen Nervenenden und aus dem Nebennierenmark sezerniert wird. Ähnlich dem chemisch verwandten Adrenalin betrifft seine bekannte, pharmakologische Wirkung das kardio-vaskuläre System und den Stoffwechsel.

Noradrenalin erregt vorwiegend die  $\alpha$ -Rezeptoren. Einer Stimulation folgt demnach die Vasokonstriktion fast sämtlicher Blutstromgebiete. Zum Unterschied vom besprochenen Adrenalin steigt hierbei der systolische und der diastolische Blutdruck, was über Vagusreflexe zu einer 'reflektorischen Bradycardie' führt. Die Folge ist eine Abnahme des Herzminutenvolumens. Lediglich an den Koronarien wird die Vasokonstriktion nicht wirksam, was eine Mehrdurchblutung des Herzens nach sich zieht. Bei anderen lebenswichtigen Organen, wie Leber, Lunge, Niere, Muskulatur und Darm ist dagegen die Durchblutung stark gedrosselt, sowie der periphere Gesamtwiderstand erhöht. Wegen der starken, vasokonstriktorischen Wirkung kommt es bei subkutaner Injektion des Pharmakons zu Nekrosen. Es kann daher nur als stark verdünnte Lösung infundiert werden. Ähnlich dem Adrenalin wirkt Noradrenalin auch positiv inotrop auf den Herzmuskel und bedingt dadurch beim Erwachsenen die Zunahme des Herzschlagvolumens. Weitere, vom Adrenalin her bekannte Effekte, wie die Zunahme der Ventilation, sowie die Vergrößerung des Sauerstoffverbrauchs sind gleichfalls bei Noradrenalingabe beobachtet und beschrieben worden. Die beim Erwachsenen mit Dosen von 2 - 10  $\mu\text{g/kg/min}$  (3, 4, 12, 18, 30) bereits auslösbaren Vasokonstriktionen und Verminderungen des Herzminutenvolumens veranlaßten uns, in zahlreichen Vorversuchen die kleinste, bei Neugeborenen wirksame Dosis zu ermitteln. So erzielten wir bei den adaptionsgestörten Kindern mit Noradrenalingaben zwischen 0,1 und 0,4  $\mu\text{g/kg/min}$  eindeutige Kreislauffeffekte. Die gesamte Infusionszeit wurde auf 45 Minuten beschränkt, der klinische Zustand und

die arteriellen Blutgase wurden dabei ständig überwacht.

Vergleichbare Untersuchungen an Neugeborenen mit Noradrenalin werden von KARLBERG (22, 23) angegeben. Sein Patientengut rekrutiert sich jedoch aus gesunden, reifen Neugeborenen, was die Unterschiede in den Ergebnissen erklärt. Wie beim Adrenalin lassen unsere Resultate, von den verlängerten Abklingzeiten nach Absetzen des Pharmakons (30) abgesehen, keine nennenswerten Abweichungen gegenüber den Beobachtungen an Erwachsenen erkennen.

## 2.1. Atemparameter

### 2.1.1. Atemminutenvolumen $\dot{V}_E$ (Abb. 8)

Das Atemminutenvolumen zeigte unter Noradrenalineinfluß bei beiden Gruppen ( $n = 8$ ) signifikante Änderungen: Die besser adaptierten Kinder reagierten auf die drei Infusionssteigerungen (0,1; 0,2; 0,4  $\mu\text{g/kg/min}$ ) mit Volumenzunahmen von 3% (insignifikant), 13% ( $p < 0,01$ ) und 15% ( $p < 0,05$ ). Bei den Messungen wurde von einem Ruhewert von 237 ml/kg/min ausgegangen. Diese mittleren Werte wurden 25 Minuten nach Beendigung der Noradrenalingabe wieder erreicht.

Das zweite Neugeborenenkollektiv reagierte auf die gestaffelte Noradrenalingabe mit einer Steigerung des Atemminutenvolumens von 6% (insignifikant), 16% ( $p < 0,05$ ) und 24% ( $p < 0,01$ ) auf 302 ml/kg/min. Eine halbe Stunde nach Absetzen der Infusion pendelten sich auch hier die Kontrollwerte wieder auf die mittlere Ausgangslage von 244 ml/kg/min ein.

### 2.1.2. Atemfrequenz $F$ (Abb. 8)

Die Bestimmung der Atemfrequenz erbrachte sowohl bei den besser, als auch bei den schlechter adaptierten Neugeborenen unter Noradrenalineinfluß signifikante Änderungen. Bei dem ersten Kollektiv ( $n = 8$ ) erhöhte sich die Fre-




Abb. 8: Einfluß von Noradrenalin auf die Ventilation in Gruppe I (—) und Gruppe II (----). Das Atemminutenvolumen ( $\dot{V}_E$ ), und die Atemfrequenz (F) nehmen in beiden Gruppen signifikant zu, die alveolare Ventilation nur in Gruppe II.

quenz bei niederer und mittlerer Pharmakondosis ( $0,1 - 0,2 \mu\text{g/kg/min}$ ) um 5% bzw. 15% ( $p < 0,05$ ). Auf der dritten Infusionsstufe ( $0,4 \mu\text{g/kg/min}$ ) wurde mit 60 Atemzügen in der Minute eine signifikante 9%ige Steigerung ( $p < 0,05$ ) verzeichnet. Die Ruhefrequenz stellte sich 25 Minuten nach Absetzen des Noradrenalin mit 55 Atemzügen pro Minute ein.

Im Vergleich zu Gruppe I begann bei Gruppe II ( $n = 8$ ) die Noradrenalininfusion bei einem niedrigeren Ruhewert von 46 Atemzügen in der Minute. Nach einem geringen Frequenzabfall auf der ersten Infusionsstufe stieg die Zahl der Atemexkursionen signifikant an: Nach 30 bzw. 45-minütiger Pharmakongabe ( $0,2 - 0,4 \mu\text{g/kg/min}$ ) ließ sich eine Frequenzsteigerung von 15% ( $p < 0,02$ ) und 28% ( $p < 0,01$ ) auf 60 Atemzüge pro Minute registrieren. Der Ruhewert stellte sich 30 Minuten nach Beendigung der Infusion wieder ein.

#### 2.1.3. Anatomische alveolare Ventilation $\dot{V}_A$ (Abb. 8)

Die alveolare Ventilation stieg bei den Neugeborenen der Gruppe I ( $n = 8$ ) nach 45-minütiger, dosisvariierteter Noradrenalininfusion ( $0,1 - 0,2 - 0,4 \mu\text{g/kg/min}$ ) um 4%, 13% und 14%. Diese nichtsignifikanten Änderungen lagen im Streubereich der Ruhewerte. Nach 30 Minuten war die mittlere Ruhelage von  $179 \text{ ml/kg/min}$  wieder erreicht.

Ausgehend von einem deutlich höheren mittleren Ruhewert von  $196 \text{ ml/kg/min}$  nahm die alveolare Ventilation der Gruppe II ( $n = 8$ ) signifikant zu. Es wurden Steigerungen von 3%, 13% und zuletzt von 20% ( $p < 0,05$ ) auf  $235 \text{ ml/kg/min}$  registriert. Nach Absetzen des Pharmakons dauerte es 40 Minuten, bis die nun ermittelten Werte denen der Ausgangslage entsprachen.

#### 2.1.4. Atemzugvolumen $V_T$ (Abb. 9)

Die Bestimmung dieses Parameters ließ nur unbedeutende, nichtsignifikante Änderungen während der fraktionierten

Noradrenalingabe erkennen. Bei dem ersten Neugeborenenkollektiv nahm das 'Volumen' geringfügig um 6%, bzw. 4% und 3% ab. 15 Minuten nach Beendigung der Noradrenalingabe erreichte das Atemzugvolumen über ein kurzes, kompensatorisches Ansteigen wieder die Ausgangslage.

Die zweite Gruppe ging von einem höheren mittleren Ruhewert aus und atmete zunächst tiefer als das zuvor untersuchte Neugeborenenkollektiv. Nach der 9%igen, nichtsignifikanten Steigerung des Atemzugvolumens während des ersten Infusionsabschnittes ( $0,1 \mu\text{g/kg/min}$ ) kehrten während der folgenden Infusionsabschnitte die Werte wieder zur Ausgangslage zurück.

#### 2.1.5. Atemtotaum $V_D$ (Abb. 9)

Auch beim Atemtotaum ließ sich aufgrund der ermittelten Werte keine sichere Aussage über eine Beeinflussung durch Noradrenalin machen. Die pharmakonbedingten Änderungen lagen im Streubereich der Ruhewerte. Diese, und auch die während der Noradrenalininfusion ermittelten Werte der Gruppe I lagen etwas unter denen des zweiten Kollektivs.

#### 2.1.6. Totraumventilation $\dot{V}_D$

Bei der Ermittlung der Totraumventilation ergaben sich bei beiden Gruppen geringe, nicht signifikante Änderungen. Die Gruppe I vergrößerte die Totraumbelüftung während der beiden ersten Infusionsstufen ( $0,1 - 0,2 \mu\text{g/kg/min}$ ) um 2% und 5%. Die maximale Steigerung um 21%, bzw.  $68 \text{ ml/kg/min}$  wurde während des letzten Infusionsabschnittes registriert. Beide Neugeborenengruppen hatten die gleiche, mittlere Ausgangslage ( $56 \text{ ml/kg/min}$ ).

Ähnlich reagierten die schlecht adaptierten Neugeborenen. Während der gestaffelten Noradrenalingabe vergrößerte sich hier die Totraumventilation um 2%, 10% und 20%, bzw.  $67 \text{ ml/kg/min}$ . Der Noradrenalineneffekt war 25 Minuten nach Absetzen nicht mehr nachweisbar.




Abb. 9: Einfluß von Noradrenalin auf das Atemzugvolumen ( $V_T$ ), Atemtotraum ( $V_D$ ), sowie den Quotienten  $V_D/V_T$  bei Gruppe I (—) und Gruppe II (-----).

2.1.7. Verhältnis Totraum zu Atemzugvolumen  $V_D/V_T$   
(Abb. 9)

Dieser Quotient blieb während der dreistufigen Noradrenalininfusion bei beiden Neugeborenenkollektiven konstant. Die geringfügigen Schwankungen lagen im Streubereich der Ausgangswerte.

2.1.8. Alveolo-arterielle  $pCO_2$ -Differenz  $AaDCO_2$   
(Abb. 10)

Die Bestimmung der alveolo-arteriellen  $pCO_2$ -Differenz wurde nur an einem kleinen Neugeborenenkollektiv durchgeführt ( $n = 7$ ). Ausgehend von einem mittleren Wert von 10,51 Torr ließ sich nur auf der dritten Infusionsstufe (0,4  $\mu g/kg/min$ ) eine über den Streubereich der Ruhewerte reichende Zunahme um 22% auf 12,72 Torr registrieren. Die Änderungen waren jedoch nicht signifikant. Eine Stunde nach Infusionsende wurden wieder der Ruhelage entsprechende Werte ermittelt.

Auch für die Bestimmung der folgenden Parameter stand nur ein kleines Neugeborenenkollektiv ( $n = 7$ ) zur Verfügung. Deshalb mußte auf eine Gruppeneinteilung verzichtet werden. Die Untersuchung wurde an Kindern mit einem 'discriminant score' von 5000 vorgenommen.

2.1.9. Physiologische alveolare Ventilation  $\dot{V}_A^{phys}$   
(Abb. 10)

Die Untersuchungen ließen 15 Minuten nach Beginn der Noradrenalininfusion (0,1  $\mu g/kg/min$ ) eine 7%ige Zunahme der funktionellen alveolaren Ventilation erkennen. Trotz eines kurzen Absinkens der 'Physiologischen Belüftung' auf Infusionsstufe II bestätigte die auf Stufe III registrierte 20%ige Zunahme auf 179 ml/kg/min den Trend der Belüftungssteigerung. Dieser Noradrenalineffekt war nicht signifikant. 60 Minuten nach Infusionsende hatten sich bei den Neugeborenen die Ruheventilationswerte von 149 ml/kg/min wieder eingestellt.




Abb. 10: Einfluß des Noradrenalin auf die alveolo-arterielle  $pCO_2$ -Differenz ( $AaDCO_2$ ), auf das alveolare Atemäquivalent ( $\dot{V}_A^{phys}/\dot{V}_{O_2}$ ), auf das Verhältnis physiologischer Totraum zu Atemzugvolumen ( $\dot{V}_D^{phys}/V_T$ ), den physiologischen Totraum ( $\dot{V}_D^{phys}$ ) und auf die physiologisch alveolare Ventilation ( $\dot{V}_A^{phys}$ ) bei Gruppe I.

### 2.1.10. Physiologischer Totraum $V_{Dphys}$ (Abb. 10)

Bei diesem Parameter zeigte sich während der dosisvari-  
ierten Noradrenalininfusion, gemessen an dem mittleren  
Ausgangswert von 2,43 ml/kg, eine 5-, 9- und 11%ige Ab-  
nahme des funktionellen Totraumes. Auch hier lagen die  
nichtsignifikanten Änderungen im Streubereich der Ruhe-  
werte. Die Ausgangslage wurde 55 Minuten nach Absetzen  
des Pharmakons wieder erreicht.

### 2.1.11. Verhältnis: physiologischer Totraum zu Atemzug- volumen $V_{Dphys}/V_T$ (Abb. 10)

Das Verhältnis physiologischer Totraum zu Atemzugvolu-  
men zeigte unter der fraktionierten Noradrenalingabe  
keine nennenswerten Veränderungen; die geringen Werte-  
schwankungen lagen noch im Streubereich der Ruhewerte.

### 2.1.12. Alveolares Atemäquivalent $\dot{V}_{Aphys}/\dot{V}_{O_2}$ (Abb. 10)

Das alveolare Ventilationsäquivalent wurde, ausgehend  
von dem mittleren Ruhewert, mit dem Wert 16 registriert.  
Während der ersten beiden Infusionsabschnitte (0,01 -  
0,2  $\mu\text{g/kg/min}$ ) zeigte sich eine 6-, bzw. 10%ige Steige-  
rung. Während der dritten Infusionsstufe (0,4  $\mu\text{g/kg/min}$ )  
nahm das Atemäquivalent sogar um 14% signifikant auf  
18,2 zu ( $p < 0,05$ ). Nach Beendigung der Infusion stieg  
das alveolare Atemäquivalent noch geringfügig an, um  
nach ca. einer Stunde auf die ursprüngliche Ruhelage  
einzupendeln.

## 2.2. Kreislaufparameter

### 2.2.1. Herzfrequenz (Abb. 11)

Die Herzfrequenz nahm bei beiden Gruppen während der 45-minütigen Noradrenalingabe signifikant ab. Wie bei den vorhergehenden Versuchen wurde durch eine viertelstündige Änderung der Infusionsgeschwindigkeit die verabreichte Dosis dreimal erhöht: 0,1 - 0,2 - 0,4  $\mu\text{g/kg/min}$ . Bei den gut adaptierten Neugeborenen ( $n = 8$ ) zeigte sich bereits auf der ersten Infusionsstufe ein signifikantes Abnehmen der Frequenz um 6% ( $p < 0,01$ ). Während der zweiten und dritten Infusionsperiode blieb der Puls um 6, bzw. 7% unter dem mittleren Wert der Ruhemessungen von 132 Schlägen pro Minute. Interessant ist in diesem Zusammenhang die Beobachtung von KARLBERG et al. (22, 23), daß Neugeborene, die unter Noradrenalineinfluß (0,4  $\mu\text{g/kg/min}$ ) stehen mit einer reflektorischen Bradycardie reagierten. Dieser Kreislaufeffekt dauere nur 9 Minuten an, was im Gegensatz zu unseren Ergebnissen steht; desselben auch seine Feststellung, daß die Herzfrequenz trotz fortbestehender erhöhter Pharmakongabe auf den Ausgangswert zurückkehre. Unsere Neugeborenen erreichten nach Absetzen der Noradrenalininfusion erst über einen kompensatorischen Pulsanstieg auf 138 Schläge pro Minute ihre Ausgangslage wieder. In Gruppe II lagen die Werte der vorausgehenden Messungen im Mittel bei 135 Schlägen pro Minute. Bei diesem Kollektiv verringerte sich die Zahl der Herzschläge während der ersten Infusionsstufe um 4% (insignifikant), während der zweiten um 7% ( $p < 0,01$ ) auf 125 Schläge pro Minute. Während der dritten Infusionsstufe blieben diese Werte bestehen. Der Ruhepuls stellte sich 45 Minuten nach Absetzen des Pharmakons wieder ein.

Für die Bestimmung der nun folgenden Parameter stand wiederum nur ein kleines Kollektiv zur Verfügung ( $n = 7$ ). Auf eine Gruppeneinteilung wurde daher verzichtet. Der discriminant score der Probanden war größer 5000.




Abb. 11: Einfluß von Noradrenalin auf den peripheren Widerstand (TPR), auf das Herzschlagvolumen (SV), auf das Herzminutenvolumen ( $\dot{Q}$ ) und auf die Pulsfrequenz bei Gruppe I (—) und Gruppe II (-----).

### 2.2.2. Herzminutenvolumen $\dot{Q}$ (Abb. 11)

Bei der Bestimmung des Herzminutenvolumens zeigten sich unter Noradrenalininfluß keine signifikanten Änderungen. Auf der ersten Infusionsstufe ( $0,01 \mu\text{g/kg/min}$ ) stieg das ausgeworfene Blutvolumen um 3% an. Während der beiden folgenden Infusionsabschnitte stiegen die Meßwerte um insgesamt 11% auf  $259 \text{ ml/kg/min}$  an. Die Versuchsausgangslage war 30 Minuten nach Beendigung der Infusion wieder erreicht ( $232 \text{ ml/kg/min}$ ).

### 2.2.3. Herzschlagvolumen SV (Abb. 11)

Auch beim 'Schlagvolumen' ließ sich während der Noradrenalininfusion ( $0,1 - 0,2 - 0,4 \mu\text{g/kg/min}$ ) keine signifikante Wertänderung ermitteln. Die 1-, 11- und 23%ige Volumensteigerung kann aber als Trend gedeutet werden. 40 Minuten nach Infusionsstopp war kein Noradrenalindefekt mehr nachweisbar.

### 2.2.4. Mittlerer peripherer Widerstand TPR (Abb. 11)

Die Zunahme des peripheren Widerstandes war wegen der geringen Anzahl der Meßdaten ebenfalls nicht signifikant. Bei einem Ruhewert von  $19,12 \text{ dyn/sec/kg/cm}^{-5} \cdot 10^3$  zeichnete sich auf der zweiten und dritten Infusionsstufe eine Widerstandszunahme um 16% und 17% ab. Eine halbe Stunde später als beim Erwachsenen (30) war die Ruhelage wieder erreicht.

## 2.3. Stoffwechselfparameter

Der Anstieg der Kohlendioxydproduktion, des Sauerstoffverbrauchs und der rektalen Körpertemperatur, wurden bereits von KARLBERG et al. für das gesunde, reife Neugeborene beschrieben (22, 23). Die gleichen Stoffwechselleffekte zeigte Noradrenalin bei unseren Untersuchungen mit adaptationsgestörten Neugeborenen.

### 2.3.1. Sauerstoffverbrauch $\dot{V}O_2$ (Abb. 12)

Beide Neugeborenenengruppen zeigten unter der fraktionierten Noradrenalingabe (0,1 - 0,2 - 0,4  $\mu\text{g/kg/min}$ ) eine signifikante Steigerung des Sauerstoffverbrauchs. Auf Infusionsstufe II war bereits eine markante, 36%ige Zunahme ( $p < 0,01$ ) registrierbar. Auf der dritten Infusionsstufe war ein Mehrverbrauch an Sauerstoff von 37% ( $p < 0,001$ ) bzw. 11,98 ml/kg/min nachweisbar. Nach Absetzen der Infusion dauerte es noch 25 Minuten bis sich der mittlere  $O_2$ -Ruheverbrauch von 8,76 ml/kg/min eingestellt hatte.

In Gruppe II ( $n = 8$ ), mit einem niedrigeren mittleren  $O_2$ -Bedarf von 8,09 ml/kg/min, zeigte sich ebenfalls auf der zweiten Infusionsstufe eine 25%ige Steigerung ( $p < 0,01$ ) auf 10,13 ml/kg/min. Auf der dritten Stufe verringerte sich der Sauerstoffverbrauch um 9% auf 16% ( $p < 0,02$ ). 25 Minuten nach Infusionsstop war auch hier der Noradrenalineffekt nicht mehr nachweisbar.

### 2.3.2. Kohlendioxidproduktion $\dot{V}CO_2$ (Abb. 12)

Beide Neugeborenenengruppen zeigten unter der dreistufigen Noradrenalininfusion (0,1 - 0,2 - 0,4  $\mu\text{g/kg/min}$ ) signifikante Änderungen. So vergrößerte sich bei Gruppe I ( $n = 8$ ) das abgeatmete  $CO_2$ -Volumen auf Infusionsstufe II bereits um 17% ( $p < 0,02$ ). Nach weiteren 15 Minuten Noradrenalingabe (0,4  $\mu\text{g/kg/min}$ ) nahm die  $CO_2$ -Produktion sogar um 20% ( $p < 0,01$ ) auf 8,29 ml/kg/min zu. 40 Minuten nach dem Infusionsstop entsprachen die ermittelten ' $CO_2$ -Werte' wieder der mittleren Ausgangslage von 6,91 ml/kg/min.

Die schlecht adaptierten Neugeborenen hatten bei Versuchsbeginn eine  $CO_2$ -Ruheproduktion von gemittelt 6,8 ml/kg/min. Nach Infusionsbeginn stieg die pro Minute abgeatmete Kohlendioxidmenge um 11% ( $p < 0,02$ ), 19% ( $p < 0,01$ ) und um 24% auf 8,46 ml/kg/min. Hier war bereits nach 20 Minuten kein Noradrenalineffekt mehr nachweisbar.




Abb. 12: Signifikante Zunahme von rektaler Körpertemperatur ( $^{\circ}\text{Celsius}$ ), Sauerstoffverbrauch ( $\dot{V}\text{O}_2$ ) und Kohlendioxydproduktion ( $\dot{V}\text{CO}_2$ ) während der Infusion von Noradrenalin. (Gruppe I: —; Gruppe II: ----).

### 2.3.3. Körpertemperatur Temp (Abb. 12)

Das erste Neugeborenenkollektiv ( $n = 8$ ) reagierte auf die gestaffelte Noradrenalininfusion ( $0,1 - 0,2 - 0,4 \mu\text{g/kg/min}$ ) mit einer signifikanten Temperaturerhöhung. Ausgehend von  $36,82^\circ\text{Celsius}$  erreichten die Neugeborenen auf Stufe drei eine mittlere Körperwärme von  $37,01^\circ\text{C}$  ( $p < 0,05$ ).

Das gleiche Bild, bei einem mittleren Ausgangswert von  $36,81^\circ\text{C}$  zeigt sich bei den schlechter adaptierten Neugeborenen der Gruppe II: Hier stieg die Körpertemperatur unter Noradrenalineinfluß ebenfalls um  $0,19^\circ\text{C}$  auf  $37,0^\circ\text{C}$  ( $p < 0,02$ ). Bis zum Erreichen der ursprünglichen Körpertemperatur verstrichen nach Infusionsstop bei Gruppe I 45 Minuten, bei Gruppe II 60 Minuten. Nach KARLBERG et al. (23, 26) spielt Noradrenalin eine wichtige Rolle in der Thermoregulation des Neugeborenen.

MOORE (52) hält es aufgrund von Untersuchungen an Säugtieren für möglich, daß dabei die durch das Hormon freigesetzten Fettsäuren ein wesentlicher Faktor der Wärmeregulation seien. FELDBERG und MYERS (13) vertreten die Hypothese, daß Noradrenalin, neben Adrenalin, im Hypothalamus entscheidend in die Temperaturregulation eingreifen.

## VIII. Diskussion

Über die pharmakologische Wirkung der Katecholamine am Neugeborenen ist bisher wenig bekannt. Noch spärlicher werden die Angaben bei den adaptationsgestörten Neugeborenen.

In der vorliegenden Arbeit untersuchten wir Atmung, Kreislauf und Stoffwechsel an Risikoneugeborenen, die unter Adrenalin- bzw. Noradrenalin-Einfluß standen.

Der unterschiedlichen Lebensprognose rechnungstragend, wurden sie in ein Kollektiv der ausreichend adaptierten Neugeborenen (Gruppe I) und eines der adaptationsgestörten Neugeborenen (Gruppe II) aufgeteilt.

Unsere Ergebnisse sind nun hinsichtlich der zugrundeliegenden Wirkungsmechanismen, im Vergleich mit den Ergebnissen anderer Autoren, zu diskutieren unter Berücksichtigung eventueller therapeutischer Konsequenzen.

### A d r e n a l i n

Aus den umfangreichen Untersuchungen an Erwachsenen (4) weiß man, daß Adrenalin gleichermaßen  $\alpha$ - und  $\beta$ -Rezeptoren erregt. Bei einer mittleren Dosis von 0,1 bis 0,4  $\mu\text{g/kg/min}$  lassen sich im Experiment deutliche Adrenalineffekte reproduzieren.

Unsere kleinste bei beiden Neugeborenengruppen wirksame Adrenalindosis betrug 0,05  $\mu\text{g/kg/min}$ , wobei allerdings erwähnt werden muß, daß deutliche Atem- und Kreislauf-Effekte erst bei einer Dosis von 0,1  $\mu\text{g/kg/min}$  zu erzielen waren. Die adrenergen Rezeptoren des adaptationsgestörten Neugeborenen reagieren demnach, bei entsprechender Stimulation, ebenso empfindlich wie die des gesunden Neugeborenen oder des Erwachsenen.

Die Abklingzeit der Adrenalinwerte, die an unseren Neugeborenen zu ermitteln war, entsprach mit 20 Minuten im Mittel den vom Erwachsenen her bekannten Werten. Allerdings ließ sich bei den schlecht adaptierten Neugeborenen der Gruppe II häufig ein, im Vergleich zu Gruppe I, verzögertes Einpendeln

in die Versuchsausgangslage registrieren.

Ein generell verzögerter Abbau des Adrenalins bei adaptionsgestörten Neugeborenen, wie er von CHEEK et al. (9) vermutet wurde dürfte damit, wie wir noch zeigen werden, nicht nachweisbar sein.

#### 1) Einfluß des Adrenalins auf die A t m u n g

Eine Steigerung des Adrenalinspiegels im Blut des Erwachsenen - sei es durch schwere körperliche Anstrengungen, psychische Erregung oder im Experiment - bewirkt eine Steigerung der Atmung (27).

Wie nun unsere Untersuchungen zeigen konnten, reagiert das adaptionsgestörte Neugeborene auf physiologische Erhöhungen der AdrenalinKonzentration ebenfalls mit einer Stimulierung des Atemsystems. Die Belüftungszunahme scheint sogar weit ausgeprägter zu sein als unter vergleichbaren Bedingungen beim Erwachsenen. - Eine adrenalinbedingte mittlere Atemminutenvolumensteigerung ( $\dot{V}_E$ ) um 63% bei den cardiorespiratorisch beeinträchtigten aber besser adaptierten Neugeborenen der Gruppe I objektiviert dies.

Da diese Neugeborenen zumeist durch Zeichen der Atemnot auffällig geworden sind, soll, nicht zuletzt aus therapeutischen Überlegungen heraus, auf die Frage nach dem atemphysiologischen Hintergrund jener adrenalinbedingten, hochsignifikanten Belüftungssteigerung näher eingegangen werden:

Der pulmonale Gasaustausch erfolgt, wie bekannt, durch Diffusionsausgleich zwischen der Luft in den Lungenalveolen und dem Blut in den Lungenkapillaren. Demnach ist jener Belüftungsanteil, der auf die Luftleitungswege beschränkt ist, ohne in die "Gasaustauschzone" der Lunge zu gelangen, als Totraumventilation für den Gasaustausch verloren. Der verbleibende Teil des Atemzeitvolumens, die anatomische alveoläre Ventilation ( $\dot{V}_A$ ) hingegen, läßt Rückschlüsse auf die respiratorisch entscheidende Belüftung der Alveolen zu. Die Bestimmung dieses Parameters ergab bei den Neugeborenen

der Gruppe I erwartungsgemäß eine signifikante adrenalin-abhängige Mehrventilation von 43%. Für unsere Überlegungen ist der Informationswert dieser Atemgröße zweitrangig, da der Ventilationsfehler der Neugeborenen-Alveolen darin nicht berücksichtigt wird. Die anatomische alveolare Ventilation erfaßt nämlich die Belüftung sämtlicher Alveolen, auch solcher, die zwar belüftet, aber nicht durchblutet sind.

Besser geeignet für die Analyse des aufgezeigten Ventilationsverhaltens der pulmonal beeinträchtigten Neugeborenen erwies sich die physiologische alveolare Ventilation ( $\dot{V}_A^{\text{phys}}$ ). Dieser Parameter schließt die Totraumbelüftung aus, indem nurmehr solche Alveolen berücksichtigt werden, die gut belüftet und zugleich gut durchblutet sind. Demnach stellt sich in jeder Alveole ein  $\text{CO}_2\text{-O}_2$ -Gleichgewicht zwischen der Alveolarluft und dem abfließenden endkapillären Blut ein. Bemerkenswert ist nun, daß sich beim Erwachsenen unter vergleichbaren Bedingungen, wegen der geringeren alveolo-arteriellen  $\text{CO}_2$ -Differenz, beide Größen, anatomische und physiologische alveolare Ventilation, weitgehend entsprechen.

Demgegenüber umfaßt das 'effektive' alveolare Ventilationsvolumen der Gruppe I nur etwa 2/3 ihrer anatomischen alveolaren Ventilation. Unabhängig davon macht sich jedoch auch hier der belüftungssteigernde Effekt des Adrenalins mit einer 20%igen Zunahme bemerkbar.

Für diese aufgezeigte Diskrepanz müssen ursächlich folgende Faktoren in Betracht gezogen werden: Zunächst könnte eine methodische Ungenauigkeit, wie sie bei hohen Atemfrequenzen auftritt, verantwortlich sein: Durch die bei Adrenalingabe zu beobachtende, beschleunigte Atmung treten in den Luftleitungswegen Strömungsturbulenzen auf. Es ist dadurch nicht auszuschließen, daß die  $\text{pCO}_2$ -Bestimmungen nicht, wie vorausgesetzt, in reiner Alveolarluft, sondern in 'Mischluft' vorgenommen werden. Fälschlich zu hoch berechnete, alveolare Ventilationsvolumina sind dann die Folge.

Die eigentliche Begründung dürfte jedoch in den Perfusions-

und Ventilationsungleichheiten, bzw. -Störungen der Neugeborenen zu suchen sein: In der Tat wuchs die Differenz zwischen alveolarem und arteriellen  $p\text{CO}_2$ , ein wesentlicher, auf Atemgasverteilungsstörungen hinweisender Parameter, bei der Gruppe I unter Adrenalineinfluß um 2 Torr. Zudem lagen bereits die Ruhewerte mit 11 Torr wesentlich über den für gesunde Neugeborene beschriebenen Werten von 2 bis 4 Torr (31, 33).

Die niedrige, physiologische alveolare Ventilation wird somit hervorstechendes Merkmal der adaptationsgestörten Neugeborenen. Darüberhinaus muß die für überschießend gehaltene Gesamtbelüftungssteigerung vor dem Hintergrund der adrenalinbedingten, streßmäßigen Stoffwechselstimulation als respiratorische Notreaktion gesehen werden. Eine hinreichende  $\text{O}_2$ -Versorgung des Gewebes ist nämlich nur über eine ausreichende 'effektive' alveolare Ventilation zu garantieren. Voraussetzung dazu ist jene enorme Atemanstrengung und jene stark erhöhte alveolare Ventilation. - Nicht anders ist die 41%ige Atemminutenvolumenerhöhung, bzw. die 37%ige Zunahme der alveolaren Ventilation zu verstehen, die bei den schlechter adaptierten Kindern der Gruppe II ermittelt wurde.

Bei einem Vergleich der beiden Neugeborenen-Kollektive fällt auf, daß, ausgehend von gleichen, mittleren Werten, bei den schlechter adaptierten Neugeborenen der Gruppe II zunächst der steilere Ventilationsvolumenanstieg zu registrieren war. Um eine Erklärung hierfür finden zu können, müssen zuerst die ventilationsändernden Mechanismen analysiert werden.

Rasch wechselnde, unstete Stoffwechselerfordernisse machen es notwendig, daß sich die Atmung kurzfristig den jeweiligen respiratorischen Transportverhältnissen anpaßt. Die dazu notwendige Atemregulation wird über Atemfrequenz  $F$  und Atemzugvolumen  $V_T$  vorgenommen. Über das Zusammenspiel beider Variablen wird eine weitgehende Konstanthaltung der Stoffwechselgrößen  $\text{O}_2$  und  $\text{CO}_2$  im Transportmedium Blut garantiert.

Von Untersuchungen an Erwachsenen ist bekannt, daß in physiologischen Konzentrationen verabreichtes Adrenalin durch den stoffwechselaktivierenden Effekt zu einem  $O_2$ -Mehrbedarf führt, der in erster Linie über eine Vertiefung der Atmung kompensiert wird. Demgegenüber bestätigten Beobachtungen an adaptionsgestörten Neugeborenen das von gesunden Säuglingen her bekannte Bild der frequenzgesteuerten Atemregulation (21): Bei steigender Adrenalinkonzentration (0,05 - 0,1 - 0,2  $\mu\text{g/kg/min}$ ) war bei den Neugeborenen der Gruppe I eine stetige, fast lineare Zunahme der Atemfrequenz - zuletzt im Mittel um 26% - zu registrieren. Zur Veranschaulichung der respiratorischen Effektivität sei auf die Abbildung 8 verwiesen, die die Gleichzeitigkeit von Atemfrequenz- und Atemminutenvolumen-Gipfel gut erkennen läßt.

Die Gruppe der cardiorespiratorisch stärker beeinträchtigten Neugeborenen versuchte die adaptative Belüftungssteigerung ebenfalls maßgeblich über die Beschleunigung des Atemrhythmus vorzunehmen. Eine wesentliche atemungsbeschleunigende Wirkung wurde jedoch erst von der mittleren Adrenalindosis an registriert, die in einer 29%igen Frequenzzunahme auf der dritten Infusionsstufe gipfelte.

Neben der Atemfrequenz war bei den Untersuchungen auch der belüftungsregulierende Einfluß des Atemzugvolumens nachweisbar. Dies machte sich besonders bei den besser adaptierten Neugeborenen bemerkbar, die, ähnlich wie bei der Atemfrequenz eine mit steigender Pharmakongabe synchrongehende Vertiefung der Atmung um 26% zeigten. Die Neugeborenen der Gruppe II wiesen demgegenüber bereits bei den Ruhemessungen eine vertiefte Atmung auf. Während der ersten Infusionsstufe folgte nun eine weitere signifikante Steigerung des Atemzugvolumens um 29%. Allerdings war dieser Adrenalineffekt nur von kurzer Dauer, sodaß trotz steigender Pharmakonkonzentration auf Infusionsstufe II fast wieder Ruhewerte erreicht wurden.

Kehrt man mit dieser Information an den Ausgangspunkt unserer Betrachtung zurück, so werden die für Gruppe I und Grup-

pe II unterschiedlichen Kurvenverläufe des Atemminutenvolumens verständlich: Die besser adaptierten Neugeborenen können, entsprechend den Stoffwechselverhältnissen, neben der Atemfrequenz, als wichtigstem Belüftungsregulator, auch die potenzierende Wirkung einer zugleich vertieften Atmung nützen. Die cardiorespiratorisch schlechter adaptierten Neugeborenen können scheinbar jeweils nur über eines der Instrumente zur Belüftungsregulation,  $V_T$  bei niedrigen,  $F$  bei höheren Adrenalinkonzentrationen, verfügen. Auffallend ist weiter, daß, um das fehlende Miteinander von Frequenz und Atemzugvolumensteigerung zu kompensieren, jede der beiden Variablen die größtmögliche Steigerung aufweist. Daraus ergibt sich nun bei den besser adaptierten Neugeborenen das exponentialfunktionsähnliche Bild des Atemminutenvolumens dem bei den schlechter adaptierten Kindern eine aus einem  $V_T$ -Spike und einem  $F$ -Spike zusammengesetzte Kurve entspricht.

Warum nun reagieren die Kinder der Gruppe I anders als die der Gruppe II? Betrachten wir zunächst die cardiorespiratorisch besser adaptierten Neugeborenen: Der größeren Leistungsfähigkeit ihres respiratorischen Systems wegen, vermögen sie adrenalinbedingte Stoffwechselstimulationen und den dadurch anwachsenden  $O_2$ -Bedarf größtenteils über eine Frequenz- und damit Atemminutenvolumen-Steigerung zu kompensieren. In dem Maße aber, in dem die Anpassung der alveolären Belüftung an die lebensnotwendige alveoläre bzw. arterielle  $O_2$ - und  $CO_2$ -Konzentration gefährdet ist, macht sich die  $\beta$ -Rezeptorenstimulation bemerkbar: Über das aktive Erschlaffen der glatten Bronchialmuskulatur werden die Luftwege erweitert. Mit dieser Zunahme des Totraums, bei den Neugeborenen der Gruppe I betrug sie auf der dritten Infusionsstufe 45%, ist aber gleichzeitig die Vergrößerung des Alveolarraumes verbunden.

Anders bei den Neugeborenen der Gruppe II: Sie sind wegen der gestörten Atemregulation, die sich in einer niedrigen Atemfrequenz andeutet, bereits unter Ruhebindungen erheb-

lich mehrbelastet. Kompensatorisch weisen sie dafür eine vertiefte Ruheatmung auf. Dadurch ist ihre geringe respiratorische Leistungsreserve zusätzlichen Stoffwechselbelastungen, wie sie zum Beispiel unter physiologischen Adrenalininkonzentrationen auftreten, nicht mehr gewachsen. Wie KARLBERG (21) zeigen konnte, wird eine derartig ausgeprägte Atemvertiefung energetisch sehr ungünstig, da der elastische Widerstand der Lunge mit zunehmender Atemtiefe überproportional wächst. Damit wird auch das rasche Abklingen der für niedrige Adrenalininkonzentrationen typischen  $\beta$ -Rezeptorenstimulation verständlich. Die Energie, die durch die Reduktion des Atemzugvolumens frei wird, wird genutzt, um das drohende  $O_2$ -Defizit über die energetisch günstigere und zugleich belüftungseffektivere Steigerung der Atemfrequenz zu verhindern.

Dennoch, wie aus den unverhältnismäßig langen Abklingzeiten von  $\dot{V}_E$ ,  $\dot{V}_A$  und F der Neugeborenen der Gruppe II ersichtlich wird, gelingt es mitunter nicht, das angestrebte "steady state", einen gleichbleibenden Zustand der Atemanpassung zu erreichen. Auch jene äußersten Atemanstrengungen genügen dann nicht, die Stoffwechselbedürfnisse zu decken.

Die mit der eingegangenen  $O_2$ -Schuld einhergehenden blutchemischen Veränderungen, wie Plasma-pH-Absinken, Blutmilchsäureanstieg usw. werden nun selbst atemwirksam. Das verlangsamte 'Einpendeln' in die Ruhelage nach Absetzen der Adrenalinzufuhr ist daher ebenfalls ein Charakteristikum für die respiratorische Insuffizienz der untersuchten Neugeborenen. Es ist aber nicht Indiz für die Immaturität des Systems wie es von CHEEK postuliert wurde.

## 2) Einfluß des Adrenalins auf den Kreislauf

Wie eingangs erwähnt, sind ähnliche Studien über das Kreislaufverhalten adaptationsgestörter Neugeborener unter Adrenalin nicht bekannt. Vergleicht man die von uns ermittelten Werte mit den von Erwachsenen her bekannten Ergebnissen, so läßt sich, im Gegensatz zur Atmung, keine nennenswerte Abweichung erkennen.

Wie bei einer streßbedingten Sympathikusreizung erhöht sich während der dosisvariieren Adrenalininfusion die Herzfrequenz. Dieser positiv chronotrope Effekt ist auf das 'Steilerwerden' der diastolischen Depolarisation zurückzuführen, wodurch die "Schwelle" zur Auslösung von Aktionspotentialen schneller erreicht wird. Die Folge ist ein kürzerer 'Schlagabstand', dem bei den Neugeborenen der Gruppe I eine 22%ige und bei den Neugeborenen der Gruppe II eine 13%ige Steigerung der Herzfrequenz entspricht. Desgleichen kompensieren die cardiorespiratorisch stärker beeinträchtigten Kinder der Gruppe II über höhere, mittlere 'Ruhepulse' die eingeschränkte  $O_2$ -Transportkapazität.

Wird diesen Neugeborenen, trotz stetiger 'Mehrarbeit', durch Adrenalingabe noch eine weitere Leistungssteigerung abverlangt, so tritt, wie die vergleichbar niedrige reaktive Frequenzsteigerung beweist, auch wesentlich eher die Leistungsgrenze, bzw., mit zunehmender Hypoxie, der limitierende Erschöpfungszustand ein.

Neben der Herzfrequenz wird auch das Schlagvolumen zur Steuerung des Herzminutenvolumens  $\dot{Q}$  herangezogen. Wie allgemein bekannt, erhöht Adrenalin ohne Änderung der mechanischen Ruhespannung über eine erhöhte Kontraktionsamplitude die Kontraktionskraft des Herzens. Dadurch kann das Schlagvolumen um einen Teil des Restvolumens vergrößert werden. Es ist möglich, daß dieser Mechanismus der positiv inotropen Wirkung auf dem Einfluß des Adrenalins auf die Ca-Kinetik der Muskelfasern beruht, d.h. einer Vergrößerung des langsamen Calciumeinstroms während des Aktionspotentials. Da wegen der geringen Zahl von Meßdaten keine statistische

Signifikanz nachweisbar war, konnten unsere Bestimmungen, die eine Zunahme des Schlagvolumens um 16% ergaben, den von Erwachsenen her bekannten Adrenalineneffekt nur bestätigen.

Die Vergrößerung des Herzschlagvolumens dürfte jedoch gegenüber der aufgezeigten frequenzgesteuerten Anpassung des Herzminutenvolumen an die Stoffwechselverhältnisse von untergeordneter Bedeutung sein. Ähnliches gilt auch für die bei höheren Adrenalinkonzentrationen typische Stimulation der  $\alpha$ -Rezeptoren. Sie zeigte sich bei unseren Neugeborenen mit Hautblässe und deutete sich, der geringen Zahl der Meßwerte wegen, mit statistisch insignifikanter Zunahme des peripheren Widerstandes an.

### 3) Einfluß des Adrenalin auf den S t o f f w e c h s e l

Ganz im Vordergrund des Stoffwechsels und der damit verbundenen Energiebereitstellung für Biosynthesen, Muskelkontraktionen und aktive Transporte steht als entscheidende Voraussetzung eine entsprechende  $O_2$ -Versorgung. Sie wird wie oben dargestellt, über den Hilfsapparat Atmung und Kreislauf garantiert. Die Stoffwechselmessung kann demnach durch die Bestimmung des  $O_2$ -Verbrauches "vereinfacht" werden.

Eine Steigerung des Sauerstoffverbrauches um 48%, wie sie bei den von uns untersuchten Neugeborenen der Gruppe I vorlag deutet dementsprechend eine ausgeprägte Stoffwechselstimulation durch Adrenalin an. Auch bei den schlechter adaptierten Neugeborenen der Gruppe II war diese allgemeine Aktivierung des Stoffwechsels, wenn auch nicht signifikant, nachweisbar. Es muß hier allerdings berücksichtigt werden, daß wegen der Mehrbelastung bei den bekannten cardiorespiratorischen Störungen, bereits unter Ruhebedingungen ein erhöhter  $O_2$ -Bedarf bestand.

Darüberhinaus war auch die Bildung des Stoffwechselendproduktes Kohlendioxyd unter Adrenalingabe signifikant ange-

hoben. Sowohl die 45%ige  $\text{CO}_2$ -Produktionssteigerung der besser adaptierten Neugeborenen als auch die 36%ige Zunahme der schlechter adaptierten Kinder sind Beweis für eine verstärkte Stoffwechselleistung.

Eine weitere Möglichkeit, die adrenalinbedingte Stoffwechselaktivierung nachzuweisen, beruht auf der Messung der gleichzeitigen Energiefreisetzung: Man geht dabei von der Überlegung aus, daß im lebenden Organismus nahezu der gesamte Energieumsatz, soweit keine äußere Arbeit geleistet wird, in Wärme übergeht. Die Arbeit des Herzens zum Beispiel, die an einem Körperorgan, dem Kreislaufsystem geleistet wird, geht vollständig in Reibungswärme über und wird daher im Gesamtstoffwechsel als Wärmeabgabe meßbar. Um nun die ohnehin schon beeinträchtigten Neugeborenen zu schonen, wurde auf eine exakte, direkte kalorimetrische Bestimmung der unmittelbar abgegebenen Wärmemenge verzichtet. Die bei beiden Neugeborenengruppen während der 45-minütigen dosisvariierten Adrenalingabe signifikante Zunahme der rektal gemessenen Körpertemperatur um  $3/10^\circ\text{C}$  dürfte aber ein hinreichender Beweis für die angeregte Stoffwechselaktivität sein. Wie bereits im Ergebnisteil erwähnt, ist ein derart ausgeprägter Adrenalineffekt auf den Stoffwechsel bei den Erwachsenen nicht zu beobachten.

Abschließend sei nochmals auf das verlangsamte 'Einpendeln auf die Versuchsausgangslage' eingegangen, das für viele unserer Untersuchungen typisch war und sich besonders eindrucksvoll bei den Stoffwechselparametern verfolgen ließ. Ähnlich der vom Erwachsenen her bekannten Glycogenolyse, Lypolyse und ATP-Spaltung (19, 25), darf auch bei den Neugeborenen eine Kette adrenalinstimulierbarer Stoffwechselreaktionen mit eigengesetzlicher Abklingquote angenommen werden. Die bei gesunden Neugeborenen nachgewiesene, adrenalininduzierte Glycogenolyse würde dem entsprechen. Zugleich ist angesichts der cardio-respiratorischen Störungen die  $\text{O}_2$ -Transportkapazität eingeschränkt, sodaß die maximal mögliche Sauerstoffversorgung früher als beim gesunden

Neugeborenen erreicht wird. Da die streßmäßig stimulierte Arbeitsfähigkeit von Atmung, Kreislauf und Stoffwechsel größer ist, wird, zunehmend mit der Dauer der Adrenalingabe, aus anaeroben Prozessen Energie gewonnen. Nach Beendigung der Katecholamingabe schließt sich mit der Zeit der Sauerstoff-Nachatmung die Zeit der oxydativen Restitution an. Dies erfolgt biphasisch, d.h., in einer Phase des schnellen Abfalls nach Infusionsende und einer an diese anschließenden, langsamen, langdauernden Anpassung an die Ruilverhältnisse. Beide Prozesse könnte man als Exponentialfunktionen sehr verschiedener Geschwindigkeiten betrachten, wobei letztere, als Ausdruck eines Erschöpfungszustandes, für die hier untersuchten Neugeborenen typisch ist.

Jener ersten, schnellen Phase ist der Wiederaufbau des hydrolisierten Kreatinphosphats zuzuordnen, der zweiten, langsamen Phase die oxydative Entfernung der Milchsäure.

#### N o r a d r e n a l i n

Die im Blut zirkulierenden Katecholamine setzen sich, je nach Art der sympathischen Aktivierung, aus verschiedenen Relativanteilen der beiden Komponenten Adrenalin und Noradrenalin zusammen. Ein Ansteigen des Adrenalinpiegels ist, wie bereits erwähnt, besonders bei psychischer Belastung und in geringerem Maß auch bei Muskelarbeit zu beobachten. Anders liegen die Verhältnisse beim Noradrenalin, dessen Konzentration im Blut ebenfalls bei Muskelarbeit, darüberhinaus aber auch im Verlauf orthostatischer Reflexe und bei starkem Blutverlust ansteigt. Dieses hauptsächlich an den postganglionären adrenergen Nervenenden, daneben auch aus dem Nebennierenmark, sezernierte Hormon erregt vorwiegend die vasokonstriktion-vermittelnden  $\alpha$ -Rezeptoren. Eine Ausnahme bilden nur die Koronargefäße, an denen Noradrenalin, in mäßigen Konzentrationen, über die  $\beta$ -Rezeptoren dilatierend wirkt.

Wie aus der umfangreichen Literatur weiter ersichtlich, be-

trägt beim Erwachsenen die 'pressorsich' wirksame Dosis 2 bis 10  $\mu\text{g/kg/min}$  (3, 4, 12, 18, 30).

Wir erzielten bei den adaptionsgestörten Neugeborenen mit Noradrenalin Dosen zwischen 0,1 und 0,4  $\mu\text{g/kg/min}$  ebenfalls signifikante Atem- und Kreislauffeffekte, wenngleich diese weit geringer ausgeprägt waren als beim Adrenalin. Der Dosisvergleich macht deutlich, daß die  $\alpha$ -Rezeptoren der untersuchten Neugeborenen auf eine Noradrenalinstimulation ebenso empfindlich reagieren, wie die der Erwachsenen. Ein Hinweis für die Immaturität des Rezeptorensystems ist demnach nicht erkennbar.

Die Abklingzeit der Noradrenalineffekte entspricht im Mittel den vom Adrenalin her bekannten Werten. Trotz der auch hier nachzuweisenden, protrahierten Noradrenalinwirkung scheint die These, daß beim adaptionsgestörten Neugeborenen der Metabolismus der Katecholamine beeinträchtigt ist, aus den bereits auf Seite 53, 56 besprochenen Gründen wenig wahrscheinlich.

#### 1) Einfluß des Noradrenalins auf die A t m u n g

Der belüftungssteigernde Effekt des Noradrenalins ist durch zahlreiche Untersuchungen an Erwachsenen, nicht aber an gesunden, bzw. adaptionsgestörten Neugeborenen analysiert und dokumentiert worden.

Den Erwartungen gemäß erbrachten unsere Untersuchungen bei steigendem Noradrenalin Spiegel im Blut der cardio-respiratorisch gestörten Neugeborenen eine signifikante Zunahme der Gesamtelüftung. Verglichen mit jener eindrucksvollen, adrenalininduzierten Mehrbelüftung nimmt sich die 15%ige Steigerung des Atemminutenvolumens bei den besser adaptierten Neugeborenen der Gruppe I allerdings relativ gering aus. Zudem ist hier, entsprechend der insignifikanten 14%igen Zunahme der anatomisch-alveolaren Ventilation, die statistisch nicht zu sichernde, physiologische alveolare, d.h. 'effektive' Ventilationssteigerung nurmehr als Trendmarkierung zu werten.

Zum einen kann man diese mäßig ausgeprägte Belüftungssteigerung damit begründen, daß unterschiedlich zum Adrenalin, trotz steigender Pharmakondosis die glatte Muskulatur der Bronchien unbeeinflusst bleibt: das Atemzugvolumen und der anatomische, bzw. physiologische Totraum bleiben während des Noradrenalineinflusses im Streubereich der Ruhelage. Zum anderen scheint der vergleichsweise geringe Atemantrieb der besser adaptierten Neugeborenen, der sich aus der einzig auf die Stoffwechselerfordernisse abgestimmten Atemregulation ergibt, verantwortlich zu sein: Die erst ab der mittleren 'Infusionsstufe' sich abzeichnende 15%ige Zunahme der Atemfrequenz steht nämlich in enger Korrelation zu der gleichzeitig einsetzenden Stoffwechselaktivierung. Man ist deshalb geneigt, die frequenzgesteuerte Mehrbelüftung als reaktives Anpassen der respiratorischen Transportkapazität an den stoffwechselbedingten  $O_2$ -Mehrbedarf, bzw. die  $CO_2$ -Überproduktion zu deuten. Der Gedanke an eine direkte Wirkung auf das Atemzentrum, wie er unter vergleichbaren Umständen beim Adrenalin auftaucht, erübrigt sich angesichts der indirekten Wirkungsmechanismen, wie der Steigerung der Glycolyse, der Erniedrigung des Blut-pH und dem Anstieg des venösen  $pCO_2$ .

Die Annahme einer am Stoffwechselmehrbedarf orientierten Atemregulation, die sich auf die Beobachtung an den Neugeborenen der Gruppe I stützt, verliert auch angesichts der unter gleichen Bedingungen zu registrierenden, eindrucksvollen Belüftungssteigerung der schlechter adaptierten Neugeborenen nicht ihre Berechtigung. Nicht ein zusätzlicher Atemantrieb, sondern vielmehr der Versuch, das sich abzeichnende, lebensbedrohende  $O_2$ -Defizit zu kompensieren, liefert den Hintergrund jener noradrenalinbedingten 24%igen Belüftungssteigerung ( $\dot{V}_E$ ), bzw. der signifikanten 20%igen Zunahme der anatomisch-alveolaren Ventilation ( $\dot{V}_A$ ). Es darf nämlich nicht vergessen werden, daß sich hier die stoffwechselbedingte Belastung des Sauerstoffhaushaltes mit den cardiorespiratorischen Störungen und der Atemregulationsstörung,

die durch die erniedrigte Atemruhefrequenz gekennzeichnet ist, überlagert. Deshalb vermag die maximal mögliche Belüftungssteigerung, die über eine 28%ige, signifikante Beschleunigung des Atemrhythmus erreicht wird, die Hypoxämie lediglich in einer tolerablen Grenze zu halten, jedoch nicht zu verhindern. Die verbleibende  $O_2$ -Schuld wird, wie an der verlängerten Abklingzeit der Atemeffekte zu erkennen ist, durch die atmungsaktiv bleibenden blutchemischen Veränderungen (siehe S. 53) abgebaut.

## 2. Einfluß des Noradrenalins auf den Kreislauf

Ähnlich dem Adrenalin bewirkt Noradrenalin am Schrittmachergewebe des Herzens eine schnelle Depolarisation, d.h., einen steilen Anstieg des Schrittmacherpotentials mit früher Auslösung des Aktionspotentials. Zu dieser Frequenzerhöhung kommt noch die Steigerung der Kontraktionskraft, die sich an einer stärkeren, systolischen Entleerung des Herzens, und in der Abnahme des endsystolischen Volumens bemerkbar macht. Der positiv-inotrope Effekt, sowie die noradrenalin-typische Anhebung des peripheren Kreislaufwiderstandes durch Vasokonstriktion bedingen die systolische und, zum Unterschied zu Adrenalin, auch die diastolische Blutdruckerhöhung. So kommt es, wie aus der Literatur bekannt, zu jenem steilen Anstieg des arteriellen Mitteldruckes, der die Gegenregulation der arteriellen Rezeptoren in den vasosensiblen Zonen provoziert. Entsprechend dieses pressorezeptorischen Kompensationsvorganges kommt es zu der ebenfalls noradrenalin-typischen, vagalen Herzfrequenzverlangsamung sowohl beim Erwachsenen, als auch beim gesunden, reifen Neugeborenen.

Unsere Untersuchungen an adaptationsgestörten Neugeborenen bestätigten die negativ-chronotrope Wirkung des Noradrenalins, wobei für beide Neugeborenenengruppen eine signifikante, 7%ige Verminderung der Zahl der Herzaktionen nachgewiesen

werden konnte. Wahrscheinlich würde sich die vagotone Verlangsamung der Herzfrequenz noch stärker bemerkbar machen, wenn es nicht unter der Noradrenalingabe zu einem Anstieg der Körpertemperatur, und damit zu einer thermoregulatorischen Beschleunigung der Blutumwälzung käme.

Im Anschluß an die Noradrenalin-Infusion stieg die Herzfrequenz bei beiden Neugeborenenkollektiven wieder an. Bei den Kindern der Gruppe I wurde die bradycarde Phase sogar durch eine Pulsbeschleunigung abgelöst, die über die ursprüngliche Ruhelage hinausging. Den Hintergrund dieser kompensatorischen Tachycardie bildet erneut eine Pressorezeptorenreaktion, dieses Mal aber als Gegenregulation gegen den abrupten Blutdruckabfall. Bei den cardiorespiratorisch stärker beeinträchtigten Neugeborenen hingegen scheint die Empfindlichkeit der Pressorezeptoren weit weniger ausgeprägt zu sein. Das vergleichsweise langsame 'Bradycard-Werden' der unter Noradrenalineinfluß stehenden Neugeborenen, sowie das gemächliche Einpendeln der Herzfrequenz in die Ausgangslage in Anschluß an die Infusion, deuten zumindest darauf hin.

An dieser Stelle erscheint ein Vergleich mit der Reaktion gesunder Kinder interessant: KARLBERG und Mitarbeiter beobachteten bei gesunden, reifen Neugeborenen unter einer Noradrenalininfusion eine reflektorische Bradycardie, die aber nur 9 Minuten andauerte. Die trotz fortbestehenden, erhöhten Blutdruckes an den Ausgangswert zurückkehrende Herzfrequenz beweist, daß die Pressorezeptoren nur auf akute Abweichungen des Blutdruckes reagieren. Langdauernde, z.B. durch Noradrenalininfusion bewirkte Mitteldruckanhebungen verschieben dagegen lediglich den Arbeitsbereich der Rezeptoren zu höheren Drucken hin. Nach einer derartigen Blutdruckadaptation wird, wie KARLBERGS Beobachtungen zeigten, die Bradycardie zurückgenommen (22, 23). Die demgegenüber anders ablaufende Blutdruckregulation der adaptionsgestörten Neugeborenen läßt die Schlußfolgerung zu,

daß, mit zunehmender cardiorespiratorischer Beeinträchtigung, auch das pressorezeptorische Regulationsvermögen schwindet.

Was das Herzminutenvolumen anbelangt, so lassen sich, bis auf eine insignifikante Zunahme am Infusionsende, keine nennenswerten Veränderungen erkennen, da der leichte Rückgang der Herzfrequenz durch eine statistisch nicht zu sichernde Zunahme des Schlagvolumens kompensiert wird.

Erwähnenswert erscheint noch der ausgeprägte, vasokonstriktorische Effekt des Noradrenalins: Obwohl die 17%ige Zunahme des peripheren Widerstandes wegen der kleinen Neugeborenen-, bzw. Meßdatenzahl insignifikant war, zeichnete sich mit dem zunehmenden Bläßwerden der Haut und der Extremitäten eine Zentralisation des Kreislaufes ab. Unter physiologischen Bedingungen tritt dieser Schutzmechanismus nur in Notsituationen in Erscheinung, wenn es gilt, die Durchblutung und damit die  $O_2$ -Versorgung lebenswichtiger Organe, wie Gehirn und Herz zu Lasten untergeordneter Gebiete zu erhalten.

### 3. Einfluß des Noradrenalins auf den Stoffwechsel

Bereits 1963 und 1965 konnte KARLBERG bei Untersuchungen an gesunden, reifen Neugeborenen den Zusammenhang zwischen der Noradrenalingabe und dem Anstieg des Sauerstoffverbrauches, der Kohlendioxydproduktion und der rektalen Temperatur deutlich machen (22, 23). Die 37%ige Steigerung des Sauerstoffverbrauches, die unter vergleichbaren Bedingungen auch bei unseren Neugeborenen der Gruppe I nachzuweisen war, bestätigt dementsprechend die stoffwechselstimulierende Wirkung des Noradrenalins. Auch bei den cardiorespiratorisch schlechter adaptierten Neugeborenen der Gruppe II konnte anhand des um 25% signifikant gestiegenen Sauerstoffbedarfs die allgemeine Aktivierung des Stoffwechsels nachgewiesen

werden.

Erwartungsgemäß war auch die Bildung des Stoffwechselsendproduktes Kohlendioxyd bei der Gruppe I um 20%, bei der Gruppe II um 24% angehoben. Darüberhinaus machte sich die erhöhte Stoffwechselleistung auch in der abgegebenen Wärmeenergie bemerkbar. Die bei beiden Neugeborenenengruppen signifikante Zunahme der rektal gemessenen Körpertemperatur um  $0,19^{\circ}\text{Celsius}$  dürfte ein hinreichender Beweis für die Stoffwechselaktivität sein.

Zu erwähnen bleibt noch, daß die beschriebenen Stoffwechseleffekte erst bei mittlerer Noradrenalinosis ( $0,2 \mu\text{g/kg/min}$ ) eindeutig meßbar wurden.

Nach Meinung von KARLBERG und SCHIFF (23, 41) spielt Noradrenalin eine wichtige Rolle bei der Thermoregulation des Neugeborenen. Von Bedeutung scheint in diesem Zusammenhang die Bereitstellung von Brennstoffen durch Glycogenolyse und Lipolyse, aber auch der unmittelbare Eingriff in die Stoffwechselprozesse der Zelle zu sein (17).

In jedem Fall kann man aber von der Tatsache ausgehen, daß der gesunde, reife Säugling und, etwas abgeschwächt, auch das Frühgeborene im Gegensatz zum Erwachsenen auf Kälteeinwirkungen mit einer kräftigen, noradrenalinvermittelten Umsatzsteigerung reagieren. Diese 'zitterfreie' Wärmebildung stellt die einzige Möglichkeit dar, den Wärmeverlust des dünnen 'Schalengewebes' der Neugeborenen, das auch bei Vasokonstriktion nur eine geringe Wärmeisolation darstellt, zu kompensieren. Die Feststellung, daß durch die Ausschüttung von Noradrenalin die Regulation der Körpertemperatur vorgenommen wird, deckt sich mit der Beobachtung SCHIFF'S und Mitarbeiter, daß bei reifen Neugeborenen unter Kälteeinwirkung vermehrt Noradrenalin im Urin ausgeschieden wurde (41).

## IX. ZUSAMMENFASSUNG

An 21 Neugeborenen und Frühgeborenen, 2 - 100 Stunden alt, wurde die Wirkung der Katecholamine Adrenalin und Noradrenalin auf die Basisgrößen der Ventilation, Zirkulation und des Stoffwechsels untersucht.

Da trotz der standardisierten Versorgungsbedingungen die individuellen Schwankungen bei Kreislauf und Atmung der Neugeborenen beträchtlich sind, erwies es sich als zweckmäßig, mithilfe eines objektiven "discriminant score" zwei Kollektive zu bilden. Gruppe I mit gering adaptionsgestörten Neugeborenen und Gruppe II mit cardio-respiratorisch stärker beeinträchtigten Kindern.

In Bestätigung der Ergebnisse anderer Autoren zeichnet sich unter Adrenalineinfluß eine beträchtliche Zunahme des Atemminutenvolumens sowie der alveolaren Ventilation ab, und zwar in Gruppe I stärker als in Gruppe II. Die Zunahme der Ventilation erfolgt hauptsächlich über eine Steigerung der Atemfrequenz, zusätzlich nimmt auch das Atemzugvolumen um einen geringen Betrag zu. Offenbar kommt es unter Adrenalin-gabe zu einer aktiven Erweiterung der Luftwege. An die Zunahme des Atemzugvolumens ist die Vergrößerung des anatomischen Atemtotraums gekoppelt.

Als wesentlicher Parameter der unter Adrenalineinfluß weiter bestehenden Belüftungsstörung findet sich bei den adaptionsgestörten Neugeborenen eine erhöhte, der geringen Meßdaten wegen statistisch insignifikante alveolo-arterielle  $\text{CO}_2$ -Differenz. Nur über die erwähnte, hochsignifikante Mehrbelüftung, die eine eben noch ausreichende physiologische alveolare Ventilation garantiert, war es diesen cardio-respiratorisch beeinträchtigten Neugeborenen möglich, eine  $\text{CO}_2$ -Retention, bzw. eine Hypoxämie zu verhindern. Diese Kompensation wurde nur durch eine maximale Steigerung der Atemfrequenz möglich, während die Vergrößerung des Atemzugvolumens, soweit es die energetische Lage der Neugeborenen erlaubte, nur flankierend herangezogen wurde.

Was den Kreislauf der adaptionsgestörten Neugeborenen anbetrifft, so zeichnet sich unter Adrenalineinfluß eine signifikante Erhöhung des Herzminutenvolumens ab, bedingt durch eine steile Zunahme der Herzfrequenz. Die Vergrößerung des Schlagvolumens war demgegenüber zweitrangig und statistisch insignifikant.

Die allgemeine Aktivierung des Stoffwechsels läßt sich an der für beide Gruppen signifikanten Zunahme des Sauerstoffverbrauchs, der Kohlendioxidproduktion und der rektalen Körpertemperatur erkennen. Diese Wirkung auf den Stoffwechsel bleibt auch nach Beendigung der Adrenalininfusion noch längere Zeit, als es bei der Wirkung auf den Kreislauf der Fall ist, nachweisbar. Offenbar wird durch dieses Katecholamin eine Reihe von Stoffwechselreaktionen in Gang gesetzt, die noch andauern, wenn die cardio-vaskulären Effekte bereits abgeklungen sind.

Wie unsere Untersuchungen zeigen konnten, reagiert das adaptionsgestörte Neugeborene auf eine physiologische Erhöhung der Noradrenalinkonzentration ebenfalls mit einer signifikanten Stimulation des Atemsystems. Getragen wird diese Mehrbelüftung von der signifikanten Zunahme der Atemfrequenz. Atemzugvolumen und Atemtotraum bleiben zum Unterschied vom Adrenalin konstant. Offenbar wird die glatte Muskulatur der Bronchien durch Noradrenalin nicht beeinflusst.

Während die Wirkung des Noradrenalins auf die Atemparameter hinter der des Adrenalins zurückbleibt, ist umgekehrt der dominierende Einfluß des Noradrenalins auf den Kreislauf unbestritten. Die ausgeprägte Erhöhung des arteriellen Mitteldruckes löst kompensatorisch den Pressorezeptorenreflex aus, der jene noradrenalin-typische Verlangsamung der Herzfrequenz zur Folge hat. Wie an dem unterschiedlichen 'Reflexverhalten' unserer beiden Neugeborenenengruppen zu zeigen ist, schwindet mit zunehmender cardiorespiratori-

scher Beeinträchtigung auch das pressorezeptorische Regulationsvermögen. Das Herzminutenvolumen läßt dagegen unter Noradrenalineinfluß keine nennenswerte Veränderung erkennen, da der Rückgang der Herzfrequenz durch eine statistisch nicht zu sichernde Zunahme des Schlagvolumens kompensiert wird.

Erwähnenswert ist noch der ausgeprägte vasokonstriktorische Effekt dieses Katecholamins, der auf einer Stimulation der  $\alpha$ -Rezeptoren beruht und die Neugeborenen durch zunehmen des Bläßwerden der Haut und der Extremitäten auffällig werden läßt.

Auch die signifikante Noradrenalinwirkung auf den Stoffwechsel unserer Neugeborenen, dokumentiert durch die signifikante Steigerung der Kohlendioxydproduktion, des Sauerstoffverbrauches und der rektal gemessenen Körpertemperatur stellt lediglich eine Bestätigung der Ergebnisse anderer Autoren für das adaptionsgestörte Neugeborene dar. Darüberhinaus kommt dem Noradrenalin als Regulator der Körpertemperatur, im Gegensatz zum Erwachsenen wesentliche Bedeutung zu.

#### Pharmakologische Tauglichkeit der Katecholamine:

##### 1. Adrenalin:

Adrenalin kann, im Gegensatz zu Noradrenalin, bei exakt gestellter Indikation auch beim adaptionsgestörten Neugeborenen therapeutisch eingesetzt werden. Seine Anwendung sollte allerdings der stark ausgeprägten Atemstimulation und der excitatorischen Wirkung auf das reizbildende Gewebe des Herzens wegen der Reanimation, z.B. bei Herzstillstand, vorbehalten bleiben. Der Einsatz bei anderen Indikationsstellungen sollte zumindest beim adaptionsgestörten Neugeborenen wegen der unerwünschten Begleitreaktionen zugunsten besser steuerbarer Präparate eingeschränkt bleiben.

## 2. Noradrenalin

Auch wenn, wie einleitend erwähnt, einzelne Autoren Noradrenalin zur Therapie des gehäuft bei Frühgeborenen anzutreffenden Hypotonus empfehlen, so scheint doch bei der Verwendung dieser Substanz am adaptionsgestörten Neugeborenen besondere Vorsicht geboten:

Wie unsere Ergebnisse beweisen, geht eine derartige Blutdruckkorrektur durch die negativ-chronotrope Wirkung des Noradrenalins zulasten der bereits mehr oder weniger gedrosselten Blutzirkulation. Damit kommt es zu einer stärkeren Sauerstoffausschöpfung des Blutes, die von dem erhöhten  $O_2$ -Bedarf des Gewebes, entsprechend der noradrenalin-stimulierten Stoffwechselvorgänge, überlagert wird. Zusammen mit der ansteigenden Rechts-Links-Kurzschlußdurchblutung, die wegen des erhöhten Lungengefäßwiderstandes zu erwarten ist, resultiert eine lebensbedrohende Verringerung des Sauerstoffgehaltes des arteriellen Blutes. Zu alledem kommt es durch die noradrenalin-typische, ausgeprägte Vasokonstriktion zu einer Drosselung der Durchblutung lebenswichtiger Organe, wie z.B. der Niere.

Diesen Fakten entsprechend ist die Therapie der adaptionsgestörten Neugeborenen mit dem vorwiegend  $\alpha$ -rezeptorenstimulierenden Noradrenalin nicht zu empfehlen.



## X. FORMELSAMMLUNG

Formeln zur Berechnung der Ventilationsgrößen (51)

$$a) \quad \dot{V}_E = \frac{\text{Spirometerhub} \times \text{Spirometerfaktor} \times \text{BTPS-Faktor}}{\text{Zeit}}$$

x Ventilfaktor (ml/min)

$$b) \quad V_T = \frac{\dot{V}_E}{F} \quad (\text{ml})$$

$$c) \quad \dot{V}_{O_2} = \frac{\dot{V}_E \times (pO_{2i} - pO_{2e})}{p\text{Bar.} - p\text{H}_2\text{O}} \quad (\text{ml/min})$$

$$d) \quad \dot{V}_{CO} = \frac{\dot{V}_E \times pCO_{2e}}{p\text{Bar.} - p\text{H}_2\text{O}} \quad (\text{ml/min})$$

$$e) \quad R_Q = \frac{\dot{V}_{CO_2}}{\dot{V}_{O_2}}$$

$$f) \quad \dot{V}_A = \frac{\dot{V}_{CO_2} \times (p\text{Bar} - p\text{H}_2\text{O})}{pCO_{2\text{alv}}} \quad (\text{ml/min})$$

$$g) \quad \dot{V}_D = \dot{V}_E - \dot{V}_A \quad (\text{ml/min})$$

$$h) \quad V_D = \frac{\dot{V}_D}{F} \quad (\text{ml})$$

$$i) \quad \dot{V}_{\text{Aphys}} = \frac{\dot{V}_{\text{CO}_2} \times (\text{pBar} - \text{pH}_2\text{O})}{\text{pCO}_{2\text{art.}}} \quad (\text{ml/min})$$

$$k) \quad \dot{V}_{\text{Dphys}} = \frac{\dot{V}_{\text{E}} - \dot{V}_{\text{Aphys}}}{F} \quad (\text{ml/min})$$

Bestimmung des Herzzeitvolumens nach dem FICKSCHEN Prinzip:

$$\dot{Q} = \frac{\dot{V}_{\text{O}_2}}{\text{AVDO}_2} \quad (\text{ml/kg} \times \text{min})$$

# Literaturverzeichnis

1. Adams, F.H., Lind, J. und Rauromo, L.: Physiologic studies on the cardio-vascular status of normal newborn infants: Effect of adrenaline, noradrenaline, 10% oxygen, and 100% oxygen. Et. Néonatal. 7, 62 (1958).
2. Adams, F.H., and J.Lind: Physiologic studies on the cardio-vascular status of normal newborn infants (with special reference to the ductus arteriosus). Pediatrics 19, 431 (1957).
3. Arndt, J.O., und G.Kober: Die Druck-Durchmesser-Beziehung der intakten A.femoralis des wachen Menschen und ihre Beeinflussung durch Noradrenalin-Infusionen. Pflügers Arch. 318, 130 (1970).
4. Aviado, D.M.: Sympatomimetic Drugs. Springfield, Charles C. Thomas. Publisher. Ed J. Adriani. (1970).
5. Bartels, H., K.Riegel, J.Wenner und K.H.Wulf: Atmung in der Perinatalzeit. Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New York.
6. Beer, R., H.Bartels und H.A. Raczkowski: Die Sauerstoffdissoziationskurve des fetalen Blutes und der Gasaustausch in der menschlichen Plazenta. Pflügers Arch. 260, 306 (1955).
7. Brown, R.J.K.: Respiratory difficulties at birth. Brit. med.J. 1959/1, 404.
8. Brumley, G.W., Hodson, W.A., and M.E.Avery: Lung phospholipids and surface tension correlations in infants with and without hyaline membrane disease, and in adults. Pediatrics 40, 13 (1967).

9. Cheek, D.B., M.Malinec, and J.M.Frillon: Plasma adrenalin and noradrenalin in the neonatal period and infants with respiratory distress syndrome and placental insufficiency. *Pediatrics* 31, 374 (1963).
10. Cheek, D.B., and R.D.Rowe: Aspects of sympathetic activity in the newborn, including the respiratory distress syndrome. *Pediat.Clin.N.Amer.* 13, 863 (1966).
11. Clements, J.A.: Surfactant in pulmonary disease. *New. Eng. J.Med.* 272, 1336 (1965).
12. Cohn, J.N.: Comparative cardiovascular effects of tyramine, ephedrine, and norepinephrine in man. *Circul. Res.* 26, 174 (1965).
13. Feldberg,W., R.D.Myers: Effects of temperature of amines injected into the cerebral ventricles. A new concept of temperature regulation: *J. Physiol.* 173, 226-237 (1964).
14. Fick, A.: Über die Messung des Blutquantums in den Herzventrikeln. *Sitzungsber. Physik.Ges.Würzburg*, 16 (1870).
15. Gluck,L.: Intrauterine diagnosis of RDS. XIII.Intern. Kongr.Pädiatrie, Kongreßberichte, Vol.I (Perinatology), Wien 1971, S. 53.
16. Golinko, R.J. and A.M.Rudolph: A valve for respiratory studies in infance. *Pediatrics* 27, 645 (1961).
17. Hall, R.T., and T.K. Oliver: Aortic blood pressure in infants admitted to a neonatal intensive care unit. *Amer.J.Dis.Child.* 121, 145 (1971).
18. Heistad, D.D., and R.C.Wheeler: Effect of acute hypoxia on vascular responsiveness in man. *J.Clin.Invest.* 49, 1252 (1970).

19. Himms-Hagen, J.: Sympatheic regulation of metabolism. *Pharmacol. Rev.* 19, 367 (1967).
20. Ivanhoe, F.: Pulmonary venoconstriction and the pharmacology of respiratory distress (letter). *Pediatrics*, 36, 451 (1965).
21. Karlberg, P., D. Cook, D. O'Brien, R. B. Cherry, and C. A. Smith: Studies of respiratory physiology in the newborn infant. II. Observations during and after respiratory distress. *Acta Paediat.* 43, Suppl. 100, 397 (1954).
22. Karlberg, P., R. E. Moore, and T. K. Oliver: The thermogenic response of the newborn infant to noradrenaline. *Acta Paediat. Scand.*, Suppl. 140, 53 (1963).
23. Karlberg, P., R. E. Moore, and T. K. Oliver: Thermogenic and cardiovascular responses of the newborn baby to noradrenaline. *Acta Paediat. Scand.* 54, 225 (1965).
24. Kittermann, J. A., R. H. Phibbs, and W. H. Tooley: Catheterization of umbilical vessels in newborn infants. *Pediatr. Clin. N. Amer.* 17, 895 (1970).
25. Kral, J. G., B. Ablad, P. B. Björntorp, L. Ek, and G. Johnson: Metabolic and cardiovascular effects of adrenaline and alprenolol (aptin) in human subjects. *Pharmacologia Clinica* 2, 40 (1969).
26. Künzli, H. F.: Zur Methode der Nullpunktbestimmung für die portale Druckmessung. *Schweiz. med. Wschr.* 100, 414 (1970).
27. Labrousse, Y., J. Raynaud: Action sur la ventilation de l'adrénaline et de la noradrénaline en perfusion intraveineuse continue chez l'homme. *J. Physiol.* (Paris) 51 (1959) 504.

28. Lang,V.O.: Die routinemäßige Blutdruckmessung bei Frühgeborenen und Säuglingen und ihre Bedeutung. 63. Beiheft Arch. Kinderheilk. "Pädiat.Intensivpflege", S. 80 (1971).
29. Linderkamp, : Hämatologische und hämodynamische Daten von Säuglingen und Kindern mit angeborenen Herzfehlern unter besonderer Berücksichtigung des Blutvolumens. Dissertation München (1974).
30. Mellander, S., and I.Nordenfelt: Comparative effects of dihydroergotamine and noradrenaline on resistance, exchange and capacitance functions in the peripheral circulation. Clin.Science 39, 183 (1970).
31. Nelson,N.M., L.S.Prod'hom, R.B.Cherry, P.J.Lipsitz, and C.A.Smith: Pulmonary function in the newborn infant. I. Methods: Ventilation and gaseous metabolism. Pediat., 30, 963 (1962).
32. Privitera,P.J., M.H.Loggie, and T.E.Gaffney: A comparison of cardiovascular adrenergic mechanism in neonatal and adult dogs. Pharmacologist 9, 199 (1967).
33. Prod'hom,L.S., H.Levison, R.B.Cherry, J.E.Drorbaugh, J.P.Hubbell, and C.A.Smith: Adjustment of ventilation, intrapulmonary gas exchange, and acid-base balance during the first day of life. Pediatrics 33, 682 (1964).
34. Rahn, H.,and A.B.Otis: Continuous analysis of alveolar gas composition during work, hyperpnoea, hypercapnia and anoxia. J. Appl.Physiol. 1, 717 (1949).

35. Riegel, K.P.: Respiratory gas transport characteristics of blood and hemoglobin. In: Physiology of the perinatal period. Vol.I. New York: Appleton-Century-Crofts 1970. Ed.: U.Stave.
36. Riegel, K. und U.Ahnen: Eine objektive Beurteilung von Risikoneugeborenen mit gestörter kardiopulmonaler Adaptation. Mschr.Kinderheilk. 119, 73 (1971).
37. Riegel, K.P.: Criteria of respiratory insufficiency. In: Intensivpflege bei Neugeborenen. G.Thieme Verlag Stuttgart, 1971.
38. Rosenthal, T.B.: The effect of temperature on the pH of blood and plasma in vitro. J.Biol.Chem. 173, 25 (1948).
39. Rudolph, A.M., J.E.Drorbaugh, P.A.M.Auld, A.J.Rudolph, A.S.Nadas, C.A.Smith, and J.P.Hubbell: Studies on the circulation in the neonatal period. The circulation in the respiratory distress syndrome. Pediatrics 27, 551 (1961).
40. Sachs, L.: Statistische Auswertungsmethoden. 2. Auflage, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New York 1969.
41. Schiff, D., L.Stern, and J.Leduc: Chemical thermogenesis in newborn infants: catecholamine excretion and the plasma non-esterified fatty acid response to cold exposure. Pediatrics 37, 577 (1966).
42. Schöber, J.G.: Vitale Funktionsgrößen des adaptations-gestörten Neugeborenen und ihre pharmakologische Beeinflussung. Habil.Schrift München 1972.

43. Severinghaus, J.W.: In: Blood and other body fluids.  
Washington, D.C. Fed.Amer.Soc.Exp.Biology 1961,  
p.166.
44. Stahlman, M., F.M.Shepard, W.C.Young, J.Gray, W.Blan-  
kenship: Assessment of the cardiovascular sta-  
tus of infants with hyaline membrane disease.  
In: Cassels, D.E. (ed.): The heart and circula-  
tion in the newborn infant. New York, Grune and  
Stratton, 1966, p. 121.
45. Stephenson, J.M., J.N.Du, and T.K. Oliver: The effect  
of cooling on blood gas tension in newborn in-  
fants. J.Pediatrics 76, 848 (1970).
46. Stern, L., E.W.Outerbridge, and J.Leduc: Urinary cate-  
cholamine levels in infants with hyaline membra-  
ne disease. Kongreßber. XIII.Intern.Kongr.f.  
Pädiatrie, Wien 1971, Vol.IX (Perinatology and  
Pulmonology), S. 373.
47. Walsh, S.Z., and J.Lind: The dynamics of the fetal  
heart and circulation and its alteration at  
birth. In: Physiology of the perinatal period.  
Vol.I. New York: Appleton-Century-Crofts 1970.  
Ed.: U.Stave.
48. Weibel, E.R. und J.Gil: Morphologie der Alveolarober-  
fläche. Pneumonologis 144, 159 (1971).
49. Wetterer, E. und Th.Kenner: Grundlagen der Dynamik des  
Arterienpulses. Springer-Verlag, Berlin-Heidel-  
berg-New York 1968, S. 289.
50. Wilcoxon, F.: Biometrics 3, 119 (1947). (Zit. nach  
Geigy, Wissensch.Tab.)

## Nachtrag:

51. Schöber, J.G.: Atmung, Kreislauf und ihre pharmakologische Beeinflussung. Urban und Schwarzenberg 1975, S. 13
52. Moore, R.E.: Control of heart production in the newborn mammal: role of noradrenaline and mode of action. Fed.Proc. 22, 920 (1963)

Verzeichnis der im Text und in den Diagrammen benützten Abkürzungen .

---

### a. Atemfunktionsparameter

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| $F$                             | = Atemzüge pro Minute                           |
| $V_T$                           | = Atemzugvolumen                                |
| $\dot{V}_E$                     | = Atemminutenvolumen                            |
| $V_D$                           | = Anatomischer Totraum                          |
| $\dot{V}_D$                     | = Totraumventilation pro Min.                   |
| $V_D/V_T$                       | = Anatomischer Totraum pro Atemzugvolumen       |
| $\dot{V}_A$                     | = Alveoläre Ventilation pro Min.                |
| $\dot{V}_{Aphys}$               | = Physiologische alveoläre Ventilation pro Min. |
| $V_{Dphys}$                     | = Physiol. Totraum                              |
| $V_{Dphys}/V_T$                 | = Physiol. Totraum pro Atemzugvolumen           |
| $\dot{V}_{Aphys}/\dot{V}_{O_2}$ | = Alveol. Atemäquivalent                        |
| $pO_{2i}$                       | = Sauerstoffpartialdruck der Inspirationsluft   |
| $pO_{2e}$                       | = $O_2$ -Partialdruck der Expirationsluft       |
| $FiO_2$                         | = Inspiratorische $O_2$ -Konzentration          |
| $pO_{2alv}$                     | = $O_2$ -Partialdruck der Alveolarluft          |
| $pCO_{2e}$                      | = Kohlendioxyd-Partialdruck der Ausatemluft     |
| $pCO_{2alv}$                    | = $CO_2$ -Partialdruck der Alveolarluft         |
| $\dot{V}_{O_2}$                 | = $O_2$ -Verbrauch pro Min.                     |
| $\dot{V}_{CO_2}$                | = $CO_2$ -Produktion pro Min.                   |
| $RQ$                            | = Respiratorischer Quotient                     |
| $AVDO_2$                        | = Arteriovenöse $O_2$ -Differenz                |
| $AaDCO_2$                       | = Arterio-alveoläre $CO_2$ -Differenz           |

b. Kreislaufparameter

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| f       | = Pulsfrequenz pro Minute        |
| SV      | = Herzschlagvolumen              |
| HMV     | = Herzminutenvolumen             |
| $Q_t$   | = Herzzeitvolumen                |
| TPR     | = Gesamter peripherer Widerstand |
| Hk      | = Hämatokrit                     |
| Temp.   | = Temperatur rektal gemessen     |
| pBar    | = Barometerdruck                 |
| $pH_2O$ | = Wasserdampfdruck               |
|         |                                  |
| NG      | = Neugeborenes                   |
| m       | = männlich                       |
| w       | = weiblich                       |

Klinische Angaben zu den untersuchten Neugeborenen und ihre Eingliederung in zwei Gruppen aufgrund des Discriminant Score von RIEGEL und AHNEN.

1. Neugeborene mit leichten und vorübergehenden Adaptationsstörungen. ( Gruppe I n = 10; Discr.Score 5110 )
2. Neugeborene mit schwereren cardiorespiratorischen Adaptationsstörungen. ( Gruppe II n = 11 ; Discr.Score 5110 )

Gruppe I  
Tabelle 1a

| Kind<br>Nr. | Geschl. | Geb.<br>Gew.(g) | K <sup>+</sup><br>bei | pH<br>Aufnahme | Temp. | pO <sub>2</sub><br>bei Hyperox. | Discr.<br>Score |
|-------------|---------|-----------------|-----------------------|----------------|-------|---------------------------------|-----------------|
| 1           | m       | 3540            | 5,4                   | 7,33           | 35,6  | 155                             | 5185            |
| 2           | m       | 2700            | 4,8                   | 7,36           | 36,1  | 300                             | 5134            |
| 3           | m       | 3200            | 5                     | 7,38           | 37,2  | 450                             | 5462            |
| 4           | w       | 2500            | 3,9                   | 7,44           | 36    | 310                             | 5196            |
| 5           | w       | 3600            | 5                     | 7,38           | 36,8  | 150                             | 5204            |
| 6           | m       | 3230            | 4,1                   | 7,19           | 35,8  | 250                             | 5171            |
| 7           | w       | 3260            | 4,1                   | 7,4            | 36,8  | 310                             | 5365            |
| 8           | m       | 2180            | 5                     | 7,36           | 36,5  | 470                             | 5244            |
| 9           | w       | 3230            | 5,6                   | 7,34           | 36,1  | 370                             | 5110            |
| 10          | m       | 2660            | 4,1                   | 7,25           | 35    | 350                             | 5132            |

Tabelle 1 b

| Kind<br>Nr. | Geb.Tag | Schw.<br>wo. | Entbindungs-<br>methode | HK<br>Geb.<br>(%) | 1  | Apgar<br>5<br>(min) |    | Überleb.<br>Wahrsch.<br>(%) |
|-------------|---------|--------------|-------------------------|-------------------|----|---------------------|----|-----------------------------|
| 1           | 4.3.71  | 42           | Sectio<br>(2.Querl.)    | 40                | 2  | 7                   | 10 | 100                         |
| 2           | 5.3.71  | 40           | Sectio<br>(Beckenendl.) | 53                | 2  | 5                   | 6  | 100                         |
| 3           | 15.3.71 | 36           | Sectio                  | 65                | 4  | 8                   | -  | 100                         |
| 4           | 24.3.71 | 40           | Spontangeb.             | 50                | 2  | -                   | 8  | 100                         |
| 5           | 4.4.71  | 40           | Sectio                  | -                 | 2  | 8                   | -  | 100                         |
| 6           | 17.4.71 | 38           | Spontangeb.             | 60                | 5  | 10                  | -  | 100                         |
| 7           | 4.5.71  | 41           | Sectio                  | 51                | 2  | 8                   | -  | 100                         |
| 8           | 18.5.71 | 37           | Spontangeb.             | 67                | 10 | -                   | -  | 100                         |
| 9           | 24.5.71 | 40           | Spontangeb.             | 66                | 3  | -                   | -  | 100                         |
| 10          | 11.6.71 | 40           | Sectio                  | 43                | 2  | 4                   | 6  | 100                         |

Tabelle 1 c

| Kind<br>Nr. | Haupt-<br>diagnose    | Alter<br>z.Zt.d.<br>(std) | Allg.Zust.<br>d.Messung                | Inku-<br>bator | Länge<br>(cm) | HK<br>Versuch<br>(%) |
|-------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|
| 1           | Kardio-<br>megalie    | 5                         | Guter AZ                               |                | 53            | 64                   |
| 2           | Atemnot-<br>syndrom   | 9                         | leicht<br>cyanotisch                   | +              | 47            | 51                   |
| 3           | Postpart.<br>Asphyxie | 3<br>25                   | Guter AZ<br>"                          | +              | 48            | 65<br>-              |
| 4           | Postpart.<br>Asphyxie | 20<br>23                  | Guter AZ<br>"                          | +              | -             | 61<br>56             |
| 5           | Postpart.<br>Asphyxie | 15<br>17<br>28            | Apnoeanfälle<br>Cyanotisch<br>Guter AZ | +              | 52            | 49<br>-<br>-         |
| 6           | Ikterus<br>gravis     | 29<br>34                  | leicht cyan.<br>Guter AZ               | +              | 47            | 64<br>63             |
| 7           | Postpart.<br>Asphyxie | 9<br>13                   | Guter AZ<br>"                          | +              | 55            | 50<br>49             |
| 8           | Mangel-<br>geburt     | 4<br>17                   | Guter AZ<br>"                          | +              | -             | 52<br>52             |
| 9           | Postpart.<br>Asphyxie | 16                        | Guter AZ                               |                | 49            | 52                   |
| 10          | Postpart.<br>Asphyxie | 5                         | Cyanotisch                             | +              | 48            | 46                   |

## Gruppe II

Tabelle 2a

| Kind<br>Nr. | Geschl. | Geb.Gew.<br>(g) | K <sup>+</sup> | pH   | Temp. | pO <sub>2</sub><br>bei Hyperox. | Discr.<br>Score |
|-------------|---------|-----------------|----------------|------|-------|---------------------------------|-----------------|
|             |         |                 | bei Aufnahme   |      |       |                                 |                 |
| 11          | m       | 2020            | 5,3            | 7,56 | 34,4  | 200                             | 5008            |
| 12          | w       | 3200            | 3,9            | 7,23 | 34,9  | 140                             | 5014            |
| 13          | w       | 1400            | 6,1            | 7,31 | 35,2  | 100                             | 4565            |
| 14          | w       | 2750            | 6,3            | 7,3  | 34,3  | 140                             | 4763            |
| 15          | w       | 2350            | 5              | 7,4  | 36,2  | 200                             | 4997            |
| 16          | w       | 2140            | 4,1            | 7,38 | 35,6  | 340                             | 5100            |
| 17          | m       | 2250            | 4,4            | 7,25 | 36,2  | 150                             | 4916            |
| 18          | m       | 2150            | 4,7            | 7,29 | 37,2  | 255                             | 5059            |
| 19          | w       | 2200            | 5,2            | 7,31 | 35,8  | 230                             | 4932            |
| 20          | m       | 2750            | 5,9            | 7,38 | 36,4  | 130                             | 4951            |
| 21          | w       | 3230            | 5,6            | 7,34 | 36,1  | 370                             | 5110            |

Tabelle 2 b

| Kind<br>Nr. | Geb.Tag  | Schw.<br>Wo. | Entbindungs-<br>methode     | HK<br>Geb. 1<br>(%) | Apgar<br>5 10<br>(min) |    |    | Überleb.<br>Wahrsch. |
|-------------|----------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|----|----|----------------------|
| 11          | 9.10.70  | 40           | Sectio<br>(2.Zwilling)      | 56                  | 1                      | 5  | -  | 98                   |
| 12          | 16. 2.71 | 38           | Spontangeb.                 | -                   | 3                      | 6  | 9  | 98                   |
| 13          | 23. 2.71 | 35           | Spontangeb.                 | 42                  | 7                      | 8  | -  | 34                   |
| 14          | 11. 4.71 | 36           | Spontangeb.<br>(1.Zwilling) | 34                  | 1                      | 5  | -  | 50                   |
| 15          | 19. 4.71 | 36           | Spontangeb.                 | 57                  | 8                      | 10 | -  | 98                   |
| 16          | 22. 4.71 | 35           | Sectio<br>(Schädellg.)      | 76                  | 8                      | 9  | -  | 100                  |
| 17          | 12. 5.71 | 36           | Sectio                      | 60                  | 9                      | 9  | 10 | 92                   |
| 18          | 21. 5.71 | 33           | Spontangeb.                 | 51                  | 10                     | -  | -  | 100                  |
| 19          | 21. 5.71 | 38           | Spontangeb.                 | 70                  | -                      | 10 | -  | 95                   |
| 20          | 24. 5.71 | 40           | Spontangeb.                 | -                   | 8                      | 10 | -  | 96                   |
| 21          | 24. 5.71 | 40           | Spontangeb.                 | 67                  | 3                      | -  | -  | 100                  |

Tabelle 2 c

| Kind<br>Nr. | Haupt-<br>diagnose    | Alter<br>(std)<br>z.Zt.d.Messung | Allg.Zust.                         | Inku-<br>bator | Länge<br>(cm) | HK<br>Versuch<br>(%) |
|-------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|
| 11          | Atemnot-<br>syndrom   | 100                              | zerebral<br>geschädigt<br>Krämpfe  | +              | -             | 48                   |
| 12          | Atemnot-<br>syndrom   | 49                               | Cyanotisch                         |                | 48            | -                    |
| 13          | Atemnot-<br>syndrom   | 60                               | Apnoe-<br>anfälle<br>cyanotisch    | +              | -             | 42                   |
| 14          | Down-<br>syndrom      | 5                                | Apnoeeanfälle                      | +              | 46            | 40                   |
| 15          | Frühgeburt            | 17<br>21                         | Guter AZ<br>" "                    | +              | 44            | 59<br>-              |
| 16          | Frühgeburt            | 40<br>43                         | Tachipnoe<br>Guter AZ              | +              | 46            | -<br>-               |
| 17          | Atemnotsyn-<br>drom   | 26<br>29<br>38<br>41             | Cyanotisch<br>"<br>Guter AZ<br>" " | +              | 46            | 43<br>-<br>-<br>-    |
| 18          | Atemnot-<br>syndrom   | 50                               | Guter AZ                           | +              | 39            | -                    |
| 19          | Down-<br>syndrom      | 2                                | Guter AZ                           |                | 45            | 63                   |
| 20          | Ikterus<br>gravis     | 4<br>8                           | Guter AZ<br>" "                    |                | 49            | -<br>-               |
| 21          | Postpart.<br>Asphyxie | 21                               | Cyanotisch                         | +              | 51            | 52                   |

Tabellen über Atmungs- und Kreislaufparameter der einzelnen Frühgeborenen und Neugeborenen vor, während und nach Applikation von Adrenalin.

Tabelle 3

Kind Nr. 1 Geschl.: m Geb. Discr. Überleb.  
Gew.: 3540 Score: 5185 Wahrsch.: 100 %

|                  | Vor Adrenalin |       | Unter Adrenalininfusion |       |       | Nach Adrenalin |       |
|------------------|---------------|-------|-------------------------|-------|-------|----------------|-------|
| ug/kg/min        |               |       | 0,05                    | 0,1   | 0,2   |                |       |
| Zeit(min)        | -30           | -10   | 15                      | 30    | 45    | 70             | 85    |
| F                | 81            | 77    | 71                      | 88    | 86    | 60             | 68    |
| $V_T$            | 3,49          | 4,43  | 5,77                    | 5,74  | 5,59  | 5,39           | 5,33  |
| $\dot{V}_E$      | 283           | 341   | 407                     | 505   | 481   | 324            | 362   |
| $V_D$            | 0,78          | 1,74  | 2,22                    | 1,69  | 2,66  | 1,76           | 1,8   |
| $\dot{V}_D$      | 64            | 134   | 157                     | 149   | 229   | 106            | 122   |
| $V_D/V_T$        | 0,225         | 0,392 | 0,385                   | 0,296 | 0,476 | 0,326          | 0,339 |
| $\dot{V}_A$      | 219           | 208   | 251                     | 355   | 252   | 218            | 239   |
| $\dot{V}_{O_2}$  | 5,57          | 6,38  | 13,08                   | 7,67  | 12,21 | 9,35           | 11,48 |
| $\dot{V}_{CO_2}$ | 5,64          | 6,71  | 8,91                    | 10,89 | 8,58  | 7,95           | 8,73  |
| RQ               | 1,01          | 1,05  | 0,68                    | 1,41  | 0,7   | 0,85           | 0,76  |
| $pCO_{2,alv}$    | 21,7          | 19    | 23,9                    | 20,6  | 22,9  | 24,5           | 24,5  |
| Temp             | 37,2          | 37,2  | 37,5                    | 37,7  | 37,7  | 37,6           | 37,5  |
| f                | 136           | 136   | 152                     | 156   | 156   | 132            | 136   |

Tabelle 4

Kind Nr. 2 Geschl.: m Geb. Discr. Überleb.  
Gew.: 2700 Score: 5134 Wahrsch.: 100 %

|                                  | Vor Adrenalin |       | Unter Adrenalininfusion |       |       | Nach Adrenalin |             |
|----------------------------------|---------------|-------|-------------------------|-------|-------|----------------|-------------|
| ug/kg/min                        |               |       | 0,05                    | 0,1   | 0,2   |                |             |
| Zeit(min)                        | -50           | -30   | -10                     | 15    | 30    | 45             | 70 85       |
| $\dot{V}_{A,phys}$               | 171           | 152   | 174                     | 187   | 184   | 168            | 176 169     |
| $V_{D,phys}$                     | 2,07          | 1,99  | 2,46                    | 1,78  | 2,58  | 2,02           | 2,06 2,02   |
| $V_{D,phys}/V_T$                 | 0,504         | 0,494 | 0,546                   | 0,524 | 0,529 | 0,554          | 0,474 0,486 |
| $\dot{V}_{A,phys}/\dot{V}_{O_2}$ | 15,8          | 34,2  | 49,8                    | 46,5  | 24,5  | 48             | 40,5 33,4   |
| Aa $\dot{V}_{CO_2}$              | -             | 15,5  | 12,0                    | 12,7  | 16,5  | 21,7           | 9,6 12,5    |
| SV                               | -             | 0,60  | 0,55                    | 0,97  | 1,3   | 1,17           | 1,36 1,29   |
| HMV                              | -             | 108   | 84                      | 155   | 214   | 193            | 217 213     |
| TPR                              | -             | 15,25 | 16,13                   | 26,38 | 20,9  | 24,45          | 19,6 19,95  |

Tabelle 5

|                                |               |       |      |                         |             |       |                 |       |       |
|--------------------------------|---------------|-------|------|-------------------------|-------------|-------|-----------------|-------|-------|
| Kind Nr. 3                     | Geschl.: m    |       |      | Geb.                    | Discr.      |       | Überleb.        |       |       |
|                                |               |       |      | Gew.: 3200              | Score: 5462 |       | Wahrsch.: 100 % |       |       |
|                                | Vor Adrenalin |       |      | Unter Adrenalininfusion |             |       | Nach Adrenalin  |       |       |
| ug/kg/min                      |               |       |      | 0,05                    | 0,1         | 0,2   |                 |       |       |
| Zeit(min)                      | -50           | -30   | -10  | 15                      | 30          | 45    | 70              | 85    | 110   |
| F                              | 55            | 60    | 62   | 69                      | 69          | 71    | 49              | 51    | 40    |
| V <sub>T</sub>                 | 3,45          | 4,05  | 4,07 | 3,18                    | 3,65        | 4,21  | 4,19            | 4,03  | 5,76  |
| $\dot{V}_E$                    | 190           | 243   | 252  | 218                     | 252         | 299   | 206             | 206   | 230   |
| V <sub>D</sub>                 | 0,72          | 0,8   | 0,65 | 0,54                    | 0,66        | 0,91  | 0,89            | 0,75  | 0,63  |
| $\dot{V}_D$                    | 40            | 48    | 40   | 37                      | 45          | 65    | 44              | 38    | 25    |
| V <sub>D</sub> /V <sub>T</sub> | 0,208         | 0,196 | 0,16 | 0,171                   | 0,179       | 0,216 | 0,212           | 0,185 | 0,109 |
| $\dot{V}_A$                    | 150           | 195   | 212  | 181                     | 207         | 234   | 162             | 167   | 205   |
| pO <sub>2i</sub>               | 225           | 225   | 225  | 240                     | 245         | 220   | 235             | 230   | 245   |
| pO <sub>2e</sub>               | 205           | 203   | 202  | 201                     | 215         | 102   | 199             | 210   | 220   |
| FiO <sub>2</sub>               | 34,2          | 33,3  | 34,2 | 36,5                    | 37,2        | 33,4  | 36,7            | 35    | 37,2  |
| pO <sub>2alv</sub>             | 200           | 195   | 195  | 200                     | 210         | 199   | 191             | 199   | 210   |
| pCO <sub>2e</sub>              | 20,5          | 20,0  | 21   | 19,9                    | 20,5        | 18,8  | 21,2            | 22    | 24,5  |
| pCO <sub>2alv</sub>            | 25,9          | 24,9  | 25   | 24                      | 25          | 24    | 26,9            | 27    | 27,5  |
| $\dot{V}_{O_2}$                | 5,79          | 5,95  | 8,85 | 12,99                   | 11,43       | 8,25  | 13,37           | 6,35  | 8,68  |
| $\dot{V}_{CO_2}$               | 5,91          | 7,38  | 8,05 | 6,59                    | 7,86        | 8,54  | 6,62            | 6,87  | 8,58  |
| RQ                             | 1,02          | 1,24  | 0,91 | 0,51                    | 0,69        | 1,03  | 0,5             | 1,08  | 0,99  |
| Temp                           | 37            | 37,1  | 37,1 | 37,2                    | 37,2        | 37,4  | 37,3            | 37,2  | 37,1  |
| f                              | 140           | 140   | 140  | 148                     | 148         | 152   | 136             | 136   | 136   |

Tabelle 6 a

Kind Nr. 4 Geschl: w Geb. Discr. Überleb.  
(Versuch 1) Gew.: 2500 Score: 5196 Wahrsch: 100 %

|                                 | Vor Adrenalin |      |       | Unter Adrenalininfusion |       |       | Nach Adrenalin |       |      |
|---------------------------------|---------------|------|-------|-------------------------|-------|-------|----------------|-------|------|
| ug/kg/min                       |               |      |       | 0,05                    | 0,1   | 0,2   |                |       |      |
| Zeit(min)                       | -50           | -30  | -10   | 15                      | 30    | 45    | 70             | 85    | 110  |
| F                               | 42            | 50   | 42    | 49                      | 64    | 78    | 56             | 56    | 56   |
| $V_T$                           | 5,56          | 4,03 | 4,8   | 4,3                     | 4,24  | 4,64  | 4,57           | 3,87  | 4,22 |
| $\dot{V}_E$                     | 234           | 210  | 201   | 211                     | 271   | 362   | 256            | 217   | 236  |
| $V_D$                           | 1,51          | 1,09 | 1,31  | 0,89                    | 0,68  | 1,15  | 1,33           | 1,13  | 1,13 |
| $\dot{V}_D$                     | 63            | 54   | 58    | 44                      | 43    | 90    | 75             | 64    | 69   |
| $V_D/V_T$                       | 0,271         | 0,27 | 0,27  | 0,21                    | 0,16  | 0,249 | 0,29           | 0,293 | 0,27 |
| $\dot{V}_A$                     | 170           | 146  | 146   | 167                     | 228   | 271   | 182            | 153   | 153  |
| $\dot{V}_{Aphys}$               | 146           | -    | 133   | 149                     | 162   | 187   | 131            | 145   | -    |
| $V_{Dphys}$                     | 2,22          | -    | 1,7   | 1,25                    | 1,82  | 1,87  | 1,31           | 1,2   | -    |
| $V_{Dphys}/V_T$                 | 0,472         | -    | 0,334 | 0,37                    | 0,403 | 0,485 | 0,49           | 0,332 | -    |
| $\dot{V}_{Aphys}/\dot{V}_{O_2}$ | 14,7          | -    | 17,8  | 14,8                    | 15,6  | 16,4  | 15,5           | 20,3  | -    |
| $pCO_{2alv}$                    | 29,1          | 30,7 | 29,8  | 26,5                    | 25    | 24    | 28,2           | 28,3  | 28,3 |
| $\dot{V}_{O_2}$                 | 8,39          | 7,47 | 7,93  | 8,84                    | 13,41 | 11,36 | 8,43           | 5,03  | 8,4  |
| $\dot{V}_{CO_2}$                | 7,41          | 6,69 | 7,05  | 6,64                    | 8,53  | 9,75  | 7,67           | 4,5   | 7,07 |
| RQ                              | 0,88          | 0,89 | 0,88  | 0,75                    | 0,64  | 0,85  | 0,91           | 0,92  | 0,84 |
| Temp                            | 37,1          | 36,8 | 37,0  | 37,1                    | 37,1  | 37,2  | 37             | 37    | 37   |
| SV                              | 1,08          | 1,44 | 1,41  | 1,08                    | 1,38  | 1,45  | 0,94           | 1,62  | 1,67 |
| HMV                             | 198           | 183  | 178   | 130                     | 166   | 175   | 112            | 166   | 191  |
| TPR                             | 21,03         | 21,9 | 24,3  | 28,3                    | 22,6  | 22,41 | 22,5           | 23,65 | 26   |

(Versuch 2)

Tabelle 6 b

|                                 |   |       |       |       |       |       |       |      |   |
|---------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---|
| $\dot{V}_{Aphys}$               | - | 124   | 107   | 109   | 117   | 115   | 117   | 124  | - |
| $V_{Dphys}$                     | - | 2,63  | 1,35  | 1,5   | 1,71  | 2,25  | 2,25  | 1,29 | - |
| $V_{Dphys}/V_T$                 | - | 0,459 | 0,567 | 0,471 | 0,503 | 0,526 | 0,423 | 0,38 | - |
| $\dot{V}_{Aphys}/\dot{V}_{O_2}$ | - | 18,1  | 14,9  | 14,8  | 17,5  | 16,7  | 18,3  | 17,7 | - |
| $AaDO_2$                        | - | 10,7  | 8,7   | 10,5  | 9,9   | 10,7  | 10,8  | 8,4  | - |
| SV                              | - | 1,65  | 1,66  | 2,05  | 2,52  | 2,31  | 1,83  | 1,25 | - |
| HMV                             | - | 205   | 182   | 250   | 328   | 277   | 212   | 175  | - |
| TPR                             | - | 21,1  | 21,9  | 17,2  | 22    | 14,7  | 17,35 | 22,4 | - |

Tabelle 7

Kind Nr. 5    Geschl.: w    Geb.    Discr.    Überleb.  
                                  Gew.: 3600    Score: 5204    Wahrsch.: 100 %

|                      | Vor Adrenalin |       |       | Unter Adrenalininfusion |       |       | Nach Adrenalin |      |       |
|----------------------|---------------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|----------------|------|-------|
| $\mu\text{g/kg/min}$ |               |       |       | 0,05                    | 0,1   | 0,2   |                |      |       |
| Zeit(min)            | -50           | -30   | -10   | 15                      | 30    | 45    | 70             | 85   | 110   |
| F                    | 66            | 58    | 62    | 72                      | 66    | 75    | 69             | 71   | 65    |
| $V_T$                | 3,76          | 3,99  | 3,77  | 4,28                    | 4,21  | 4,14  | 3,17           | 3,08 | 3,7   |
| $\dot{V}_E$          | 247           | 232   | 234   | 308                     | 278   | 310   | 219            | 219  | 240   |
| $V_D$                | 1,08          | 0,85  | 1,14  | 1,13                    | 1,02  | 1,5   | 0,96           | 0,56 | 1,15  |
| $\nabla_D$           | 71            | 49    | 71    | 81                      | 68    | 112   | 66             | 39   | 75    |
| $V_D/V_T$            | 0,288         | 0,213 | 0,303 | 0,263                   | 0,243 | 0,362 | 0,302          | 0,18 | 0,311 |
| $\dot{V}_A$          | 176           | 182   | 163   | 227                     | 210   | 198   | 152            | 179  | 166   |
| $pO_2^e$             | 124           | 126   | 128   | 125                     | 128   | 124   | 128            | 128  | 126   |
| $pO_2^{\text{alv}}$  | 115           | 121   | 120   | 119                     | 113   | 111   | 116            | 120  | 114   |
| $pCO_2^e$            | 18,6          | 21    | 19,3  | 20,7                    | 20,5  | 18,3  | 20,3           | 20   | 19,3  |
| $pCO_2^{\text{alv}}$ | 26,2          | 26,7  | 27,7  | 28,1                    | 27,1  | 28,6  | 29,1           | 24,4 | 28    |
| $\dot{V}_{O_2}$      | 9,91          | 9,41  | 7,95  | 11,86                   | 9,43  | 12,29 | 7,21           | 7,1  | 8,72  |
| $\dot{V}_{CO_2}$     | 6,94          | 7,33  | 6,79  | 9,61                    | 8,57  | 8,53  | 6,68           | 6,58 | 6,99  |
| RQ                   | 0,7           | 0,87  | 0,86  | 0,81                    | 0,91  | 0,69  | 0,93           | 0,93 | 0,8   |
| Temp                 | 37            | 37,1  | 37,1  | 37,2                    | 37,2  | 37,2  | 37,1           | 37,1 | 37,1  |
| f                    | 100           | 105   | 110   | 138                     | 160   | 170   | 135            | 132  | 132   |

Tabelle 8

Kind Nr. 6 Geschl.: m Geb. Discr. Überleb.  
Gew.: 3230 Score: 5171 Wahrsch.: 100 %

|                      | Vor Adrenalin |      |       | Unter Adrenalininfusion |       |       | Nach Adrenalin |       |       |
|----------------------|---------------|------|-------|-------------------------|-------|-------|----------------|-------|-------|
| $\mu\text{g/kg/min}$ |               |      |       | 0,05                    | 0,1   | 0,2   |                |       |       |
| Zeit(min)            | -50           | -30  | -10   | 15                      | 30    | 45    | 70             | 85    | 110   |
| F                    | 50            | 50   | 48    | 65                      | 66    | 66    | 54             | 44    | 55    |
| $V_T$                | 2,07          | 2,53 | 2,39  | 3,01                    | 4,01  | 4,01  | 3,46           | 3,07  | 2,71  |
| $\dot{V}_E$          | 104           | 127  | 115   | 196                     | 265   | 265   | 187            | 135   | 150   |
| $V_D$                | 0,3           | 0,15 | 0,28  | 0,54                    | 0,83  | 1,06  | 0,59           | 0,5   | 0,51  |
| $\dot{V}_D$          | 15            | 8    | 13    | 35                      | 55    | 70    | 32             | 22    | 28    |
| $V_D/V_T$            | 0,143         | 0,06 | 0,116 | 0,179                   | 0,208 | 0,265 | 0,169          | 0,161 | 0,186 |
| $\dot{V}_A$          | 89            | 119  | 102   | 160                     | 210   | 195   | 155            | 113   | 122   |
| $pO_2^i$             | 155           | 155  | 156   | 157                     | 156   | 155   | 155            | 155   | 155   |
| $pO_2^e$             | 121           | 123  | 125   | 129                     | 131   | 133   | 122            | 126   | 127   |
| $FIO_2$              | 23            | 23   | 23,2  | 23,3                    | 23,2  | 23    | 23             | 23    | 23    |
| $pO_2^{\text{alv}}$  | 110           | 124  | 115   | 122                     | 122   | 116   | 108            | 112   | 116   |
| $pCO_2^e$            | 24            | 22   | 23,5  | 21,5                    | 20,2  | 20    | 23             | 26,5  | 24    |
| $pCO_2^{\text{alv}}$ | 28            | 27,3 | 26,6  | 26,2                    | 25,5  | 27,2  | 27,7           | 31,6  | 29,5  |
| $\dot{V}_{O_2}$      | 5,35          | 5,89 | 5,32  | 6,18                    | 9,81  | 8,78  | 9,25           | 5,78  | 6,17  |
| $\dot{V}_{CO_2}$     | 3,69          | 4,14 | 4,02  | 6,24                    | 7,94  | 7,86  | 6,38           | 5,32  | 5,33  |
| RQ                   | 0,69          | 0,69 | 0,75  | 1,01                    | 0,81  | 0,89  | 0,69           | 0,92  | 0,86  |
| Temp                 | 36,4          | 36,4 | 36,5  | 36,5                    | 36,6  | 36,7  | 36,6           | 36,5  | 36,5  |
| f                    | 120           | 120  | 120   | 118                     | 120   | 122   | 106            | 116   | 116   |

Tabelle 9

Kind Nr. 7 Geschl.: w Geb. Discr. Überleb.  
Gew.: 3260 Score: 5365 Wahrsch.: 100 %

|                                        | Vor Adrenalin |       |       | Unter Adrenalininfusion |       |       | Nach Adrenalin |       |       |
|----------------------------------------|---------------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|----------------|-------|-------|
| $\mu\text{g/kg/min}$                   |               |       |       | 0,05                    | 0,1   | 0,2   |                |       |       |
| Zeit(min)                              | -50           | -30   | -10   | 15                      | 30    | 45    | 70             | 85    | 110   |
| F                                      | 53            | 49    | 43    | 50                      | 56    | 53    | 54             | 51    | 49    |
| $V_T$                                  | 4,23          | 5,12  | 5,67  | 5,64                    | 6,26  | 6,24  | 5,96           | 6,09  | 5,12  |
| $\dot{V}_E$                            | 224           | 251   | 246   | 279                     | 350   | 331   | 322            | 310   | 251   |
| $V_D$                                  | 0,32          | 0,83  | 1,14  | 0,98                    | 1,62  | 1,31  | 1,32           | 1,09  | 0,98  |
| $\dot{V}_D$                            | 17            | 41    | 49    | 49                      | 90    | 70    | 71             | 55    | 48    |
| $V_D/V_T$                              | 0,075         | 0,161 | 0,201 | 0,174                   | 0,258 | 0,21  | 0,22           | 0,179 | 0,191 |
| $\dot{V}_A$                            | 206           | 210   | 197   | 231                     | 258   | 261   | 252            | 253   | 203   |
| $\dot{V}_{A\text{phys}}$               | -             | 180   | 195   | 202                     | 235   | 208   | 210            | 214   | -     |
| $V_{D\text{phys}}$                     | -             | 1,37  | 1,15  | 1,56                    | 2,03  | 2,44  | 2,08           | 1,86  | -     |
| $V_{D\text{phys}}/V_T$                 | -             | 0,249 | 0,225 | 0,277                   | 0,322 | 0,39  | 0,348          | 0,305 | -     |
| $\dot{V}_{A\text{phys}}/\dot{V}_{O_2}$ | -             | 12,9  | 13,1  | 12,5                    | 12,4  | 12,0  | 11,4           | 11,4  | -     |
| $p\text{CO}_{2\text{alv}}$             | 20            | 22,5  | 21,9  | 21,8                    | 23,2  | 20,9  | 19,5           | 19,5  | 19,5  |
| $\dot{V}_{O_2}$                        | 13,43         | 15,55 | 14,21 | 16,12                   | 21,11 | 18,32 | 19,07          | 18,69 | 14,83 |
| $\dot{V}_{\text{CO}_2}$                | 6,27          | 7,34  | 6,57  | 7,66                    | 9,11  | 8,32  | 7,46           | 7,51  | 6,96  |
| RQ                                     | 0,46          | 0,47  | 0,46  | 0,47                    | 0,43  | 0,45  | 0,39           | 0,4   | 0,47  |
| Temp                                   | 36,8          | 36,8  | 36,8  | 36,8                    | 36,9  | 36,9  | 36,8           | 36,8  | 36,8  |
| $Aa\text{DCO}_2$                       | -             | 3,5   | 3,5   | 3,5                     | 4,5   | 5,7   | 4,2            | 3,8   | -     |
| f                                      | 120           | 120   | 110   | 120                     | 150   | 160   | 115            | 115   | 110   |
| SV                                     | 2,73          | 3,16  | 3,0   | 3,27                    | 3,43  | 3,82  | 3,21           | 2,73  | -     |
| HMV                                    | 327           | 379   | 361   | 393                     | 515   | 451   | 466            | 347   | -     |
| TPR                                    | 15,9          | 13,5  | 13,8  | 12,2                    | 13,0  | 13,4  | 11,9           | 16,7  | -     |

Tabelle 10

Kind Nr. 8    Geschl.: m    Geb.    Discr.    Überleb.  
                                  Gew.: 2180    Score: 5244    Wahrsch.: 100 %

|                                         | Vor Adrenalin |       |       | Unter Adrenalininfusion |       |       | Nach Adrenalin |       |       |
|-----------------------------------------|---------------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|----------------|-------|-------|
| $\mu\text{g/kg/min}$                    |               |       |       | 0,05                    | 0,1   | 0,2   |                |       |       |
| Zeit(min)                               | -50           | -30   | -10   | 15                      | 30    | 45    | 70             | 85    | 110   |
| F                                       | 56            | 73    | 74    | 59                      | 78    | 80    | 68             | 58    | 63    |
| $V_T$                                   | 3,99          | 4,28  | 3,83  | 5,45                    | 4,10  | 6,06  | 4,93           | 4,82  | 3,28  |
| $\dot{V}_E$                             | 224           | 313   | 248   | 321                     | 320   | 381   | 335            | 279   | 224   |
| $V_D$                                   | 1,04          | 131   | 1,04  | 1,66                    | 1,57  | 1,86  | 2,04           | 1,96  | 1,22  |
| $\dot{V}_D$                             | 58            | 95    | 77    | 98                      | 124   | 149   | 139            | 113   | 83    |
| $V_D/V_T$                               | 0,266         | 0,305 | 0,272 | 0,304                   | 0,384 | 0,308 | 0,414          | 0,394 | 0,371 |
| $\dot{V}_A$                             | 165           | 217   | 206   | 223                     | 197   | 333   | 196            | 169   | 141   |
| $\dot{V}_A^{\text{phys}}$               | -             | 157   | 125   | 142                     | 131   | 214   | 107            | -     | -     |
| $V_D^{\text{phys}}$                     | -             | 2,08  | 1,98  | 3,04                    | 2,42  | 3,28  | 2,98           | -     | -     |
| $V_D^{\text{phys}}/V_T$                 | -             | 0,543 | 0,602 | 0,557                   | 0,59  | 0,542 | 0,618          | -     | -     |
| $\dot{V}_A^{\text{phys}}/\dot{V}_{O_2}$ | -             | 26,5  | 19,4  | 24,5                    | 21,3  | 22,8  | 18,2           | -     | -     |
| $p\text{CO}_2^{\text{alv}}$             | 19,3          | 21,3  | 19,7  | 19,7                    | 20,8  | 18,8  | 18,8           | 18    | 18,4  |
| $\dot{V}_{O_2}$                         | 1,45          | 5,88  | 7,74  | 5,8                     | 4,35  | 25,3  | 19,6           | 5,89  | 4,58  |
| $\dot{V}_{\text{CO}_2}$                 | 3,53          | 5,80  | 6,61  | 6,61                    | 6,16  | 9,41  | 5,54           | 4,58  | 4,17  |
| RQ                                      | 2,43          | 1,07  | 0,85  | 1,13                    | 1,41  | 0,37  | 0,28           | 0,78  | 0,91  |
| $\text{AaDCO}_2$                        | 7,0           | 11,4  | 11,2  | 7,1                     | 10,4  | 10,5  | 9,0            | -     | -     |
| f                                       | 116           | 116   | 124   | 128                     | 132   | 132   | 108            | 108   | -     |
| Temp                                    | 36,9          | 36,9  | 36,9  | 37                      | 37    | 37    | 37             | 37    | 37    |
| SV                                      | -             | 1,15  | 0,88  | 1,11                    | 0,80  | 1,40  | 1,33           | -     | -     |
| TPR                                     | 14,4          | 11,2  | 14,2  | 18,0                    | 15,9  | 14,4  | 12,4           | -     | -     |

Tabelle 11

Kind Nr. 9 Geschl.: w Geb. Discr. Überleb.  
Gew.: 3230 Score: 5110 Wahrsch.: 100 %

|                      | Vor Adrenalin |       |       | Unter Adrenalininfusion |       |       | Nach Adrenalin |       |       |
|----------------------|---------------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|----------------|-------|-------|
| $\mu\text{g/kg/min}$ |               |       |       | 0,05                    | 0,1   | 0,2   |                |       |       |
| Zeit(min)            | -50           | -30   | -10   | 15                      | 30    | 45    | 70             | 85    | 110   |
| F                    | 57            | 39    | 39    | 38                      | 42    | 68    | 53             | 40    | 44    |
| $V_T$                | 2,18          | 4,75  | 4,45  | 4,88                    | 4,62  | 4,99  | 2,83           | 5,37  | 5,48  |
| $\dot{V}_E$          | 123           | 183   | 171   | 183                     | 192   | 337   | 149            | 214   | 238   |
| $V_D$                | 0,45          | 0,74  | 0,79  | 0,95                    | 1,02  | 1,20  | 0,60           | 1,08  | 0,61  |
| $\dot{V}_D$          | 25            | 28    | 30    | 36                      | 42    | 81    | 31             | 43    | 26    |
| $V_D/V_T$            | 0,206         | 0,155 | 0,177 | 0,195                   | 0,221 | 0,240 | 0,212          | 0,201 | 0,111 |
| $\dot{V}_A$          | 98            | 155   | 141   | 147                     | 149   | 256   | 117            | 169   | 212   |
| $pO_2^i$             | 158           | 159   | 159   | 159                     | 159   | 159   | 158            | 157   | 150   |
| $pO_2^e$             | 129           | 123   | 125   | 126                     | 123   | 132   | 137            | 134   | 128   |
| $FiO_2$              | 23,9          | 24,1  | 24,1  | 24,1                    | 24,1  | 24,1  | 24,0           | 23,8  | 22,8  |
| $pO_2^{\text{alv}}$  | 124           | 113   | 118   | 117                     | 111   | 124   | 131            | 119   | 121   |
| $pCO_2^e$            | 20,0          | 25,1  | 23,6  | 24,0                    | 23,3  | 19,6  | 20,5           | 23,4  | 24,0  |
| $pCO_2^{\text{alv}}$ | 25,2          | 29,7  | 28,7  | 29,8                    | 29,9  | 25,8  | 26,9           | 29,3  | 27,0  |
| $\dot{V}_{O_2}$      | 5,32          | 9,99  | 9,56  | 9,29                    | 10,46 | 13,78 | 4,73           | 7,57  | 7,98  |
| $\dot{V}_{CO_2}$     | 3,74          | 6,89  | 6,15  | 6,67                    | 6,78  | 10,03 | 4,63           | 7,53  | 8,68  |
| RQ                   | 0,70          | 0,69  | 0,64  | 0,72                    | 0,56  | 0,73  | 0,98           | 0,10  | 1,09  |
| $t_{\text{emp}}$     | 37,2          | 37,1  | 37,2  | 37,2                    | 37,3  | 37,3  | 37,2           | 37,2  | 37,2  |

Tabelle 12

Kind Nr. 12 Geschlecht: w Geb. Discr. Überleb.  
Gew.: 3200 Score: 5014 Wahrsch.: 99 %

|                                        | Vor Adrenalin |       |       | Unter Adrenalininfusion |       |       | Nach Adrenalin |       |     |
|----------------------------------------|---------------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|----------------|-------|-----|
| $\mu\text{g/kg/min}$                   | -65           | -35   | -15   | 0,05                    | 0,1   | 0,2   | 75             | 95    | 120 |
| Zeit(min)                              | -65           | -35   | -15   | 15                      | 30    | 45    | 75             | 95    | 120 |
| $\dot{V}_{A\text{phys}}$               | -             | 155   | 143   | 173                     | 179   | 186   | 155            | 154   | -   |
| $V_{D\text{phys}}$                     | -             | 3,65  | 2,82  | 3,32                    | 2,78  | 3,86  | 3,28           | 3,28  | -   |
| $V_{D\text{phys}}/V_T$                 | -             | 0,680 | 0,673 | 0,672                   | 0,653 | 0,690 | 0,701          | 0,710 | -   |
| $\dot{V}_{A\text{phys}}/\dot{V}_{O_2}$ | -             | 14,7  | 14,8  | 15,3                    | 17,4  | 16,7  | 15,9           | 15,8  | -   |
| $Aa\text{DCO}_2$                       | -             | 16,6  | 18,9  | 17,4                    | 16,6  | 15,7  | 18,5           | 17,0  | -   |
| SV                                     | -             | 2,16  | 1,59  | 1,89                    | 1,79  | 1,67  | 1,59           | 1,59  | -   |
| HMV                                    | -             | 316   | 238   | 278                     | 275   | 274   | 239            | 209   | -   |
| TPR                                    | -             | 12,68 | 16,18 | 15,5 <sup>a</sup>       | 22,10 | 15,51 | 16,77          | 16,00 | -   |

Tabelle 13

Kind Nr. 13 Geschlecht: w Geb. Discr. Überleb.  
Gew.: 1400 Score: 4565 Wahrsch.: 34 %

|                        | Vor Adrenalin |       |       | Unter Adrenalininfusion |       |       | Nach Adrenalin |       |  |
|------------------------|---------------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|----------------|-------|--|
| $\mu\text{g/kg/min}$   | -65           | -35   | -15   | 0,05                    | 0,1   | 0,2   | 75             | 95    |  |
| Zeit(min)              | -65           | -35   | -15   | 15                      | 30    | 45    | 75             | 95    |  |
| F                      | 52            | 61    | 58    | 54                      | 58    | 63    | 62             | 40    |  |
| $V_T$                  | 4,08          | 4,17  | 3,90  | 4,85                    | 4,51  | 4,21  | 4,22           | 3,54  |  |
| $\dot{V}_E$            | 212           | 255   | 226   | 262                     | 262   | 265   | 262            | 142   |  |
| $V_{D\text{phys}}$     | 0,59          | 0,66  | 0,66  | 1,27                    | 1,37  | 0,97  | 0,42           | 1,15  |  |
| $\dot{V}_D$            | 31            | 40    | 38    | 69                      | 80    | 61    | 26             | 46    |  |
| $V_{D\text{phys}}/V_T$ | 0,145         | 0,158 | 0,169 | 0,262                   | 0,305 | 0,230 | 0,098          | 0,325 |  |
| $\dot{V}_A$            | 181           | 214   | 188   | 193                     | 182   | 204   | 236            | 95    |  |
| $\dot{V}_{O_2}$        | 19,73         | 9,50  | 11,84 | 11,86                   | 5,71  | 5,25  | 5,05           | 2,52  |  |
| $\dot{V}_{CO_2}$       | 4,48          | 5,69  | 5,02  | 5,42                    | 5,51  | 5,00  | 4,80           | 2,50  |  |
| RQ                     | 2,27          | 0,59  | 0,42  | 0,45                    | 1,00  | 1,19  | 0,99           | 1,01  |  |
| Temp                   | 37,0          | 36,9  | 36,8  | 36,9                    | 37,0  | 37,0  | 37,0           | 37,0  |  |
| f                      | 150           | 144   | 132   | 148                     | 162   | 174   | 150            | 132   |  |

Tabelle 14

Kind Nr. 14 Geschl.: w Geb. Discr. Überleb.  
Gew.: 2750 Score: 4763 Wahrsch.: 50 %

|                      | Vor Adrenalin |       |       | Unter Adrenalininfusion |       |       | Nach Adrenalin |       |       |
|----------------------|---------------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|----------------|-------|-------|
| $\mu\text{g/kg/min}$ |               |       |       | 0,05                    | 0,1   | 0,2   |                |       |       |
| Zeit(min)            | -65           | -35   | -15   | 15                      | 30    | 45    | 75             | 95    | 120   |
| F                    | 80            | 84    | 81    | 80                      | 98    | 99    | 93             | 94    | 80    |
| $V_T$                | 2,48          | 2,54  | 2,38  | 2,40                    | 2,79  | 3,03  | 2,93           | 2,41  | 2,29  |
| $\dot{V}_E$          | 199           | 212   | 192   | 192                     | 274   | 298   | 271            | 226   | 184   |
| $V_D$                | 0,71          | 0,68  | 0,61  | 0,34                    | 0,91  | 0,68  | 0,73           | 0,68  | 0,55  |
| $\dot{V}_D$          | 57            | 57    | 49    | 27                      | 89    | 67    | 68             | 65    | 44    |
| $V_D/V_T$            | 0,286         | 0,267 | 0,254 | 0,141                   | 0,325 | 0,224 | 0,250          | 0,285 | 0,237 |
| $\dot{V}_A$          | 142           | 156   | 143   | 165                     | 185   | 231   | 203            | 162   | 140   |
| $pO_2^e$             | 345           | 346   | 325   | 332                     | 325   | 345   | 340            | 325   | 305   |
| $FiO_2$              | 57,5          | 53,7  | 52,0  | 52,0                    | 52,3  | 53,0  | 52,0           | 49,0  | 47,5  |
| $pO_2^{\text{alv}}$  | 330           | 345   | 307   | 330                     | 300   | 330   | 335            | 300   | 300   |
| $pCO_2^e$            | 20,7          | 20,8  | 23,5  | 22,5                    | 21,4  | 19,0  | 21,6           | 21,8  | 18,6  |
| $pCO_2^{\text{alv}}$ | 29,0          | 28,4  | 31,7  | 26,2                    | 31,7  | 24,4  | 28,8           | 30,5  | 24,4  |
| $\dot{V}_{O_2}$      | 12,55         | 5,14  | 7,27  | 5,28                    | 11,07 | 5,42  | 4,23           | 4,52  | 4,13  |
| $\dot{V}_{CO_2}$     | 6,10          | 6,55  | 6,69  | 6,40                    | 8,70  | 8,40  | 8,69           | 7,31  | 5,06  |
| RQ                   | 0,49          | 1,27  | 0,92  | 1,21                    | 0,78  | 1,55  | 2,05           | 1,61  | 1,22  |
| Temp                 | 37,1          | 37,1  | 37,1  | 37,1                    | 37,1  | 37,1  | 37,0           | 37,1  | 37,1  |
| f                    | 132           | 136   | 132   | 138                     | 146   | 150   | 146            | 140   | 140   |

Tabelle 15

Kind Nr. 15 Geschl.: w Geb. Discr. Überleb.  
 Gew.: 2350 Score: 4997 Wahrsch.: 98 %

|                      | Vor Adrenalin |       |       | Unter Adrenalininfusion |       |       | Nach Adrenalin |       |     |
|----------------------|---------------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|----------------|-------|-----|
| $\mu\text{g/kg/min}$ |               |       |       | 0,05                    | 0,1   | 0,2   |                |       |     |
| Zeit(min)            | -65           | -35   | -15   | 15                      | 30    | 45    | 75             | 95    | 110 |
| F                    | 54            | 38    | 28    | 33                      | 82    | 77    | 52             | 47    | -   |
| $V_T$                | 4,36          | 5,59  | 5,83  | 8,67                    | 3,62  | 3,12  | 7,55           | 5,79  | -   |
| $\dot{V}_E$          | 237           | 213   | 163   | 286                     | 297   | 241   | 393            | 272   | -   |
| $V_D$                | 0,40          | 0,92  | 0,69  | 1,19                    | 0,81  | 0,50  | 1,65           | 0,98  | -   |
| $\dot{V}_D$          | 22            | 35    | 19    | 40                      | 67    | 39    | 86             | 46    | -   |
| $V_D/V_T$            | 0,092         | 0,165 | 0,118 | 0,137                   | 0,224 | 0,160 | 0,219          | 0,169 | -   |
| $\dot{V}_A$          | 215           | 177   | 142   | 249                     | 230   | 202   | 307            | 226   | -   |
| $pO_2^i$             | 146           | 146   | 146   | 146                     | 146   | 147   | 148            | 147   | -   |
| $pO_2^e$             | 117           | 126   | 118   | 126                     | 125   | 120   | 127            | 124   | -   |
| $FiO_2$              | 21,7          | 21,7  | 21,7  | 21,7                    | 21,7  | 21,9  | 22,0           | 21,9  | -   |
| $pO_2^{\text{alv}}$  | 117           | 122   | 118   | 117                     | 116   | 111   | 120            | 119   | -   |
| $pCO_2^e$            | 21,8          | 20,7  | 23,8  | 21,4                    | 20,0  | 22,0  | 20,0           | 19,6  | -   |
| $pCO_2^{\text{alv}}$ | 24            | 24,8  | 27,0  | 24,8                    | 25,8  | 26,2  | 25,6           | 23,6  | -   |
| $\dot{V}_{O_2}$      | 10,22         | 6,50  | 6,71  | 8,60                    | 9,29  | 9,79  | 12,29          | 8,59  | -   |
| $\dot{V}_{CO_2}$     | 7,66          | 6,53  | 5,69  | 9,18                    | 8,82  | 7,86  | 11,67          | 7,94  | -   |
| RQ                   | 0,75          | 1,01  | 0,85  | 1,07                    | 0,95  | 0,80  | 0,95           | 0,92  | -   |
| Temp                 | 37,4          | 37,4  | 37,3  | 37,4                    | 37,4  | 37,4  | 37,2           | 37,2  | -   |
| f                    | 120           | 120   | 122   | 122                     | 136   | 144   | 140            | 142   | -   |

Tabelle 16

Kind Nr. 16 Geschl.: w Geb. Discr. Überleb.  
Gew.: 2140 Score: 5100 Wahrsch.: 100 %

Vor Adrenalin Unter Adrenalininfusion Nach Adrenalin

| ug/kg/min                       |       |       |       | 0,05  | 0,1   | 0,2   |       |       |       |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Zeit(min)                       | -65   | -35   | -15   | 15    | 30    | 45    | 75    | 95    | 120   |
| F                               | 66    | 60    | 60    | 63    | 48    | 53    | 46    | 66    | 56    |
| $V_T$                           | 4,19  | 3,81  | 4,83  | 6,0   | 7,51  | 6,79  | 6,21  | 5,33  | 5,97  |
| $\dot{V}_E$                     | 273   | 229   | 317   | 378   | 361   | 356   | 286   | 352   | 334   |
| $V_D$                           | 0,86  | 1,15  | 0,46  | 1,0   | 1,74  | 0,59  | 2,12  | 0,40  | 1,60  |
| $\dot{V}_D$                     | 56    | 69    | 30    | 63    | 84    | 31    | 99    | 27    | 90    |
| $V_D/V_T$                       | 0,205 | 0,302 | 0,095 | 0,165 | 0,232 | 0,860 | 0,342 | 0,076 | 0,268 |
| $\dot{V}_A$                     | 217   | 160   | 287   | 315   | 277   | 325   | 188   | 325   | 244   |
| $\dot{V}_{Aphys}$               | -     | 143   | 187   | 238   | 210   | 206   | 142   | 184   | -     |
| $V_{Dphys}$                     | -     | 2,01  | 1,99  | 2,23  | 3,14  | 2,77  | 3,12  | 2,69  | -     |
| $V_{Dphys}/V_T$                 | -     | 0,478 | 0,411 | 0,371 | 0,418 | 0,423 | 0,523 | 0,450 | -     |
| $\dot{V}_{Aphys}/\dot{V}_{O_2}$ | -     | 18,13 | 19,45 | 34,4  | 34,9  | 23,15 | 19,0  | 18,12 | -     |
| $pCO_{2alv}$                    | 19,5  | 22,2  | 21,0  | 25,7  | 23,2  | 18,1  | 22,5  | 17,2  | 24,5  |
| $\dot{V}_{O_2}$                 | 7,85  | 6,93  | 9,59  | 6,92  | 6,03  | 8,91  | 8,23  | 8,02  | 10,13 |
| $\dot{V}_{CO_2}$                | 6,37  | 5,34  | 9,06  | 12,19 | 9,67  | 9,07  | 6,37  | 8,42  | 9,01  |
| RQ                              | 0,81  | 0,77  | 0,94  | 1,76  | 1,61  | 1,01  | 0,77  | 1,05  | 0,88  |
| $AaDCO_2$                       | -     | 10,2  | 11,2  | 8,4   | 7,4   | 11,1  | 7,3   | 8,0   | -     |
| Temp                            | 37,1  | 37,1  | 37,2  | 37,2  | 37,2  | 37,2  | 37,1  | 37,1  | 37,1  |
| f                               | 136   | 136   | 132   | 144   | 156   | 147   | 140   | 140   | 140   |
| SV                              | -     | 1,40  | 1,70  | 1,17  | 1,35  | 1,49  | 1,40  | 1,76  | -     |
| HMV                             | -     | 196   | 237   | 168   | 145   | 220   | 219   | 196   | -     |

Tabelle 17 a

Kind Nr. 17 Geschl.: m Geb. Discr. Überleb.  
(Versuch 1) Gew.: 2250 Score: 4916 Wahrsch.: 92 %

|                       | Vor Adrenalin |       |     | Unter Adrenalininfusion |       |       | Nach Adrenalin |       |     |
|-----------------------|---------------|-------|-----|-------------------------|-------|-------|----------------|-------|-----|
| $\mu\text{g/kg/min}$  |               |       |     | 0,05                    | 0,1   | 0,2   |                |       |     |
| Zeit(min)             | -65           | -35   | -15 | 15                      | 30    | 45    | 75             | 95    | 120 |
| F                     | 40            | 41    | -   | 44                      | 55    | 62    | 50             | 45    | -   |
| $\dot{V}_T$           | 4,24          | 5,82  | -   | 5,33                    | 4,95  | 5,47  | 5,53           | 5,03  | -   |
| $\dot{V}_E$           | 167           | 239   | -   | 235                     | 272   | 339   | 376            | 226   | -   |
| $\dot{V}_D$           | 1,02          | 1,79  | -   | 1,46                    | 1,54  | 1,71  | 1,61           | 1,17  | -   |
| $\dot{V}_D$           | 40            | 73    | -   | 64                      | 84    | 106   | 80             | 53    | -   |
| $\dot{V}_D/\dot{V}_T$ | 0,239         | 0,307 | -   | 0,275                   | 0,310 | 0,313 | 0,290          | 0,232 | -   |
| $\dot{V}_A$           | 127           | 165   | -   | 170                     | 188   | 233   | 196            | 173   | -   |
| $\dot{V}_{O_2}$       | 9,03          | 12,67 | -   | 11,98                   | 14,04 | 17,50 | 14,06          | 11,51 | -   |
| $\dot{V}_{CO_2}$      | 4,13          | 6,34  | -   | 6,37                    | 6,50  | 8,10  | 6,35           | 5,23  | -   |
| RQ                    | 0,46          | 0,50  | -   | 0,53                    | 0,46  | 0,46  | 0,45           | 0,45  | -   |
| Temp                  | 36,5          | 36,6  | -   | 36,6                    | 36,6  | 36,6  | 36,5           | 36,5  | -   |
| f                     | 146           | 152   | -   | 164                     | 168   | 168   | 144            | 144   | -   |

Tabelle 17 b

(Versuch 2)

|                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| F                     | 57    | 48    | 47    | 48    | 66    | 81    | 65    | 60    | 55    |
| $\dot{V}_T$           | 4,29  | 4,72  | 5,52  | 5,53  | 4,72  | 3,37  | 3,92  | 3,94  | 4,57  |
| $\dot{V}_E$           | 245   | 226   | 260   | 266   | 312   | 273   | 253   | 236   | 251   |
| $\dot{V}_D$           | 1,32  | 1,36  | 1,99  | 1,52  | 1,32  | 1,04  | 1,08  | 1,09  | 1,22  |
| $\dot{V}_D$           | 75    | 65    | 94    | 73    | 87    | 84    | 70    | 65    | 67    |
| $\dot{V}_D/\dot{V}_T$ | 0,308 | 0,288 | 0,362 | 0,276 | 0,279 | 0,308 | 0,276 | 0,277 | 0,267 |
| $\dot{V}_A$           | 169   | 160   | 166   | 193   | 225   | 189   | 183   | 169   | 184   |
| $\dot{V}_{O_2}$       | 6,48  | 6,85  | 16,56 | 6,92  | 9,41  | 7,13  | 3,87  | 7,86  | 8,94  |
| $\dot{V}_{CO_2}$      | 5,73  | 4,95  | 5,74  | 5,84  | 6,37  | 5,13  | 4,45  | 5,11  | 5,44  |
| RQ                    | 0,88  | 0,72  | 0,35  | 0,34  | 0,86  | 0,72  | 1,15  | 0,65  | 0,61  |
| Temp                  | 37,0  | 37,0  | 36,9  | 36,9  | 37,3  | 37,5  | 37,4  | 37,3  | 37,1  |
| f                     | 144   | 145   | 144   | 156   | 164   | 160   | 140   | 146   | 152   |

Tabelle 18

Kind Nr. 18 Geschl.: m Geb. Discr. Überleb.  
Gew.: 2150 Score: 5059 Wahrsch.: 100 %

Vor Adrenalin Unter Adrenalininfusion Nach Adrenalin

| $\mu\text{g/kg/min}$<br>Zeit(min) | -65  | -35   | -15   | 0,05<br>15 | 0,1<br>30 | 0,2<br>45 | 75    | 95    |
|-----------------------------------|------|-------|-------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| F                                 | 98   | 68    | 74    | 81         | 93        | 96        | 90    | 95    |
| $V_T$                             | 2,37 | 3,27  | 1,55  | 5,12       | 4,65      | 4,91      | 4,36  | 3,89  |
| $\dot{V}_E$                       | 232  | 222   | 115   | 414        | 432       | 471       | 392   | 370   |
| $V_D$                             | 0,43 | 0,99  | 0,03  | 1,91       | 1,68      | 2,09      | 1,55  | 1,33  |
| $\dot{V}_D$                       | 42   | 67    | 19    | 154        | 157       | 201       | 140   | 126   |
| $V_D/V_T$                         | 0,18 | 0,203 | 0,018 | 0,372      | 0,362     | 0,427     | 0,357 | 0,341 |
| $\dot{V}_A$                       | 190  | 155   | 113   | 260        | 276       | 270       | 252   | 244   |
| $\dot{V}_{O_2}$                   | 4,48 | 5,80  | 5,63  | 9,24       | 7,65      | 7,69      | 5,38  | 9,52  |
| $\dot{V}_{CO_2}$                  | 4,34 | 3,95  | 2,04  | 8,06       | 8,21      | 8,42      | 7,09  | 6,52  |
| $pCO_{2\text{alv}}$               | 15,0 | 16,8  | 11,0  | 20,4       | 19,6      | 20,5      | 18,5  | 17,6  |
| Temp                              | 37,5 | 37,4  | 37,3  | 37,3       | 37,4      | 37,4      | 37,4  | 37,0  |
| f                                 | 136  | 140   | 136   | 142        | 144       | 150       | 145   | 135   |

Tabelle 19

Kind Nr. 20 Geschl.: m Geb. Discr. Überleb.  
Gew.: 2750 Score: 4951 Wahrsch.: 96 %

Vor Adrenalin Unter Adrenalininfusion Nach Adrenalin

| $\mu\text{g/kg/min}$<br>Zeit(min) | -65   | -35   | -15   | 0,05<br>15 | 0,1<br>30 | 0,2<br>45 | 75    | 95    | 120   |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|------------|-----------|-----------|-------|-------|-------|
| F                                 | 42    | 30    | 31    | 34         | 41        | 38        | 34    | 33    | 38    |
| $V_T$                             | 5,42  | 6,66  | 6,78  | 6,69       | 6,49      | 7,08      | 7,50  | 6,89  | 6,80  |
| $\dot{V}_E$                       | 228   | 199   | 210   | 228        | 263       | 265       | 255   | 228   | 259   |
| $V_D$                             | 1,37  | 1,69  | 1,51  | 1,59       | 1,48      | 1,72      | 1,74  | 0,91  | 1,59  |
| $\dot{V}_D$                       | 58    | 50    | 46    | 54         | 60        | 65        | 59    | 30    | 61    |
| $V_D/V_T$                         | 0,254 | 0,254 | 0,223 | 0,237      | 0,228     | 0,243     | 0,232 | 0,131 | 0,234 |
| $\dot{V}_A$                       | 170   | 146   | 161   | 174        | 203       | 201       | 196   | 198   | 198   |
| $\dot{V}_{O_2}$                   | 10,77 | 9,55  | 9,27  | 9,26       | 12,72     | 14,31     | 2,35  | 8,62  | 10,18 |
| $\dot{V}_{CO_2}$                  | 7,73  | 7,08  | 7,10  | 7,68       | 9,05      | 9,40      | 9,23  | 8,23  | 8,99  |
| $RQ$                              | 0,72  | 0,74  | 0,77  | 0,83       | 0,71      | 0,66      | 3,93  | 0,95  | 0,88  |
| Temp                              | 36,7  | 36,9  | 36,9  | 37,1       | 37,4      | 37,4      | 37,4  | 37,4  | 37,5  |
| f                                 | 114   | 112   | 112   | 126        | 114       | 122       | 120   | 120   | 126   |

Die folgenden Tabellen enthalten neben den Versuchsdaten:

- $n$  = Anzahl der Einzeldaten eines Versuchskollektivs.  
 $\bar{x}$  = Arithmetisches Mittel der Einzelwerte.  
 $s_{xi}$  = Mittlere Streuung der Einzelwerte.  
 $s_{\bar{x}}$  = Mittlere Streuung des Mittelwertes.  
 $p$  = Signifikanzschranke; signifikant bei  $p < 0,05$

Tabelle 20 : Wirkung von Adrenalin auf F ( 1/min ).

Gruppe 1 (  $n = 8$  )

|               | Vor Adrenalin |     |     | Unter Adrenalininfusion |      |      | Nach Adrenalin |    |     |
|---------------|---------------|-----|-----|-------------------------|------|------|----------------|----|-----|
| ug/kg/min     |               |     |     | 0,05                    | 0,1  | 0,2  |                |    |     |
| Zeit(min)     | -50           | -30 | -10 | 15                      | 30   | 45   | 70             | 85 | 110 |
| Kind Nr.:     |               |     |     |                         |      |      |                |    |     |
| 1             | 81            | 77  | 77  | 71                      | 88   | 86   | 60             | 68 | 64  |
| 3             | 55            | 60  | 62  | 69                      | 69   | 71   | 49             | 51 | 40  |
| 4             | 52            | 52  | 42  | 49                      | 64   | 78   | 56             | 56 | 56  |
| 5             | 66            | 58  | 62  | 72                      | 66   | 75   | 69             | 71 | 65  |
| 6             | 50            | 50  | 48  | 65                      | 66   | 66   | 54             | 44 | 55  |
| 7             | 53            | 49  | 43  | 50                      | 56   | 73   | 54             | 51 | 52  |
| 9             | 57            | 39  | 39  | 38                      | 42   | 68   | 52             | 44 | 40  |
| 8             | 56            | 73  | 74  | 59                      | 78   | 80   | 68             | 58 | 63  |
| $\bar{x}$     | 59            | 57  | 56  | 59                      | 66   | 72   | 58             | 55 | 54  |
| $s_{xi}$      | 10            | 13  | 15  | 12                      | 15   | 10   | 7              | 10 | 10  |
| $s_{\bar{x}}$ | 4             | 5   | 5   | 4                       | 5    | 4    | 3              | 4  | 4   |
| $p <$         |               |     |     | 0,05                    | 0,01 | 0,01 |                |    |     |

Tabelle 21 : Wirkung von Adrenalin auf  $F$  ( 1/min ).

Gruppe 2 ( n = 8 )

|                      | Vor Adrenalin |     |     | Unter Adrenalininfusion |      |      | Nach Adrenalin |    |     |
|----------------------|---------------|-----|-----|-------------------------|------|------|----------------|----|-----|
| $\mu\text{g/kg/min}$ |               |     |     | 0,05                    | 0,1  | 0,2  |                |    |     |
| Zeit(min)            | -65           | -35 | -15 | 15                      | 30   | 45   | 75             | 95 | 120 |
| Kind Nr.:            |               |     |     |                         |      |      |                |    |     |
| 13                   | 52            | 61  | 58  | 54                      | 58   | 63   | 62             | 40 | 51  |
| 14                   | 80            | 84  | 81  | 80                      | 98   | 99   | 85             | 80 | 80  |
| 15                   | 45            | 38  | 28  | 33                      | 82   | 77   | 52             | 47 | 50  |
| 16                   | 65            | 60  | 60  | 63                      | 48   | 53   | 46             | 66 | 56  |
| 17                   | 57            | 48  | 47  | 48                      | 66   | 81   | 65             | 60 | 59  |
| 17                   | 40            | 41  | 41  | 44                      | 55   | 62   | 50             | 45 | 48  |
| 18                   | 89            | 68  | 74  | 81                      | 93   | 96   | 90             | 95 | 93  |
| 20                   | 42            | 30  | 31  | 34                      | 41   | 38   | 34             | 33 | 38  |
| $\bar{x}$            | 59            | 54  | 52  | 55                      | 68   | 71   | 60             | 58 | 59  |
| $s_{xi}$             | 18            | 18  | 19  | 19                      | 21   | 21   | 19             | 21 | 18  |
| $s_{\bar{x}}$        | 6             | 6   | 7   | 7                       | 8    | 7    | 7              | 8  | 6   |
| $p <$                |               |     |     | --                      | 0,05 | 0,05 |                |    |     |

Tabelle 22 : Wirkung von Adrenalin auf  $V_T$  ( ml/kg )

Gruppe 1 ( n = 8 )

|                      | Vor Adrenalin |      |      | unter Adrenalininfusion |      |      | Nach Adrenalin |      |      |
|----------------------|---------------|------|------|-------------------------|------|------|----------------|------|------|
| $\mu\text{g/kg/min}$ |               |      |      | 0,05                    | 0,1  | 0,2  |                |      |      |
| Zeit(min)            | -50           | -30  | -10  | 15                      | 30   | 45   | 70             | 85   | 110  |
| Kind Nr.:            |               |      |      |                         |      |      |                |      |      |
| 1                    | 3,96          | 3,49 | 4,43 | 5,78                    | 5,74 | 5,59 | 5,39           | 5,33 | 5,35 |
| 3                    | 3,45          | 4,04 | 4,06 | 3,18                    | 3,65 | 4,21 | 4,19           | 4,02 | 5,76 |
| 4                    | 5,56          | 4,03 | 4,80 | 4,35                    | 4,24 | 4,64 | 4,57           | 3,88 | 4,22 |
| 5                    | 3,75          | 3,99 | 3,77 | 4,28                    | 4,20 | 4,13 | 3,16           | 3,07 | 3,69 |
| 6                    | 2,06          | 2,52 | 2,39 | 3,00                    | 4,00 | 4,00 | 3,46           | 3,07 | 2,71 |
| 7                    | 4,23          | 5,12 | 5,67 | 5,64                    | 6,26 | 6,24 | 5,96           | 6,09 | 6,02 |
| 8                    | 3,99          | 4,29 | 3,83 | 3,29                    | 5,45 | 6,06 | 4,93           | 4,12 | 4,87 |
| 9                    | 2,17          | 4,75 | 4,45 | 4,87                    | 4,62 | 4,49 | 5,36           | 5,47 | 5,48 |
| $\bar{x}$            | 3,65          | 4,03 | 4,18 | 4,56                    | 4,60 | 4,98 | 4,63           | 4,47 | 4,76 |
| $s_{xi}$             | 1,13          | 0,79 | 0,94 | 1,07                    | 0,91 | 0,89 | 0,98           | 1,13 | 1,14 |
| $s_{\bar{x}}$        | 0,40          | 0,28 | 0,33 | 0,38                    | 0,32 | 0,31 | 0,35           | 0,40 | 0,40 |
| $p <$                |               |      |      | --                      | --   | 0,02 |                |      |      |

Tabelle 23 : Wirkung von Adrenalin auf  $V_T$  ( ml/kg ).

Gruppe 2 (n = 8)

|                      |  | Vor Adrenalin |      |      | Unter Adrenalininfusion |      |      | Nach Adrenalin |      |      |
|----------------------|--|---------------|------|------|-------------------------|------|------|----------------|------|------|
| $\mu\text{g/kg/min}$ |  |               |      |      | 0,05                    | 0,1  | 0,2  |                |      |      |
| Zeit(min)            |  | -65           | -35  | -15  | 15                      | 30   | 45   | 75             | 95   | 120  |
| Kind Nr.:            |  |               |      |      |                         |      |      |                |      |      |
| 13                   |  | 4,08          | 4,18 | 3,90 | 4,18                    | 4,85 | 4,51 | 4,22           | 3,54 | 3,87 |
| 14                   |  | 2,48          | 2,54 | 2,38 | 2,39                    | 2,79 | 3,02 | 2,92           | 2,40 | 2,29 |
| 15                   |  | 4,36          | 5,59 | 5,83 | 8,66                    | 3,61 | 3,12 | 6,67           | 7,55 | 5,79 |
| 16                   |  | 4,19          | 3,81 | 4,83 | 6,00                    | 7,51 | 6,79 | 6,21           | 5,33 | 5,97 |
| 17                   |  | 4,29          | 4,72 | 5,52 | 5,52                    | 4,72 | 3,79 | 3,92           | 3,92 | 3,94 |
| 17                   |  | 4,24          | 5,82 | 5,00 | 5,32                    | 4,94 | 5,47 | 5,52           | 5,02 | 5,25 |
| 18                   |  | 2,36          | 3,26 | 1,54 | 5,11                    | 4,64 | 4,91 | 4,12           | 4,36 | 3,89 |
| 20                   |  | 5,42          | 6,66 | 6,78 | 6,69                    | 6,48 | 7,07 | 6,89           | 6,8  | 5,45 |
| $\bar{x}$            |  | 3,93          | 4,57 | 4,47 | 5,57                    | 4,90 | 4,74 | 5,06           | 4,86 | 4,53 |
| $s_{xi}$             |  | 1,02          | 1,39 | 1,77 | 1,77                    | 1,50 | 1,60 | 1,46           | 1,70 | 1,24 |
| $s_{\bar{x}}$        |  | 0,36          | 0,49 | 0,63 | 0,62                    | 0,53 | 0,57 | 0,52           | 0,60 | 0,44 |
| $p <$                |  |               |      |      | 0,02                    | --   | --   |                |      |      |

Tabelle 24: Wirkung von Adrenalin auf  $\hat{V}_E$  (ml/kg/min)

Gruppe 1 (n = 8)

|                      |  | Vor Adrenalin |     |     | Unter Adrenalininfusion |      |      | Nach Adrenalin |     |     |
|----------------------|--|---------------|-----|-----|-------------------------|------|------|----------------|-----|-----|
| $\mu\text{g/kg/min}$ |  |               |     |     | 0,05                    | 0,1  | 0,2  |                |     |     |
| Zeit(min)            |  | -50           | -30 | -10 | 15                      | 30   | 45   | 70             | 85  | 110 |
| Kind Nr.:            |  |               |     |     |                         |      |      |                |     |     |
| 1                    |  | 312           | 283 | 341 | 407                     | 505  | 481  | 324            | 362 | 343 |
| 3                    |  | 190           | 243 | 252 | 218                     | 252  | 299  | 206            | 206 | 230 |
| 4                    |  | 217           | 234 | 200 | 211                     | 271  | 362  | 256            | 217 | 237 |
| 5                    |  | 247           | 232 | 234 | 308                     | 278  | 310  | 219            | 219 | 240 |
| 6                    |  | 103           | 126 | 115 | 195                     | 264  | 264  | 187            | 135 | 149 |
| 7                    |  | 222           | 251 | 246 | 279                     | 348  | 331  | 322            | 308 | 315 |
| 8                    |  | 224           | 312 | 284 | 321                     | 320  | 481  | 335            | 279 | 307 |
| 9                    |  | 123           | 183 | 171 | 183                     | 192  | 337  | 212            | 238 | 247 |
| $\bar{x}$            |  | 205           | 222 | 230 | 265                     | 304  | 358  | 262            | 245 | 259 |
| $s_{xi}$             |  | 67            | 48  | 69  | 78                      | 93   | 81   | 58             | 70  | 61  |
| $s_{\bar{x}}$        |  | 24            | 17  | 25  | 27                      | 33   | 29   | 21             | 25  | 22  |
| $p <$                |  |               |     |     | 0,05                    | 0,01 | 0,01 |                |     |     |

Tabelle 25 : Wirkung von Adrenalin auf  $\dot{V}_E$  (ml/kg/min)

Gruppe 2 (n=8)

|                      | Vor Adrenalin |     |     | Unter Adrenalininfusion |      |      | Nach Adrenalin |     |     |
|----------------------|---------------|-----|-----|-------------------------|------|------|----------------|-----|-----|
| $\mu\text{g/kg/min}$ |               |     |     | 0,05                    | 0,1  | 0,2  |                |     |     |
| Zeit(min)            | -65           | -35 | -15 | 15                      | 30   | 45   | 75             | 95  | 120 |
| Kind Nr.:            |               |     |     |                         |      |      |                |     |     |
| 13                   | 212           | 255 | 226 | 262                     | 262  | 265  | 262            | 141 | 202 |
| 14                   | 199           | 212 | 192 | 192                     | 274  | 298  | 271            | 226 | 184 |
| 15                   | 237           | 214 | 161 | 289                     | 297  | 241  | 393            | 273 | 273 |
| 16                   | 273           | 229 | 317 | 378                     | 361  | 356  | 286            | 352 | 334 |
| 17                   | 245           | 224 | 260 | 266                     | 312  | 273  | 253            | 253 | 234 |
| 17                   | 167           | 239 | 203 | 234                     | 272  | 339  | 276            | 226 | 251 |
| 18                   | 232           | 222 | 115 | 414                     | 432  | 472  | 392            | 370 | 381 |
| 20                   | 228           | 196 | 207 | 228                     | 263  | 265  | 228            | 259 | 248 |
| $\bar{x}$            | 224           | 224 | 210 | 283                     | 309  | 314  | 295            | 262 | 263 |
| $s_{xi}$             | 32            | 18  | 61  | 76                      | 60   | 75   | 63             | 73  | 66  |
| $s_{\bar{x}}$        | 11            | 6   | 25  | 27                      | 21   | 26   | 22             | 26  | 23  |
| $p <$                |               |     |     | 0,02                    | 0,01 | 0,01 |                |     |     |

Tabelle 26 : Wirkung von Adrenalin auf  $V_D$  ( ml/kg )

Gruppe 1 (n = 8)

|                      | Vor Adrenalin |       |       | Unter Adrenalininfusion |       |       | Nach Adrenalin |       |       |
|----------------------|---------------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|----------------|-------|-------|
| $\mu\text{g/kg/min}$ |               |       |       | 0,05                    | 0,1   | 0,2   |                |       |       |
| Zeit(min)            | -50           | -30   | -10   | 15                      | 30    | 45    | 70             | 85    | 110   |
| $\bar{x}$            | 0,897         | 0,910 | 0,990 | 1,110                   | 1,130 | 1,450 | 1,140          | 0,990 | 1,110 |
| $s_{xi}$             | 0,41          | 0,25  | 0,44  | 0,75                    | 0,43  | 0,57  | 0,35           | 0,47  | 0,40  |
| $s_{\bar{x}}$        | 0,15          | 0,09  | 0,16  | 0,22                    | 0,15  | 0,21  | 0,13           | 0,20  | 0,14  |
| $p <$                |               |       |       | --                      | --    | 0,02  |                |       |       |

Tabelle 27: Wirkung von Adrenalin auf  $V_D$  ( ml/kg )

Gruppe 2 ( n = 8 )

|                      | Vor Adrenalin |      |      | Unter Adrenalininfusion |      |      | Nach Adrenalin |      |      |
|----------------------|---------------|------|------|-------------------------|------|------|----------------|------|------|
| $\mu\text{g/kg/min}$ |               |      |      | 0,05                    | 0,1  | 0,2  |                |      |      |
| Zeit(min)            | -65           | -35  | -15  | 15                      | 30   | 45   | 75             | 95   | 120  |
| $\bar{x}$            | 1,08          | 1,12 | 1,19 | 1,28                    | 1,35 | 1,26 | 1,18           | 1,13 | 1,25 |
| $s_{xi}$             | 0,34          | 0,46 | 0,50 | 0,47                    | 0,34 | 0,56 | 0,38           | 0,45 | 0,31 |
| $s_{\bar{x}}$        | 0,12          | 0,16 | 0,18 | 0,17                    | 0,12 | 0,20 | 0,13           | 0,16 | 0,14 |
| $p <$                |               |      |      | --                      | --   | --   |                |      |      |

Tabelle 28: Wirkung von Adrenalin auf  $\dot{V}_D$  (ml/kg/min)

## Gruppe 1 (n=8)

|                      | Vor Adrenalin |      |      | Unter Adrenalininfusion |       |       | Nach Adrenalin |       |       |
|----------------------|---------------|------|------|-------------------------|-------|-------|----------------|-------|-------|
| $\mu\text{g/kg/min}$ |               |      |      | 0,05                    | 0,1   | 0,2   |                |       |       |
| Zeit(min)            | -50           | -30  | -10  | 15                      | 30    | 45    | 70             | 85    | 110   |
| Kind Nr.             |               |      |      |                         |       |       |                |       |       |
| 1                    | 98,7          | 63,7 | 80,7 | 156,8                   | 149,4 | 228,9 | 105,6          | 122,6 | 114,1 |
| 3                    | 39,6          | 47,7 | 40,3 | 37,2                    | 45,4  | 64,7  | 43,5           | 38,0  | 25,1  |
| 4                    | 63,4          | 54   | 58,4 | 43,8                    | 43,4  | 90,4  | 74,5           | 63,6  | 68,5  |
| 5                    | 71,2          | 49,5 | 70,9 | 81,2                    | 67,6  | 112,3 | 66,1           | 39,4  | 74,7  |
| 6                    | 14,7          | 22,3 | 13,4 | 35                      | 52    | 70    | 31,7           | 21,8  | 27,8  |
| 7                    | 47,9          | 40,5 | 49,5 | 48,7                    | 90    | 69,6  | 71             | 55,3  | 63,1  |
| 8                    | 82,8          | 95,7 | 77,3 | 97,7                    | 123,9 | 148,5 | 139,1          | 110,2 | 124,8 |
| 9                    | 25,4          | 28,3 | 30,4 | 35,6                    | 42,3  | 80,9  | 31,4           | 42,6  | 26,4  |
| $\bar{x}$            | 52,4          | 50,2 | 52,6 | 67                      | 76,7  | 108,2 | 70,4           | 61,7  | 65,6  |
| $s_{x_i}$            | 26,7          | 22,7 | 23,8 | 43,1                    | 40,8  | 56,2  | 37,3           | 36,1  | 38,8  |
| $s_{\bar{x}}$        | 9,4           | 8,1  | 8,7  | 15,2                    | 14,4  | 19,8  | 13,4           | 12,8  | 13,7  |
| $p <$                |               |      |      | --                      | --    | 0,01  |                |       |       |

Tabelle 29: Wirkung von Adrenalin auf  $\dot{V}_D$  (ml/kg/min)

## Gruppe 2 (n = 8)

|                      | Vor Adrenalin |      |      | Unter Adrenalininfusion |       |       | Nach Adrenalin |      |      |
|----------------------|---------------|------|------|-------------------------|-------|-------|----------------|------|------|
| $\mu\text{g/kg/min}$ |               |      |      | 0,05                    | 0,1   | 0,2   |                |      |      |
| Zeit(min)            | -65           | -35  | -15  | 15                      | 30    | 45    | 75             | 95   | 120  |
| Kind Nr.:            |               |      |      |                         |       |       |                |      |      |
| 13                   | 30,9          | 37,8 | 38,1 | 40,3                    | 68,6  | 79,8  | 61             | 25,8 | 46,1 |
| 14                   | 56,8          | 56,8 | 48,7 | 27                      | 89    | 66,8  | 67,8           | 64,4 | 43,6 |
| 15                   | 21,6          | 35,1 | 19   | 39,5                    | 66,6  | 38,5  | 66,1           | 85,9 | 46,2 |
| 16                   | 55,9          | 69   | 30,1 | 63,3                    | 83,9  | 30,8  | 97,8           | 26,6 | 90   |
| 17                   | 75,4          | 64,7 | 94   | 73,5                    | 87    | 84    | 69,8           | 65   | 67,3 |
| 17                   | 40,1          | 73,4 | 56,7 | 64,5                    | 84,5  | 106,2 | 80,2           | 52,6 | 66,4 |
| 18                   | 41            | 67,4 | 83   | 154,4                   | 156,5 | 201   | 132            | 126  | 139  |
| 20                   | 58            | 50   | 46,1 | 53,9                    | 60,2  | 64,6  | 29,8           | 60,5 | 59,5 |
| $\bar{x}$            | 47,5          | 56,8 | 52   | 68,1                    | 88,4  | 81,6  | 72,4           | 63,4 | 69,8 |
| $s_{x_i}$            | 17,3          | 14,5 | 25,5 | 38,2                    | 29,3  | 53,8  | 32,7           | 32,3 | 31,9 |
| $s_{\bar{x}}$        | 6,1           | 5,1  | 9,2  | 13,5                    | 10,3  | 18,9  | 11,5           | 11,4 | 11,3 |
| $p <$                |               |      |      | --                      | 0,01  | 0,05  |                |      |      |

Tabelle 30 : Wirkung von Adrenalin auf  $V_D/V_T$ 

Gruppe 1 (n = 8)

|                      | Vor Adrenalin |      |      | Unter Adrenalininfusion |      |      | Nach Adrenalin |      |      |
|----------------------|---------------|------|------|-------------------------|------|------|----------------|------|------|
| $\mu\text{g/kg/min}$ |               |      |      | 0,05                    | 0,1  | 0,2  |                |      |      |
| Zeit(min)            | -50           | -30  | -10  | 15                      | 30   | 45   | 70             | 85   | 110  |
| $\bar{x}$            | 0,22          | 0,21 | 0,24 | 0,24                    | 0,24 | 0,28 | 0,26           | 0,24 | 0,27 |
| $s_{xi}$             | 0,07          | 0,05 | 0,09 | 0,07                    | 0,07 | 0,10 | 0,09           | 0,09 | 0,08 |
| $s_{\bar{x}}$        | 0,03          | 0,02 | 0,03 | 0,03                    | 0,03 | 0,03 | 0,03           | 0,03 | 0,03 |
| p<                   |               |      |      | --                      | --   | 0,05 |                |      |      |

Tabelle 31 : Wirkung von Adrenalin auf  $V_D/V_T$ 

Gruppe 2 (n = 8)

|                      | Vor Adrenalin |      |      | Unter Adrenalininfusion |      |      | Nach Adrenalin |      |      |
|----------------------|---------------|------|------|-------------------------|------|------|----------------|------|------|
| $\mu\text{g/kg/min}$ |               |      |      | 0,05                    | 0,1  | 0,2  |                |      |      |
| Zeit(min)            | -65           | -35  | -15  | 15                      | 30   | 45   | 75             | 95   | 120  |
| $\bar{x}$            | 0,22          | 0,25 | 0,24 | 0,23                    | 0,28 | 0,26 | 0,28           | 0,27 | 0,26 |
| $s_{xi}$             | 0,06          | 0,06 | 0,07 | 0,08                    | 0,05 | 0,08 | 0,05           | 0,04 | 0,05 |
| $s_{\bar{x}}$        | 0,02          | 0,02 | 0,03 | 0,03                    | 0,02 | 0,03 | 0,02           | 0,01 | 0,02 |
| p<                   |               |      |      | --                      | --   | --   |                |      |      |

Tabelle 32 : Wirkung von Adrenalin auf  $\dot{V}_A$  (ml/kg/min)

Gruppe 1 (n = 8)

|                      | Vor Adrenalin |     |     | Unter Adrenalininfusion |      |      | Nach Adrenalin |     |     |
|----------------------|---------------|-----|-----|-------------------------|------|------|----------------|-----|-----|
| $\mu\text{g/kg/min}$ |               |     |     | 0,05                    | 0,1  | 0,2  |                |     |     |
| Zeit(min)            | -50           | -30 | -10 | 15                      | 30   | 45   | 70             | 85  | 110 |
| Kind Nr:             |               |     |     |                         |      |      |                |     |     |
| 1                    | 213           | 219 | 208 | 251                     | 355  | 252  | 218            | 239 | 229 |
| 3                    | 150           | 195 | 212 | 181                     | 207  | 234  | 162            | 167 | 205 |
| 4                    | 157           | 170 | 146 | 167                     | 228  | 271  | 166            | 182 | 153 |
| 5                    | 176           | 182 | 163 | 227                     | 210  | 198  | 152            | 179 | 166 |
| 6                    | 89            | 119 | 102 | 160                     | 210  | 194  | 155            | 113 | 122 |
| 7                    | 206           | 197 | 203 | 231                     | 258  | 261  | 252            | 251 | 253 |
| 8                    | 165           | 217 | 206 | 223                     | 197  | 333  | 196            | 169 | 183 |
| 9                    | 98            | 155 | 141 | 147                     | 149  | 256  | 169            | 212 | 192 |
| $\bar{x}$            | 157           | 182 | 172 | 198                     | 227  | 250  | 184            | 189 | 188 |
| $s_{xi}$             | 45            | 34  | 41  | 39                      | 60   | 44   | 35             | 44  | 42  |
| $s_{\bar{x}}$        | 16            | 12  | 14  | 14                      | 22   | 16   | 12             | 16  | 15  |
| p<                   |               |     |     | 0,02                    | 0,01 | 0,01 |                |     |     |

Tabelle 33 : Wirkung von Adrenalin auf  $\dot{V}_A$  (ml/kg/min)

## Gruppe 2 (n = 8)

|                      | Vor Adrenalin |     |     | Unter Adrenalininfusion |      |      | Nach Adrenalin |     |     |
|----------------------|---------------|-----|-----|-------------------------|------|------|----------------|-----|-----|
| $\mu\text{g/kg/min}$ |               |     |     | 0,05                    | 0,1  | 0,2  |                |     |     |
| Zeit(min)            | -65           | -35 | -15 | 15                      | 30   | 45   | 75             | 95  | 120 |
| Kind Nr.:            |               |     |     |                         |      |      |                |     |     |
| 13                   | 181           | 217 | 188 | 214                     | 193  | 182  | 204            | 236 | 195 |
| 14                   | 142           | 156 | 143 | 165                     | 185  | 231  | 203            | 162 | 140 |
| 15                   | 215           | 177 | 142 | 249                     | 230  | 202  | 307            | 226 | 267 |
| 16                   | 217           | 160 | 287 | 315                     | 277  | 326  | 188            | 325 | 244 |
| 17                   | 169           | 160 | 166 | 193                     | 225  | 189  | 183            | 169 | 184 |
| 17                   | 127           | 165 | 146 | 170                     | 188  | 233  | 196            | 174 | 185 |
| 18                   | 190           | 155 | 113 | 260                     | 276  | 270  | 252            | 244 | 250 |
| 20                   | 170           | 146 | 161 | 174                     | 203  | 201  | 198            | 198 | 189 |
| $\bar{x}$            | 176           | 167 | 168 | 215                     | 221  | 232  | 220            | 214 | 207 |
| $s_{xi}$             | 32            | 22  | 53  | 54                      | 39   | 46   | 42             | 54  | 43  |
| $s_{\bar{x}}$        | 11            | 7   | 19  | 19                      | 14   | 16   | 15             | 19  | 15  |
| p <                  |               |     |     | 0,02                    | 0,02 | 0,01 |                |     |     |

Tabelle 34 : Wirkung von Adrenalin auf  $\dot{V}_{A\text{phys}}$  (ml/kg/min)

## Gruppe 1 (n = 7)

|                      | Vor Adrenalin |     |     | Unter Adrenalininfusion |     |      | Nach Adrenalin |     |     |
|----------------------|---------------|-----|-----|-------------------------|-----|------|----------------|-----|-----|
| $\mu\text{g/kg/min}$ |               |     |     | 0,05                    | 0,1 | 0,2  |                |     |     |
| Zeit(min)            | -50           | -30 | -10 | 15                      | 30  | 45   | 70             | 85  | 110 |
| $\bar{x}$            |               | 151 | 152 | 170                     | 174 | 183  | 148            | 157 |     |
| $s_{xi}$             |               | 17  | 33  | 42                      | 42  | 34   | 36             | 36  |     |
| $s_{\bar{x}}$        |               | 6   | 13  | 16                      | 16  | 12   | 14             | 14  |     |
| p <                  |               |     |     | --                      | --  | 0,05 |                |     |     |

Tabelle 35 : Wirkung von Adrenalin auf  $V_{D\text{phys}}$  (ml/kg)

## Gruppe 1 (n = 7)

|                      | Vor Adrenalin |      |      | Unter Adrenalininfusion |      |      | Nach Adrenalin |      |     |
|----------------------|---------------|------|------|-------------------------|------|------|----------------|------|-----|
| $\mu\text{g/kg/min}$ |               |      |      | 0,05                    | 0,1  | 0,2  |                |      |     |
| Zeit(min)            | -50           | -30  | -10  | 15                      | 30   | 45   | 70             | 85   | 110 |
| $\bar{x}$            |               | 2,20 | 1,90 | 2,09                    | 2,35 | 2,64 | 2,44           | 2,19 |     |
| $s_{xi}$             |               | 0,74 | 0,50 | 0,80                    | 0,53 | 0,72 | 0,71           | 0,82 |     |
| $s_{\bar{x}}$        |               | 0,28 | 0,19 | 0,30                    | 0,20 | 0,27 | 0,27           | 0,31 |     |
| p <                  |               |      |      | --                      | --   | --   |                |      |     |

Tabelle 36: Wirkung von Adrenalin auf  $V_{Dphys}/V_T$ 

Gruppe 1 (n = 7)

|                      |  | Vor Adrenalin |      |      | Unter Adrenalininfusion |      |      | Nach Adrenalin |      |
|----------------------|--|---------------|------|------|-------------------------|------|------|----------------|------|
| $\mu\text{g/kg/min}$ |  |               |      |      | 0,05                    | 0,1  | 0,2  |                |      |
| Zeit(min)            |  | -50           | -30  | -10  | 15                      | 30   | 45   | 70             | 110  |
| $\bar{x}$            |  |               | 0,48 | 0,48 | 0,46                    | 0,49 | 0,52 | 0,51           | 0,47 |
| $s_{xi}$             |  |               | 0,13 | 0,15 | 0,13                    | 0,11 | 0,10 | 0,12           | 0,15 |
| $s_{\bar{x}}$        |  |               | 0,05 | 0,06 | 0,05                    | 0,04 | 0,04 | 0,44           | 0,06 |
| p<                   |  |               |      |      | --                      | --   | --   |                |      |

Tabelle 37 : Wirkung von Adrenalin auf  $\dot{V}_{Aphys}/\dot{V}_{O_2}$ 

Gruppe 1 (n = 7)

|                      |  | Vor Adrenalin |      |      | Unter Adrenalininfusion |      |      | Nach Adrenalin |      |
|----------------------|--|---------------|------|------|-------------------------|------|------|----------------|------|
| $\mu\text{g/kg/min}$ |  |               |      |      | 0,05                    | 0,1  | 0,2  |                |      |
| Zeit(min)            |  | -50           | -30  | -10  | 15                      | 30   | 45   | 70             | 110  |
| $\bar{x}$            |  |               | 19,9 | 21,3 | 22,2                    | 23,9 | 24,1 | 19,8           | 19,4 |
| $s_{xi}$             |  |               | 7,7  | 12,8 | 12,8                    | 12,9 | 12,8 | 9,5            | 6,8  |
| $s_{\bar{x}}$        |  |               | 2,9  | 4,8  | 4,8                     | 4,9  | 4,9  | 3,6            | 2,6  |
| p<                   |  |               |      |      | --                      | --   | --   |                |      |

Tabelle 38 : Wirkung von Adrenalin auf  $\dot{V}_{O_2}$  (ml/kg/min)

Gruppe 1 (n = 8)

|                      |  | Vor Adrenalin |       |       | Unter Adrenalininfusion |       |       | Nach Adrenalin |       |
|----------------------|--|---------------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|----------------|-------|
| $\mu\text{g/kg/min}$ |  |               |       |       | 0,05                    | 0,1   | 0,2   |                |       |
| Zeit(min)            |  | -50           | -30   | -10   | 15                      | 30    | 45    | 70             | 110   |
| Kind Nr.:            |  |               |       |       |                         |       |       |                |       |
| 1                    |  | 5,57          | 6,38  | 5,97  | 13,08                   | 7,67  | 12,22 | 9,35           | 11,48 |
| 3                    |  | 5,79          | 5,95  | 8,85  | 12,99                   | 11,43 | 8,25  | 9,86           | 6,35  |
| 4                    |  | 8,39          | 7,47  | 7,93  | 8,84                    | 13,41 | 11,36 | 8,43           | 8,38  |
| 5                    |  | 9,90          | 8,41  | 7,95  | 11,87                   | 9,44  | 12,29 | 7,21           | 7,10  |
| 6                    |  | 5,35          | 5,98  | 5,32  | 4,48                    | 6,18  | 9,81  | 9,25           | 5,78  |
| 7                    |  | 13,43         | 15,55 | 14,21 | 16,12                   | 21,11 | 18,32 | 19,07          | 18,69 |
| 8                    |  | 4,58          | 5,88  | 7,74  | 5,80                    | 4,35  | 8,32  | 8,12           | 5,89  |
| 9                    |  | 5,32          | 9,99  | 9,56  | 9,29                    | 10,47 | 13,78 | 9,86           | 7,98  |
| $\bar{x}$            |  | 7,29          | 8,20  | 8,44  | 10,30                   | 10,51 | 11,79 | 10,14          | 8,96  |
| $s_{xi}$             |  | 3,07          | 3,31  | 2,71  | 3,94                    | 5,18  | 3,29  | 3,72           | 4,34  |
| $s_{\bar{x}}$        |  | 1,09          | 1,17  | 0,96  | 1,39                    | 1,83  | 1,16  | 1,31           | 1,54  |
| p<                   |  |               |       |       | 0,05                    | 0,02  | 0,01  |                |       |

Tabelle 39: Wirkung von Adrenalin auf  $\dot{V}_{O_2}$  (ml/kg/min)

| Gruppe 2 (n = 8)     |               |       |       |                         |       |       |                |       |       |
|----------------------|---------------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|----------------|-------|-------|
|                      | Vor Adrenalin |       |       | Unter Adrenalininfusion |       |       | Nach Adrenalin |       |       |
| $\mu\text{g/kg/min}$ |               |       |       | 0,05                    | 0,1   | 0,2   |                |       |       |
| Zeit(min)            | -65           | -35   | -15   | 15                      | 30    | 45    | 75             | 95    | 120   |
| Kind Nr.:            |               |       |       |                         |       |       |                |       |       |
| 13                   | 6,90          | 9,50  | 7,73  | 11,86                   | 5,71  | 5,25  | 5,05           | 2,51  | 3,28  |
| 14                   | 12,55         | 5,13  | 7,26  | 5,27                    | 11,07 | 5,40  | 4,23           | 4,18  | 4,13  |
| 15                   | 10,21         | 6,50  | 6,71  | 8,60                    | 9,28  | 9,79  | 12,29          | 8,58  | 10,43 |
| 16                   | 7,85          | 6,93  | 9,59  | 6,92                    | 6,03  | 8,91  | 8,23           | 8,02  | 10,13 |
| 17                   | 9,03          | 12,67 | 10,85 | 11,98                   | 14,04 | 17,50 | 14,06          | 11,50 | 12,78 |
| 17                   | 6,48          | 6,84  | 16,56 | 6,92                    | 9,41  | 7,13  | 3,87           | 7,85  | 8,94  |
| 18                   | 4,47          | 5,79  | 5,62  | 9,24                    | 7,65  | 7,69  | 5,37           | 9,51  | 7,44  |
| 20                   | 10,77         | 9,54  | 9,26  | 9,25                    | 12,72 | 14,30 | 8,62           | 10,18 | 9,53  |
| $\bar{x}$            | 8,53          | 7,86  | 7,95  | 8,76                    | 9,49  | 9,50  | 7,72           | 7,79  | 8,33  |
| $s_{\bar{x}}$        | 2,62          | 2,55  | 1,78  | 2,37                    | 3,01  | 4,33  | 3,81           | 3,02  | 3,23  |
| $s_{\bar{x}}$        | 0,93          | 0,88  | 0,63  | 0,84                    | 1,07  | 1,53  | 1,35           | 1,07  | 1,14  |
| $p <$                |               |       |       | --                      | --    | --    |                |       |       |

Tabelle 40: Wirkung von Adrenalin auf  $\dot{V}_{CO_2}$  (ml/kg/min)

| Gruppe 1 (n = 8)     |               |      |      |                         |       |       |                |      |      |
|----------------------|---------------|------|------|-------------------------|-------|-------|----------------|------|------|
|                      | Vor Adrenalin |      |      | Unter Adrenalininfusion |       |       | Nach Adrenalin |      |      |
| $\mu\text{g/kg/min}$ |               |      |      | 0,05                    | 0,1   | 0,2   |                |      |      |
| Zeit(min)            | -50           | -30  | -10  | 15                      | 30    | 45    | 70             | 85   | 110  |
| Kind Nr.:            |               |      |      |                         |       |       |                |      |      |
| 1                    | 5,64          | 6,70 | 6,17 | 8,91                    | 10,89 | 8,59  | 7,95           | 8,73 | 8,34 |
| 3                    | 5,91          | 7,38 | 6,97 | 6,59                    | 7,56  | 8,54  | 6,62           | 6,87 | 7,58 |
| 4                    | 7,41          | 6,69 | 7,05 | 6,64                    | 8,53  | 9,75  | 7,67           | 6,50 | 7,07 |
| 6                    | 3,60          | 4,13 | 4,02 | 3,51                    | 6,25  | 7,94  | 6,39           | 5,32 | 5,33 |
| 7                    | 6,27          | 7,34 | 6,57 | 7,66                    | 9,11  | 8,32  | 7,46           | 7,51 | 7,48 |
| 8                    | 4,16          | 6,30 | 6,61 | 6,61                    | 6,16  | 9,41  | 5,54           | 4,58 | 5,11 |
| 9                    | 3,74          | 6,97 | 6,14 | 6,67                    | 6,97  | 10,03 | 7,97           | 4,63 | 7,54 |
| $\bar{x}$            | 5,47          | 6,60 | 6,29 | 7,03                    | 7,98  | 8,89  | 7,04           | 6,34 | 6,93 |
| $s_{\bar{x}}$        | 1,45          | 1,07 | 0,98 | 1,84                    | 1,62  | 0,74  | 0,87           | 1,44 | 1,13 |
| $s_{\bar{x}}$        | 0,52          | 0,38 | 0,35 | 0,65                    | 0,57  | 0,26  | 0,31           | 0,51 | 0,40 |
| $p <$                |               |      |      | --                      | 0,01  | 0,01  |                |      |      |

Tabelle 41: Wirkung von Adrenalin auf  $\dot{V}_{CO_2}$  (ml/kg/min)

## Gruppe 2 (n = 8)

|                      | Vor Adrenalin |      |      | Unter Adrenalininfusion |      |      | Nach Adrenalin |      |      |
|----------------------|---------------|------|------|-------------------------|------|------|----------------|------|------|
| $\mu\text{g/kg/min}$ |               |      |      | 0,05                    | 0,1  | 0,2  |                |      |      |
| Zeit(min)            | -65           | -35  | -15  | 15                      | 30   | 45   | 75             | 95   | 120  |
| Kind Nr.:            |               |      |      |                         |      |      |                |      |      |
| 13                   | 4,48          | 5,68 | 5,02 | 5,42                    | 5,73 | 6,24 | 5,02           | 2,55 | 3,78 |
| 14                   | 6,10          | 6,55 | 6,68 | 6,40                    | 8,70 | 8,40 | 8,69           | 7,31 | 5,06 |
| 15                   | 7,66          | 6,53 | 5,69 | 9,18                    | 8,82 | 7,86 | 11,67          | 7,93 | 9,80 |
| 16                   | 6,37          | 5,34 | 9,06 | 12,19                   | 9,67 | 9,07 | 6,37           | 8,42 | 9,01 |
| 17                   | 4,12          | 6,34 | 5,23 | 6,37                    | 6,50 | 8,10 | 6,35           | 5,23 | 5,79 |
| 17                   | 5,73          | 4,96 | 5,73 | 5,84                    | 6,37 | 5,13 | 4,45           | 5,10 | 5,43 |
| 18                   | 4,33          | 3,95 | 2,03 | 8,06                    | 8,20 | 8,42 | 7,09           | 6,52 | 6,80 |
| 20                   | 7,73          | 7,07 | 7,10 | 7,67                    | 9,04 | 9,40 | 8,22           | 8,99 | 8,71 |
| $\bar{x}$            | 5,82          | 5,80 | 5,82 | 7,64                    | 7,88 | 7,83 | 7,23           | 6,51 | 6,80 |
| $s_{xi}$             | 1,43          | 1,02 | 2,01 | 2,22                    | 1,46 | 1,44 | 2,30           | 2,13 | 2,16 |
| $s_{\bar{x}}$        | 0,51          | 0,36 | 0,71 | 0,78                    | 0,52 | 0,51 | 0,81           | 0,75 | 0,64 |
| $p <$                |               |      |      | 0,02                    | 0,01 | 0,01 |                |      |      |

Tabelle 42: Wirkung von Adrenalin auf RQ

## Gruppe 1 (n = 8)

|                      | Vor Adrenalin |      |      | Unter Adrenalininfusion |      |      | Nach Adrenalin |      |      |
|----------------------|---------------|------|------|-------------------------|------|------|----------------|------|------|
| $\mu\text{g/kg/min}$ |               |      |      | 0,05                    | 0,1  | 0,2  |                |      |      |
| Zeit(min)            | -50           | -30  | -10  | 15                      | 30   | 45   | 70             | 85   | 110  |
| $\bar{x}$            | 0,80          | 0,84 | 0,80 | 0,82                    | 0,86 | 0,85 | 0,83           | 0,85 | 0,83 |
| $s_{xi}$             | 0,44          | 0,45 | 0,42 | 0,47                    | 0,60 | 0,55 | 0,42           | 0,47 | 0,41 |
| $s_{\bar{x}}$        | 0,16          | 0,16 | 0,15 | 0,47                    | 0,17 | 0,19 | 0,15           | 0,17 | 0,14 |
| $p <$                |               |      |      | --                      | --   | --   |                |      |      |

Tabelle 43: Wirkung von Adrenalin auf RQ

## Gruppe 2 (n = 8)

|                      | Vor Adrenalin |      |      | Unter Adrenalininfusion |      |      | Nach Adrenalin |      |      |
|----------------------|---------------|------|------|-------------------------|------|------|----------------|------|------|
| $\mu\text{g/kg/min}$ |               |      |      | 0,05                    | 0,1  | 0,2  |                |      |      |
| Zeit(min)            | -65           | -35  | -15  | 15                      | 30   | 45   | 75             | 95   | 120  |
| $\bar{x}$            | 0,79          | 0,80 | 0,72 | 0,81                    | 0,85 | 0,95 | 0,88           | 0,88 | 0,83 |
| $s_{xi}$             | 0,81          | 0,48 | 0,45 | 0,68                    | 0,47 | 0,58 | 0,46           | 0,51 | 0,50 |
| $s_{\bar{x}}$        | 0,29          | 0,17 | 0,16 | 0,24                    | 0,17 | 0,21 | 0,16           | 0,18 | 0,18 |
| $p <$                |               |      |      | --                      | --   | --   |                |      |      |

Tabelle 44: Wirkung von Adrenalin auf die rektale Temperatur ( $^{\circ}\text{C}$ )

Gruppe 1 (n = 8)

|                      | Vor Adrenalin |       |       | Unter Adrenalininfusion |       |       | Nach Adrenalin |       |       |
|----------------------|---------------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|----------------|-------|-------|
| $\mu\text{g/kg/min}$ |               |       |       | 0,05                    | 0,1   | 0,2   |                |       |       |
| Zeit(min)            | -50           | -30   | -10   | 15                      | 30    | 45    | 70             | 85    | 110   |
| $\bar{x}$            | 36,91         | 36,90 | 36,95 | 37,5                    | 37,12 | 37,16 | 37,06          | 37,03 | 37,01 |
| $s_{xi}$             | 0,24          | 0,27  | 0,23  | 0,29                    | 0,30  | 0,32  | 0,31           | 0,30  | 0,29  |
| $s_{\bar{x}}$        | 0,08          | 0,09  | 0,08  | 0,10                    | 0,11  | 0,11  | 0,11           | 0,11  | 0,10  |
| p <                  |               |       |       | 0,02                    | 0,01  | 0,01  |                |       |       |

Tabelle 45: Wirkung von Adrenalin auf die rektale Temperatur ( $^{\circ}\text{C}$ )

Gruppe 2 (n = 8)

|                      | Vor Adrenalin |       |       | Unter Adrenalininfusion |       |       | Nach Adrenalin |       |       |
|----------------------|---------------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|----------------|-------|-------|
| $\mu\text{g/kg/min}$ |               |       |       | 0,05                    | 0,1   | 0,2   |                |       |       |
| Zeit(min)            | -65           | -35   | -15   | 15                      | 30    | 45    | 75             | 95    | 120   |
| $\bar{x}$            | 36,83         | 36,85 | 36,81 | 36,91                   | 37,01 | 37,04 | 36,95          | 36,95 | 36,85 |
| $s_{xi}$             | 0,47          | 0,45  | 0,42  | 0,38                    | 0,45  | 0,47  | 0,44           | 0,43  | 0,36  |
| $s_{\bar{x}}$        | 0,16          | 0,16  | 0,15  | 0,13                    | 0,16  | 0,17  | 0,15           | 0,15  | 0,13  |
| p <                  |               |       |       | 0,05                    | 0,20  | 0,20  |                |       |       |

Tabelle 46: Wirkung von Adrenalin auf f ( $1/\text{min}$ )

Gruppe 1 (n = 6)

|                      | Vor Adrenalin |      |      | Unter Adrenalininfusion |      |      | Nach Adrenalin |      |      |
|----------------------|---------------|------|------|-------------------------|------|------|----------------|------|------|
| $\mu\text{g/kg/min}$ |               |      |      | 0,05                    | 0,1  | 0,2  |                |      |      |
| Zeit(min)            | -50           | -30  | -10  | 15                      | 30   | 45   | 70             | 85   | 110  |
| Kind Nr.:            |               |      |      |                         |      |      |                |      |      |
| 1                    | 140           | 136  | 136  | 152                     | 156  | 156  | 132            | 136  | 134  |
| 3                    | 140           | 140  | 140  | 148                     | 148  | 152  | 136            | 136  | 136  |
| 5                    | 100           | 105  | 110  | 138                     | 160  | 170  | 135            | 132  | 132  |
| 6                    | 120           | 120  | 120  | 118                     | 122  | 122  | 106            | 100  | 116  |
| 7                    | 120           | 120  | 110  | 120                     | 150  | 160  | 115            | 115  | 110  |
| 8                    | 116           | 116  | 124  | 128                     | 132  | 132  | 108            | 108  | 108  |
| $\bar{x}$            | 123           | 124  | 123  | 134                     | 144  | 149  | 122            | 121  | 122  |
| $s_{xi}$             | 15,3          | 13,9 | 12,7 | 14,3                    | 15,3 | 18,1 | 13,9           | 15,6 | 12,8 |
| $s_{\bar{x}}$        | 6,25          | 5,3  | 5,19 | 5,84                    | 6,24 | 7,38 | 5,67           | 6,36 | 5,20 |
| p <                  |               |      |      | --                      | 0,05 | 0,05 |                |      |      |

Tabelle 47: Wirkung von Adrenalin auf f (1/min)

Gruppe 2 (n = 8)

|                      | Vor Adrenalin |      |      | Unter Adrenalininfusion |      |      | Nach Adrenalin |     |     |
|----------------------|---------------|------|------|-------------------------|------|------|----------------|-----|-----|
| $\mu\text{g/kg/min}$ |               |      |      | 0,05                    | 0,1  | 0,2  |                |     |     |
| Zeit(min)            | -65           | -35  | -15  | 15                      | 30   | 45   | 75             | 95  | 120 |
| Kind Nr.:            |               |      |      |                         |      |      |                |     |     |
| 13                   | 152           | 150  | 144  | 148                     | 162  | 174  | 150            | 132 | 141 |
| 14                   | 132           | 136  | 132  | 138                     | 146  | 150  | 146            | 140 | 140 |
| 15                   | 120           | 120  | 122  | 122                     | 136  | 144  | 140            | 144 | 142 |
| 16                   | 136           | 136  | 132  | 144                     | 156  | 147  | 140            | 140 | 140 |
| 17                   | 146           | 152  | 149  | 164                     | 168  | 168  | 144            | 144 | 144 |
| 17                   | 144           | 144  | 144  | 156                     | 164  | 160  | 146            | 152 | 150 |
| 18                   | 136           | 140  | 136  | 142                     | 144  | 150  | 145            | 135 | 140 |
| 20                   | 114           | 112  | 112  | 126                     | 114  | 122  | 122            | 120 | 120 |
| $\bar{x}$            | 135           | 136  | 134  | 143                     | 149  | 152  | 142            | 138 | 140 |
| $s_{xi}$             | 12,9          | 14,0 | 12,3 | 14,1                    | 17,8 | 16,0 | 8,6            | 9,6 | 8,6 |
| $s_{\bar{x}}$        | 4,6           | 4,9  | 4,4  | 5,0                     | 6,3  | 5,7  | 3,0            | 3,4 | 3,0 |
| $p <$                |               |      |      | 0,02                    | 0,01 | 0,01 |                |     |     |

Tabelle 48: Wirkung von Adrenalin auf SV (ml/kg)

Gruppe 1 (n = 7)

|                      | Vor Adrenalin |      |      | unter Adrenalininfusion |      |      | Nach Adrenalin |      |     |
|----------------------|---------------|------|------|-------------------------|------|------|----------------|------|-----|
| $\mu\text{g/kg/min}$ |               |      |      | 0,05                    | 0,1  | 0,2  |                |      |     |
| Zeit(min)            | -50           | -30  | -10  | 15                      | 30   | 45   | 70             | 85   | 110 |
| $\bar{x}$            |               | 1,66 | 1,69 | 1,70                    | 1,86 | 1,90 | 1,67           | 1,65 |     |
| $s_{xi}$             |               | 0,80 | 0,68 | 0,80                    | 0,82 | 0,92 | 0,73           | 0,51 |     |
| $s_{\bar{x}}$        |               | 0,30 | 0,26 | 0,30                    | 0,31 | 0,35 | 0,27           | 0,19 |     |
| $p <$                |               |      |      | --                      | --   | --   |                |      |     |

Tabelle 49: Wirkung von Adrenalin auf HMV (ml/kg/min)

Gruppe 1 (n = 7)

|                      | Vor Adrenalin |     |     | Unter Adrenalininfusion |     |      | Nach Adrenalin |     |     |
|----------------------|---------------|-----|-----|-------------------------|-----|------|----------------|-----|-----|
| $\mu\text{g/kg/min}$ |               |     |     | 0,05                    | 0,1 | 0,2  |                |     |     |
| Zeit(min)            | -50           | -30 | -10 | 15                      | 30  | 45   | 70             | 85  | 110 |
| $\bar{x}$            |               | 208 | 199 | 217                     | 244 | 250  | 230            | 202 |     |
| $s_{xi}$             |               | 87  | 92  | 96                      | 130 | 100  | 114            | 95  |     |
| $s_{\bar{x}}$        |               | 33  | 35  | 36                      | 49  | 37   | 43             | 36  |     |
| $p <$                |               |     |     | --                      | --  | 0,05 |                |     |     |

Tabelle 50: Wirkung von Adrenalin auf TPR (dyn · sec · kg · cm<sup>-5</sup>)

Gruppe 1 (n=5)

| µg/kg/min     | Vor Adrenalin |       |       | Unter Adrenalininfusion |       |       | Nach Adrenalin |       |     |
|---------------|---------------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|----------------|-------|-----|
|               |               |       |       | 0,05                    | 0,1   | 0,2   |                |       |     |
| Zeit(min)     | -50           | -30   | -10   | 15                      | 30    | 45    | 70             | 85    | 110 |
| $\bar{x}$     |               | 16886 | 18186 | 19936                   | 21120 | 20908 | 17636          | 18590 |     |
| $s_{xi}$      |               | 4322  | 4682  | 7026                    | 4814  | 4266  | 3891           | 3790  |     |
| $s_{\bar{x}}$ |               | 1933  | 2093  | 3142                    | 2152  | 1908  | 1740           | 1695  |     |
| p <           |               |       |       | --                      | --    | --    |                |       |     |

Tabelle 51: Wirkung von Adrenalin auf  $Aa\bar{D}CO_2$  (Torr)

Gruppe 1 (n = 7)

| µg/kg/min     | Vor Adrenalin |      |      | Unter Adrenalininfusion |      |      | Nach Adrenalin |     |     |
|---------------|---------------|------|------|-------------------------|------|------|----------------|-----|-----|
|               |               |      |      | 0,05                    | 0,1  | 0,2  |                |     |     |
| Zeit(min)     | -50           | -30  | -10  | 15                      | 30   | 45   | 70             | 85  | 110 |
| $\bar{x}$     |               | 10,9 | 11,4 | 11,3                    | 11,6 | 13,1 | 10,4           | 9,8 |     |
| $s_{xi}$      |               | 4,6  | 4,7  | 4,6                     | 4,8  | 5,2  | 4,4            | 4,6 |     |
| $s_{\bar{x}}$ |               | 1,7  | 1,8  | 1,7                     | 1,8  | 2,0  | 1,7            | 1,7 |     |
| p <           |               |      |      | --                      | --   | --   |                |     |     |

## NORADRENALIN

Tabelle 52: Wirkung von Noradrenalin auf F ( 1/min )

## Gruppe 1 (n=8)

| $\mu\text{g/kg/min}$ | Vor Noradrenalin |     |     | Unter Noradrenalin |      |      | Nach Noradrenalin |      |      |
|----------------------|------------------|-----|-----|--------------------|------|------|-------------------|------|------|
|                      |                  |     |     | 0,1                | 0,2  | 0,4  |                   |      |      |
| Zeit(min)            | -50              | -30 | -10 | 15                 | 30   | 45   | 70                | 85   | 110  |
| Kind Nr.:            |                  |     |     |                    |      |      |                   |      |      |
| 3                    | 49               | 45  | 47  | 49                 | 63   | 60   | 59                | 43   | 51   |
| 4                    | 50               | 51  | 54  | 57                 | 69   | 68   | 42                | 52   | 52   |
| 5                    | 57               | 58  | 50  | 61                 | 65   | 60   | 57                | 60   | 62   |
| 5                    | 60               | 71  | 69  | 62                 | 83   | 66   | 76                | 71   | 73   |
| 6                    | 52               | 53  | 54  | 64                 | 58   | 55   | 53                | 51   | 52   |
| 7                    | 41               | 55  | 51  | 55                 | 60   | 69   | 49                | 43   | 49   |
| 8                    | 67               | 62  | 67  | 72                 | 63   | 67   | 56                | 60   | 57   |
| 10                   | 55               | 51  | 46  | 44                 | 46   | 32   | 36                | 31   | 34   |
| $\bar{x}$            | 54               | 56  | 55  | 58                 | 63   | 60   | 53                | 51   | 54   |
| $s_{\bar{x}}$        | 2,8              | 2,8 | 3,0 | 3,0                | 3,2  | 3,5  | 3,5               | 3,5  | 3,4  |
| $s_{x_i}$            | 7,9              | 8,0 | 8,8 | 8,7                | 10,5 | 12,1 | 12,0              | 12,3 | 11,3 |
| $p <$                |                  |     |     | --                 | --   | 0,05 |                   |      |      |

Tabelle 53: Wirkung von Noradrenalin auf F (1/min )

## Gruppe 2 (n=8)

| $\mu\text{g/kg/min}$ | Vor Noradrenalin |      |     | Unter Noradrenalin |      |      | Nach Noradrenalin |      |      |
|----------------------|------------------|------|-----|--------------------|------|------|-------------------|------|------|
|                      |                  |      |     | 0,1                | 0,2  | 0,4  |                   |      |      |
| Zeit(min)            | -65              | -35  | -15 | 15                 | 30   | 45   | 75                | 95   | 120  |
| Kind nr.:            |                  |      |     |                    |      |      |                   |      |      |
| 11                   | 53               | 53   | 46  | 40                 | 70   | 68   | 63                | 68   | 66   |
| 15                   | 46               | 44   | 42  | 43                 | 43   | 45   | 45                | 38   | 28   |
| 16                   | 47               | 66   | 56  | 57                 | 61   | 66   | 47                | 59   | 55   |
| 17                   | 51               | 40   | 40  | 41                 | 52   | 69   | 40                | 41   | 40   |
| 17                   | 65               | 60   | 55  | 58                 | 68   | 74   | 56                | 58   | 57   |
| 19                   | 42               | 35   | 38  | 35                 | 38   | 43   | 41                | 40   | 40   |
| 20                   | 30               | 40   | 34  | 38                 | 40   | 59   | 44                | 41   | 33   |
| 21                   | 52               | 43   | 44  | 48                 | 55   | 51   | 46                | 47   | 49   |
| $\bar{x}$            | 48               | 47   | 44  | 45                 | 53   | 59   | 48                | 49   | 46   |
| $s_{x_i}$            | 9,9              | 10,9 | 7,8 | 8,6                | 12,5 | 11,8 | 8,0               | 11,2 | 12,8 |
| $s_{\bar{x}}$        | 3,5              | 3,8  | 2,8 | 3,0                | 4,4  | 4,2  | 2,8               | 4,0  | 4,5  |
| $p <$                |                  |      |     | --                 | 0,02 | 0,01 |                   |      |      |

Tabelle 54: Wirkung von Noradrenalin auf  $V_T$  (ml/kg)

## Gruppe 1 (n=8)

|                      | Vor Noradrenalin |      |      | Unter Noradrenalin |      |      | Nach Noradrenalin |      |      |
|----------------------|------------------|------|------|--------------------|------|------|-------------------|------|------|
| $\mu\text{E/kg/min}$ |                  |      |      | 0,1                | 0,2  | 0,4  |                   |      |      |
| Zeit (min)           | -50              | -30  | -10  | 15                 | 30   | 45   | 70                | 85   | 110  |
| $\bar{x}$            | 4,49             | 4,28 | 4,27 | 4,10               | 4,15 | 4,21 | 4,69              | 4,47 | 4,53 |
| $s_{xi}$             | 1,34             | 1,05 | 1,47 | 0,95               | 0,95 | 0,74 | 1,39              | 1,37 | 1,35 |
| $s_{\bar{x}}$        | 0,47             | 0,37 | 0,52 | 0,33               | 0,35 | 0,26 | 0,49              | 0,48 | 0,48 |
| $p <$                |                  |      |      | --                 | --   | --   |                   |      |      |

Tabelle 55: Wirkung von Noradrenalin auf  $V_T$  (ml/kg)

## Gruppe 2 (n=8)

|                      | Vor Noradrenalin |      |      | Unter Noradrenalin |      |      | Nach Noradrenalin |      |      |
|----------------------|------------------|------|------|--------------------|------|------|-------------------|------|------|
| $\mu\text{E/kg/min}$ |                  |      |      | 0,1                | 0,2  | 0,4  |                   |      |      |
| Zeit (min)           | -65              | -35  | -15  | 15                 | 30   | 45   | 75                | 95   | 120  |
| $\bar{x}$            | 5,20             | 5,17 | 5,63 | 5,77               | 5,35 | 5,14 | 4,96              | 4,88 | 4,98 |
| $s_{xi}$             | 0,92             | 0,60 | 0,94 | 1,18               | 0,53 | 0,79 | 0,87              | 0,79 | 0,76 |
| $s_{\bar{x}}$        | 0,32             | 0,21 | 0,33 | 0,42               | 0,19 | 0,28 | 0,31              | 0,28 | 0,27 |
| $p <$                |                  |      |      | --                 | --   | --   |                   |      |      |

Tabelle 56: Wirkung von Noradrenalin auf  $\dot{V}_E$  (ml/kg/min)

## Gruppe 1 (n=8)

|                      | Vor Noradrenalin |     |     | Unter Noradrenalin |      |      | Nach Noradrenalin |     |     |
|----------------------|------------------|-----|-----|--------------------|------|------|-------------------|-----|-----|
| $\mu\text{E/kg/min}$ |                  |     |     | 0,1                | 0,2  | 0,4  |                   |     |     |
| Zeit(min)            | -50              | -30 | -10 | 15                 | 30   | 45   | 70                | 85  | 110 |
| Kind Nr.:            |                  |     |     |                    |      |      |                   |     |     |
| 3                    | 205              | 187 | 202 | 212                | 230  | 224  | 205               | 159 | 199 |
| 4                    | 207              | 222 | 234 | 249                | 264  | 302  | 227               | 200 | 214 |
| 5                    | 200              | 201 | 207 | 219                | 271  | 225  | 254               | 219 | 236 |
| 5                    | 223              | 232 | 217 | 221                | 262  | 289  | 221               | 201 | 196 |
| 6                    | 230              | 175 | 221 | 207                | 224  | 195  | 178               | 181 | 175 |
| 7                    | 239              | 268 | 211 | 259                | 257  | 297  | 251               | 239 | 251 |
| 8                    | 453              | 434 | 473 | 430                | 461  | 492  | 395               | 404 | 387 |
| 10                   | 170              | 156 | 135 | 159                | 177  | 159  | 198               | 191 | 198 |
| $\bar{x}$            | 241              | 234 | 237 | 244                | 268  | 273  | 241               | 224 | 232 |
| $s_{xi}$             | 88               | 88  | 100 | 81                 | 84   | 102  | 67                | 76  | 67  |
| $s_{\bar{x}}$        | 31               | 31  | 30  | 29                 | 29   | 36   | 24                | 27  | 24  |
| $p <$                |                  |     |     | --                 | 0,01 | 0,05 |                   |     |     |

Tabelle 57: Wirkung von Noradrenalin auf  $\dot{V}_E$  (ml/kg/min)

## Gruppe 2 (n=8)

| $\mu\text{g/kg/min}$ | Vor Noradrenalin |     |     | Unter Noradrenalin |     |     | Nach Noradrenalin |     |     |
|----------------------|------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|-------------------|-----|-----|
|                      |                  |     |     | 0,1                | 0,2 | 0,4 |                   |     |     |
| Zeit(min)            | -65              | -35 | -15 | 15                 | 30  | 45  | 75                | 95  | 120 |
| Kind Nr.:            |                  |     |     |                    |     |     |                   |     |     |
| 11                   | 323              | 261 | 336 | 323                | 358 | 368 | 265               | 306 | 285 |
| 15                   | 257              | 251 | 257 | 241                | 257 | 277 | 237               | 212 | 161 |
| 16                   | 286              | 361 | 334 | 374                | 356 | 405 | 295               | 361 | 317 |
| 17                   | 253              | 234 | 251 | 266                | 322 | 318 | 218               | 226 | 222 |
| 17                   | 226              | 228 | 239 | 247                | 289 | 322 | 167               | 239 | 203 |
| 19                   | 197              | 180 | 206 | 154                | 184 | 240 | 199               | 206 | 202 |
| 20                   | 186              | 169 | 183 | 214                | 238 | 257 | 197               | 227 | 172 |
| 21                   | 232              | 209 | 215 | 244                | 256 | 229 | 225               | 221 | 209 |
| $\bar{x}$            | 245              | 237 | 252 | 258                | 282 | 302 | 225               | 250 | 221 |
| $s_{xi}$             | 45               | 60  | 56  | 67                 | 61  | 63  | 40                | 55  | 54  |
| $s_{\bar{x}}$        | 16               | 21  | 20  | 24                 | 24  | 22  | 15                | 19  | 19  |
| $p <$                |                  |     |     | -- 0,05 0,01       |     |     |                   |     |     |

Tabelle 58: Wirkung von Noradrenalin auf  $V_D$  (ml/kg)

## Gruppe 1 (n=8)

| $\mu\text{g/kg/min}$ | Vor Noradrenalin |      |      | Unter Noradrenalin |      |      | Nach Noradrenalin |      |      |
|----------------------|------------------|------|------|--------------------|------|------|-------------------|------|------|
|                      |                  |      |      | 0,1                | 0,2  | 0,4  |                   |      |      |
| Zeit(min)            | -50              | -30  | -10  | 15                 | 30   | 45   | 70                | 85   | 110  |
| $\bar{x}$            | 1,04             | 1,08 | 1,09 | 0,93               | 0,92 | 1,02 | 1,09              | 1,02 | 1,03 |
| $s_{xi}$             | 0,47             | 0,46 | 0,44 | 0,57               | 0,43 | 0,39 | 0,51              | 0,41 | 0,46 |
| $s_{\bar{x}}$        | 0,17             | 0,16 | 0,16 | 0,2                | 0,15 | 0,14 | 0,18              | 0,14 | 0,16 |
| $p <$                |                  |      |      | --                 | --   | --   |                   |      |      |

Tabelle 59: Wirkung von Noradrenalin auf  $V_D$  (ml/kg)

## Gruppe 2 (n=8)

| $\mu\text{g/kg/min}$ | Vor Noradrenalin |      |      | Unter Noradrenalin |      |      | Nach Noradrenalin |      |      |
|----------------------|------------------|------|------|--------------------|------|------|-------------------|------|------|
|                      |                  |      |      | 0,1                | 0,2  | 0,4  |                   |      |      |
| Zeit(min)            | -65              | -35  | -15  | 15                 | 30   | 45   | 75                | 95   | 120  |
| $\bar{x}$            | 1,29             | 1,20 | 1,31 | 1,28               | 1,14 | 1,13 | 0,97              | 1,05 | 1,15 |
| $s_{xi}$             | 0,43             | 0,28 | 0,36 | 0,53               | 0,42 | 0,29 | 0,31              | 0,39 | 0,49 |
| $s_{\bar{x}}$        | 0,150,10         |      | 0,13 | 0,19               | 0,15 | 0,11 | 0,11              | 0,14 | 0,17 |
| $p <$                |                  |      |      | --                 | --   | --   |                   |      |      |

Tabelle 60: Wirkung von Noradrenalin auf  $\dot{V}_D$  (ml/kg/min)

| Gruppe 1 (n=8)       |      |      |                    |      |      |                   |      |      |      |
|----------------------|------|------|--------------------|------|------|-------------------|------|------|------|
| Vor Noradrenalin     |      |      | Unter Noradrenalin |      |      | Nach Noradrenalin |      |      |      |
| $\mu\text{g/kg/min}$ |      |      | 0,1                | 0,2  | 0,4  |                   |      |      |      |
| Zeit(min)            | -50  | -30  | -10                | 15   | 30   | 45                | 70   | 85   | 110  |
| $\bar{x}$            | 55,5 | 59,7 | 53,1               | 57,1 | 59,0 | 67,9              | 51,3 | 50,1 | 50,1 |
| $s_{xi}$             | 36,6 | 34,2 | 34,7               | 42,0 | 29,8 | 40,0              | 30,2 | 33,5 | 29,3 |
| $s_{\bar{x}}$        | 2,1  | 2,1  | 2,1                | 2,3  | 1,9  | 2,2               | 1,9  | 2,0  | 1,9  |
| $p <$                |      |      |                    | --   | --   | --                |      |      |      |

Tabelle 61: Wirkung von Noradrenalin auf  $\dot{V}_D$  (ml/kg/min)

| Gruppe 2 (n=8)       |      |      |                    |      |      |                   |      |      |      |
|----------------------|------|------|--------------------|------|------|-------------------|------|------|------|
| Vor Noradrenalin     |      |      | Unter Noradrenalin |      |      | Nach Noradrenalin |      |      |      |
| $\mu\text{g/kg/min}$ |      |      | 0,1                | 0,2  | 0,4  |                   |      |      |      |
| Zeit(min)            | -65  | -35  | -15                | 15   | 30   | 45                | 75   | 95   | 120  |
| $\bar{x}$            | 57,9 | 54,8 | 56,3               | 57,3 | 61,8 | 67,1              | 45,0 | 52,3 | 44,4 |
| $s_{xi}$             | 20,6 | 19,5 | 19,7               | 24,3 | 29,5 | 22,8              | 15,2 | 14,3 | 16,5 |
| $s_{\bar{x}}$        | 1,6  | 1,6  | 1,6                | 1,7  | 1,9  | 1,7               | 1,4  | 1,3  | 1,4  |
| $p <$                |      |      |                    | --   | --   | --                |      |      |      |

Tabelle 62: Wirkung von Noradrenalin auf  $V_D/V_T$ 

| Gruppe 1 (n=8)       |      |      |                    |      |      |                   |      |      |      |
|----------------------|------|------|--------------------|------|------|-------------------|------|------|------|
| Vor Noradrenalin     |      |      | Unter Noradrenalin |      |      | Nach Noradrenalin |      |      |      |
| $\mu\text{g/kg/min}$ |      |      | 0,1                | 0,2  | 0,4  |                   |      |      |      |
| Zeit(min)            | -50  | -30  | -10                | 15   | 30   | 45                | 70   | 85   | 110  |
| $\bar{x}$            | 0,23 | 0,25 | 0,26               | 0,23 | 0,22 | 0,24              | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| $s_{xi}$             | 0,05 | 0,05 | 0,06               | 0,06 | 0,06 | 0,04              | 0,06 | 0,07 | 0,06 |
| $s_{\bar{x}}$        | 0,02 | 0,02 | 0,02               | 0,02 | 0,02 | 0,01              | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| $p <$                |      |      |                    | --   | --   | --                |      |      |      |

Tabelle 63: Wirkung von Noradrenalin auf  $V_D/V_T$ 

| Gruppe 2 (n=8)       |      |      |                    |      |      |                   |      |      |      |
|----------------------|------|------|--------------------|------|------|-------------------|------|------|------|
| Vor Noradrenalin     |      |      | Unter Noradrenalin |      |      | Nach Noradrenalin |      |      |      |
| $\mu\text{g/kg/min}$ |      |      | 0,1                | 0,2  | 0,4  |                   |      |      |      |
| Zeit(min)            | -65  | -35  | -15                | 15   | 30   | 45                | 75   | 95   | 120  |
| $\bar{x}$            | 0,23 | 0,24 | 0,23               | 0,22 | 0,22 | 0,22              | 0,21 | 0,21 | 0,23 |
| $s_{xi}$             | 0,05 | 0,05 | 0,06               | 0,06 | 0,06 | 0,04              | 0,06 | 0,07 | 0,06 |
| $s_{\bar{x}}$        | 0,02 | 0,02 | 0,02               | 0,02 | 0,02 | 0,01              | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| $p <$                |      |      |                    | --   | --   | --                |      |      |      |

Tabelle 64: Wirkung von Noradrenalin auf  $\dot{V}_A$  (ml/kg/min)

Gruppe 1 (n=5)

|                      | Vor Noradrenalin |     |     | Unter Noradrenalin |     |     | Nach Noradrenalin |     |     |
|----------------------|------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|-------------------|-----|-----|
| $\mu\text{g/kg/min}$ |                  |     |     | 0,1                | 0,2 | 0,4 |                   |     |     |
| Zeit(min)-50         | -30              | -10 |     | 15                 | 30  | 45  | 70                | 85  | 110 |
| $\bar{x}$            | 186              | 173 | 180 | 187                | 202 | 205 | 186               | 181 | 179 |
| $s_{xi}$             | 62               | 59  | 69  | 51                 | 39  | 66  | 44                | 48  | 45  |
| $s_{\bar{x}}$        | 22               | 21  | 24  | 18                 | 14  | 23  | 15                | 17  | 16  |
| $p <$                |                  |     |     | --                 | --  | --  |                   |     |     |

Tabelle 65: Wirkung von Noradrenalin auf  $\dot{V}_A$  (ml/kg/min)

Gruppe 2 (n=8)

|                      | Vor Noradrenalin |     |     | Unter Noradrenalin |     |      | Nach Noradrenalin |     |     |
|----------------------|------------------|-----|-----|--------------------|-----|------|-------------------|-----|-----|
| $\mu\text{g/kg/min}$ |                  |     |     | 0,1                | 0,2 | 0,4  |                   |     |     |
| Zeit(min)-65         | -35              | -15 |     | 15                 | 30  | 45   | 75                | 95  | 120 |
| $\bar{x}$            | 198              | 192 | 198 | 201                | 221 | 235  | 189               | 197 | 172 |
| $s_{xi}$             | 55               | 66  | 64  | 48                 | 51  | 59   | 50                | 53  | 40  |
| $s_{\bar{x}}$        | 19               | 23  | 22  | 17                 | 18  | 21   | 18                | 19  | 14  |
| $p <$                |                  |     |     | --                 | --  | 0,05 |                   |     |     |

Tabelle 66: Wirkung von Noradrenalin auf  $\dot{V}_{Aphys}$  (ml/kg/min)

Gruppe 1 (n=7)

|                      | Vor Noradrenalin |     |  | Unter Noradrenalin |     |     | Nach Noradrenalin |     |     |
|----------------------|------------------|-----|--|--------------------|-----|-----|-------------------|-----|-----|
| $\mu\text{g/kg/min}$ |                  |     |  | 0,1                | 0,2 | 0,4 |                   |     |     |
| Zeit(min)-50         | -30              | -10 |  | 15                 | 30  | 45  | 70                | 85  | 110 |
| $\bar{x}$            | 145              | 153 |  | 160                | 155 | 179 | 157               | 155 |     |
| $s_{xi}$             | 46               | 54  |  | 51                 | 43  | 48  | 37                | 35  |     |
| $s_{\bar{x}}$        | 17               | 20  |  | 19                 | 16  | 18  | 14                | 13  |     |
| $p <$                |                  |     |  | --                 | --  | --  |                   |     |     |

Tabelle 67: Wirkung von Noradrenalin auf  $V_{Dphys}$  (ml/kg)

Gruppe 1 (n=7)

|                      | Vor Noradrenalin |      |  | Unter Noradrenalin |      |      | Nach Noradrenalin |      |     |
|----------------------|------------------|------|--|--------------------|------|------|-------------------|------|-----|
| $\mu\text{g/kg/min}$ |                  |      |  | 0,1                | 0,2  | 0,4  |                   |      |     |
| Zeit(min)-50         | -30              | -10  |  | 15                 | 30   | 45   | 70                | 85   | 110 |
| $\bar{x}$            | 2,42             | 2,44 |  | 2,30               | 2,22 | 2,16 | 2,06              | 2,11 |     |
| $s_{xi}$             | 0,75             | 0,79 |  | 0,86               | 0,69 | 0,78 | 0,88              | 0,95 |     |
| $s_{\bar{x}}$        | 0,28             | 0,30 |  | 0,33               | 0,26 | 0,30 | 0,33              | 0,36 |     |
| $p <$                |                  |      |  | --                 | --   | --   |                   |      |     |

Tabelle 68: Wirkung von Noradrenalin auf  $\dot{V}_{Dphys}/\dot{V}_T$ 

## Gruppe I (n = 7)

| Vor Noradrenalin     |     |       | Unter Noradrenalin |       |       | Nach Noradrenalin |       |       |     |
|----------------------|-----|-------|--------------------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-----|
| $\mu\text{g/kg/min}$ |     |       | 0,1                | 0,2   | 0,4   |                   |       |       |     |
| Zeit(min)            | -50 | -30   | -10                | 15    | 30    | 45                | 70    | 85    | 110 |
| $\bar{x}$            |     | 0,470 | 0,476              | 0,460 | 0,479 | 0,436             | 0,422 | 0,423 |     |
| $s_{xi}$             |     | 0,129 | 0,104              | 0,125 | 0,127 | 0,108             | 0,179 | 0,153 |     |
| $s_{\bar{x}}$        |     | 0,049 | 0,039              | 0,047 | 0,048 | 0,041             | 0,068 | 0,058 |     |
| p<                   |     |       |                    | --    | --    | --                |       |       |     |

Tabelle 69: Wirkung von Noradrenalin auf  $\dot{V}_{Aphys}/\dot{V}_{O_2}$ 

## Gruppe 1 (n = 7)

| Vor Noradrenalin Unter Noradrenalin |     |      |      |      |      | Nach Noradrenalin |      |      |     |
|-------------------------------------|-----|------|------|------|------|-------------------|------|------|-----|
| $\mu\text{g/kg/min}$                |     |      |      | 0,1  | 0,2  | 0,4               |      |      |     |
| Zeit(min)                           | -50 | -30  | -10  | 15   | 30   | 45                | 70   | 85   | 110 |
| $\bar{x}$                           |     | 16,6 | 15,4 | 17,0 | 17,7 | 18,2              | 19,6 | 18,8 |     |
| $s_{x1}$                            |     | 4,61 | 3,86 | 6,03 | 5,57 | 5,03              | 4,96 | 5,18 |     |
| $s_{\bar{x}}$                       |     | 1,74 | 1,46 | 2,27 | 2,11 | 1,90              | 1,88 | 1,95 |     |
| $p <$                               |     |      |      | --   | --   | 0,05              |      |      |     |

Tabelle 70: Wirkung von Noradrenalin auf  $\dot{V}_{O_2}$  (ml/kg/min)

## Gruppe 1 (n = 8)

| Vor Noradrenalin     |       |       |       | Unter Noradrenalin |       |       | Nach Noradrenalin |       |       |
|----------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-------------------|-------|-------|
| $\mu\text{g/kg/min}$ |       |       |       | 0,1                | 0,2   | 0,4   |                   |       |       |
| Zeit(min)            | -50   | -30   | -10   | 15                 | 30    | 45    | 70                | 85    | 110   |
| Kind Nr.:            |       |       |       |                    |       |       |                   |       |       |
| 3                    | 7,78  | 6,29  | 5,56  | 8,11               | 20,15 | 11,37 | 8,71              | 6,06  | 3,75  |
| 4                    | 6,18  | 7,11  | 9,44  | 8,92               | 9,08  | 12,63 | 8,16              | 7,47  | 7,81  |
| 5                    | 6,42  | 7,12  | 7,79  | 7,02               | 8,05  | 8,65  | 9,33              | 6,49  | 7,91  |
|                      | 7,65  | 8,60  | 6,69  | 8,42               | 9,81  | 12,04 | 8,33              | 7,78  | 8,93  |
| 6                    | 10,32 | 8,90  | 9,61  | 9,58               | 11,59 | 10,58 | 7,25              | 9,33  | 8,29  |
| 7                    | 15,63 | 17,09 | 12,17 | 17,93              | 15,90 | 18,00 | 13,34             | 15,55 | 13,81 |
| 8                    | 8,76  | 12,61 | 10,68 | 8,89               | 9,89  | 10,91 | 10,17             | 9,47  | 9,82  |
| 10                   | 5,64  | 6,27  | 5,80  | 5,19               | 10,86 | 11,67 | 3,70              | 6,62  | 5,16  |
| $\bar{x}$            | 8,55  | 9,25  | 8,49  | 9,26               | 11,92 | 11,98 | 8,62              | 8,60  | 8,19  |
| $s_{xi}$             | 3,24  | 3,78  | 2,39  | 3,76               | 4,08  | 2,71  | 2,71              | 3,08  | 3,02  |
| $s_{\bar{x}}$        | 1,15  | 1,34  | 0,85  | 1,40               | 1,44  | 0,96  | 0,96              | 1,09  | 1,07  |
| $p <$                |       |       |       | --                 | 0,02  | 0,01  |                   |       |       |

Tabelle 71: Wirkung von Noradrenalin auf  $\dot{V}_{O_2}$  (ml/kg/min)

| Gruppe 2 (n = 8)     |                  |      |       |                    |       |       |                   |       |       |
|----------------------|------------------|------|-------|--------------------|-------|-------|-------------------|-------|-------|
| $\mu\text{g/kg/min}$ | Vor Noradrenalin |      |       | Unter Noradrenalin |       |       | Nach Noradrenalin |       |       |
|                      |                  |      |       | 0,1                | 0,2   | 0,4   |                   |       |       |
| Zeit(min)            | -65              | -35  | -15   | 15                 | 30    | 45    | 75                | 95    | 120   |
| Kind Nr.:            |                  |      |       |                    |       |       |                   |       |       |
| 11                   | 11,35            | 8,46 | 12,34 | 12,13              | 11,10 | 11,40 | 9,26              | 8,81  | 9,72  |
| 15                   | 9,36             | 6,77 | 7,47  | 9,09               | 9,49  | 10,32 | 10,21             | 6,50  | 6,60  |
| 16                   | 8,24             | 8,23 | 10,13 | 7,41               | 10,85 | 8,02  | 8,93              | 9,56  | 6,02  |
| 17                   | 7,12             | 6,49 | 6,11  | 6,87               | 7,05  | 8,48  | 4,84              | 6,80  | 5,82  |
| 17                   | 3,87             | 7,85 | 7,46  | 7,96               | 7,29  | 7,73  | 4,94              | 6,17  | 5,55  |
| 19                   | 6,15             | 6,12 | 8,43  | 6,63               | 8,01  | 9,48  | 7,15              | 7,00  | 7,07  |
| 20                   | 8,02             | 7,05 | 8,55  | 8,44               | 16,12 | 9,22  | 8,22              | 8,51  | 7,10  |
| 21                   | 5,59             | 9,16 | 9,86  | 9,88               | 11,14 | 10,62 | 11,47             | 11,76 | 10,56 |
| $\bar{x}$            | 7,96             | 7,52 | 8,79  | 8,55               | 10,13 | 9,41  | 8,13              | 8,14  | 7,31  |
| $s_{\bar{x}}$        | 2,30             | 1,07 | 1,94  | 1,81               | 2,95  | 1,30  | 2,37              | 1,90  | 1,85  |
| $s_{\bar{x}}$        | 0,81             | 0,38 | 0,69  | 0,64               | 1,05  | 0,46  | 0,84              | 0,67  | 0,66  |
| p <                  |                  |      |       | --                 | 0,01  | 0,02  |                   |       |       |

Tabelle 72: Wirkung von Noradrenalin auf  $\dot{V}_{CO_2}$  (ml/kg/min)

| Gruppe 1 (n = 8)     |                  |      |      |                    |      |       |                   |      |      |
|----------------------|------------------|------|------|--------------------|------|-------|-------------------|------|------|
| $\mu\text{g/kg/min}$ | Vor Noradrenalin |      |      | Unter Noradrenalin |      |       | Nach Noradrenalin |      |      |
|                      |                  |      |      | 0,1                | 0,2  | 0,4   |                   |      |      |
| Zeit(min)            | -50              | -30  | -10  | 15                 | 30   | 45    | 70                | 85   | 110  |
| Kind Nr.:            |                  |      |      |                    |      |       |                   |      |      |
| 3                    | 6,51             | 6,09 | 6,99 | 7,26               | 7,38 | 7,65  | 7,01              | 5,54 | 6,95 |
| 4                    | 5,95             | 6,70 | 7,31 | 7,26               | 7,35 | 9,34  | 7,21              | 7,00 | 7,10 |
| 5                    | 6,20             | 6,25 | 6,86 | 6,87               | 9,09 | 7,45  | 8,31              | 6,07 | 7,19 |
| 5                    | 7,41             | 7,56 | 6,26 | 7,24               | 8,28 | 9,20  | 7,27              | 6,84 | 6,33 |
| 6                    | 8,21             | 5,99 | 7,56 | 6,78               | 8,26 | 7,09  | 5,26              | 5,11 | 5,18 |
| 7                    | 8,21             | 8,62 | 6,17 | 8,38               | 8,40 | 9,04  | 6,27              | 7,34 | 6,38 |
| 8                    | 8,75             | 9,89 | 9,32 | 8,92               | 9,23 | 10,65 | 9,29              | 9,01 | 9,15 |
| 10                   | 4,63             | 4,69 | 3,89 | 4,61               | 6,54 | 5,91  | 7,00              | 7,14 | 7,07 |
| $\bar{x}$            | 6,98             | 6,97 | 6,80 | 7,17               | 8,07 | 8,29  | 7,20              | 6,76 | 6,92 |
| $s_{\bar{x}}$        | 1,40             | 1,65 | 1,53 | 1,27               | 0,92 | 1,53  | 1,21              | 1,21 | 1,12 |
| $s_{\bar{x}}$        | 0,50             | 0,59 | 0,54 | 0,45               | 0,33 | 0,54  | 0,43              | 0,43 | 0,40 |
| p <                  |                  |      |      | --                 | 0,02 | 0,01  |                   |      |      |

Tabelle 74: Wirkung von Noradrenalin auf  $\dot{V}_{CO_2}$  (ml/kg/min)

| Gruppe 2 (n=8)       |      |      |                    |      |      |                   |      |      |      |
|----------------------|------|------|--------------------|------|------|-------------------|------|------|------|
| Vor Noradrenalin     |      |      | Unter Noradrenalin |      |      | Nach Noradrenalin |      |      |      |
| $\mu\text{g/kg/min}$ |      |      | 0,1                | 0,2  | 0,4  |                   |      |      |      |
| Zeit(min)-65         | -35  | -15  | 15                 | 30   | 45   | 75                | 95   | 120  |      |
| Kind Nr.:            |      |      |                    |      |      |                   |      |      |      |
| 11                   | 8,82 | 7,07 | 8,87               | 8,05 | 8,72 | 8,85              | 6,21 | 6,81 | 6,50 |
| 15                   | 8,12 | 7,93 | 8,16               | 8,65 | 9,99 | 9,57              | 7,66 | 6,54 | 5,80 |
| 16                   | 6,37 | 8,64 | 9,01               | 9,58 | 8,05 | 9,75              | 8,44 | 9,13 | 7,63 |
| 17                   | 5,77 | 6,19 | 5,95               | 6,12 | 7,20 | 7,70              | 4,13 | 6,34 | 5,23 |
| 17                   | 4,45 | 5,11 | 5,98               | 6,28 | 7,56 | 7,41              | 4,61 | 4,93 | 4,77 |
| 19                   | 5,29 | 5,26 | 6,45               | 5,70 | 5,83 | 8,11              | 6,57 | 6,58 | 6,57 |
| 20                   | 6,47 | 5,93 | 6,35               | 7,69 | 8,67 | 8,40              | 6,98 | 7,46 | 5,86 |
| 21                   | 6,99 | 6,74 | 7,15               | 8,34 | 8,58 | 8,09              | 7,54 | 7,78 | 7,28 |
| $\bar{x}$            | 6,54 | 6,61 | 7,24               | 7,55 | 8,08 | 8,46              | 6,52 | 6,95 | 6,22 |
| $s_{xi}$             | 1,44 | 1,24 | 1,27               | 1,38 | 1,24 | 0,81              | 1,50 | 1,22 | 0,97 |
| $s_{\bar{x}}$        | 0,51 | 0,44 | 0,45               | 0,49 | 0,44 | 0,29              | 0,53 | 0,43 | 0,34 |
| $p <$                |      |      |                    | 0,02 | 0,01 | 0,01              |      |      |      |

Tabelle 75: Wirkung von Noradrenalin auf RQ

| Gruppe 1 (n=8)       |      |      |                    |      |      |                   |      |      |      |
|----------------------|------|------|--------------------|------|------|-------------------|------|------|------|
| Vor Noradrenalin     |      |      | Unter Noradrenalin |      |      | Nach Noradrenalin |      |      |      |
| $\mu\text{g/kg/min}$ |      |      | 0,1                | 0,2  | 0,4  |                   |      |      |      |
| Zeit(min)-50         | -30  | -10  | 15                 | 30   | 45   | 70                | 85   | 110  |      |
| $\bar{x}$            | 0,85 | 0,90 | 0,85               | 0,82 | 0,79 | 0,76              | 0,87 | 0,84 | 0,82 |
| $s_{xi}$             | 0,39 | 0,56 | 0,47               | 0,41 | 0,43 | 0,38              | 0,52 | 0,49 | 0,45 |
| $s_{\bar{x}}$        | 0,14 | 0,20 | 0,17               | 0,15 | 0,15 | 0,13              | 0,19 | 0,17 | 0,16 |
| $p <$                |      |      |                    | --   | --   | --                |      |      |      |

Tabelle 76: Wirkung von Noradrenalin auf RQ

| Gruppe 2 (n=8)       |      |      |                    |      |      |                   |      |      |      |
|----------------------|------|------|--------------------|------|------|-------------------|------|------|------|
| Vor Noradrenalin     |      |      | Unter Noradrenalin |      |      | Nach Noradrenalin |      |      |      |
| $\mu\text{g/kg/min}$ |      |      | 0,1                | 0,2  | 0,4  |                   |      |      |      |
| Zeit(min)-65         | -35  | -15  | 15                 | 30   | 45   | 75                | 95   | 120  |      |
| $\bar{x}$            | 0,84 | 0,88 | 0,82               | 0,90 | 0,89 | 0,91              | 0,82 | 0,85 | 0,89 |
| $s_{xi}$             | 0,36 | 0,41 | 0,40               | 0,43 | 0,48 | 0,37              | 0,33 | 0,35 | 0,42 |
| $s_{\bar{x}}$        | 0,13 | 0,15 | 0,14               | 0,15 | 0,17 | 0,13              | 0,12 | 0,12 | 0,15 |
| $p <$                |      |      |                    | --   | --   | --                |      |      |      |

Tabelle 77: Wirkung von Noradrenalin auf f

(1/min)

## Gruppe 1 (n=8)

| $\mu\text{g/kg/min}$ | Vor Noradrenalin |     |     | Unter Noradrenalin |     |     | Nach Noradrenalin |     |     |
|----------------------|------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|-------------------|-----|-----|
|                      |                  |     |     | 0,1                | 0,2 | 0,4 |                   |     |     |
| Zeit(min)            | -50              | -30 | -10 | 15                 | 30  | 45  | 70                | 85  | 110 |
| Kind Nr.:            |                  |     |     |                    |     |     |                   |     |     |
| 3                    | 136              | 142 | 136 | 120                | 120 | 120 | 152               | 140 | 148 |
| 4                    | 114              | 132 | 120 | 108                | 126 | 117 | 126               | 126 | 120 |
| 5                    | 124              | 124 | 136 | 120                | 120 | 144 | 148               | 140 | 140 |
| 5                    | 136              | 132 | 132 | 132                | 140 | 140 | 148               | 144 | 146 |
| 6                    | 108              | 104 | 108 | 100                | 112 | 112 | 122               | 132 | 134 |
| 7                    | 142              | 140 | 125 | 125                | 102 | 96  | 126               | 120 | 120 |
| 8                    | 162              | 162 | 160 | 160                | 160 | 148 | 152               | 148 | 150 |
| 10                   | 131              | 132 | 128 | 125                | 108 | 104 | 130               | 130 | 130 |
| $\bar{x}$            | 132              | 134 | 131 | 124                | 125 | 123 | 138               | 135 | 136 |
| $s_{xi}$             | 17               | 16  | 15  | 18                 | 19  | 19  | 13                | 10  | 12  |
| $s_{\bar{x}}$        | 5,9              | 5,8 | 5,3 | 6,3                | 6,6 | 6,8 | 4,6               | 3,4 | 4,3 |
| $p <$                |                  |     |     | 0,01               | --  | --  |                   |     |     |

Tabelle 78: Wirkung von Noradrenalin auf f

(1/min)

## Gruppe 2 (n=8)

| $\mu\text{g/kg/min}$ | Vor Noradrenalin |     |     | Unter Noradrenalin |      |      | Nach Noradrenalin |     |     |
|----------------------|------------------|-----|-----|--------------------|------|------|-------------------|-----|-----|
|                      |                  |     |     | 0,1                | 0,2  | 0,4  |                   |     |     |
| Zeit(min)            | -65              | -35 | -15 | 15                 | 30   | 45   | 75                | 95  | 120 |
| Kind Nr.:            |                  |     |     |                    |      |      |                   |     |     |
| 11                   | 114              | 130 | 124 | 114                | 112  | 120  | 124               | 124 | 124 |
| 15                   | 116              | 124 | 116 | 108                | 108  | 106  | 120               | 120 | 120 |
| 16                   | 140              | 140 | 140 | 141                | 126  | 136  | 135               | 129 | 135 |
| 17                   | 168              | 168 | 160 | 156                | 156  | 156  | 152               | 152 | 152 |
| 17                   | 140              | 146 | 150 | 132                | 134  | 136  | 142               | 136 | 149 |
| 19                   | 104              | 104 | 120 | 108                | 104  | 104  | 112               | 112 | 112 |
| 20                   | 148              | 148 | 148 | 136                | 130  | 128  | 124               | 136 | 112 |
| 21                   | 132              | 128 | 128 | 140                | 128  | 116  | 124               | 124 | 120 |
| $\bar{x}$            | 133              | 136 | 136 | 129                | 125  | 125  | 129               | 132 | 128 |
| $s_{xi}$             | 21               | 19  | 16  | 18                 | 17   | 17   | 13                | 15  | 16  |
| $s_{\bar{x}}$        | 10               | 6,7 | 5,7 | 6,2                | 5,9  | 6,2  | 4,6               | 5,5 | 5,5 |
| $p <$                |                  |     |     | --                 | 0,01 | 0,01 |                   |     |     |

Tabelle 79: Wirkung von Noradrenalin auf SV

(ml/kg)

## Gruppe 1 (n=7)

| Vor Noradrenalin     |     |      | Unter Noradrenalin |      |      | Nach Noradrenalin |      |      |     |
|----------------------|-----|------|--------------------|------|------|-------------------|------|------|-----|
| $\mu\text{g/kg/min}$ |     |      |                    | 0,1  | 0,2  | 0,4               |      |      |     |
| Zeit(min)            | -50 | -30  | -10                | 15   | 30   | 45                | 70   | 85   | 110 |
| $\bar{x}$            |     | 1,72 | 1,77               | 1,77 | 1,94 | 2,17              | 1,86 | 1,75 |     |
| $s_{xi}$             |     | 0,58 | 0,44               | 0,78 | 0,86 | 1,10              | 0,58 | 0,61 |     |
| $s_{\bar{x}}$        |     | 0,22 | 0,16               | 0,30 | 0,33 | 0,41              | 0,22 | 0,23 |     |
| p<                   |     |      |                    | --   | --   | --                |      |      |     |

Tabelle 80: Wirkung von Noradrenalin auf HMV

(ml/kg/min)

## Gruppe 1 (n = 7)

| Vor Noradrenalin     |     |     | Unter Noradrenalin |     |     | Nach Noradrenalin |     |     |     |
|----------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|-------------------|-----|-----|-----|
| $\mu\text{g/kg/min}$ |     |     |                    | 0,1 | 0,2 | 0,4               |     |     |     |
| Zeit(min)            | -50 | -30 | -10                | 15  | 30  | 45                | 70  | 85  | 110 |
| $\bar{x}$            |     | 224 | 239                | 239 | 231 | 259               | 230 | 222 |     |
| $s_{xi}$             |     | 66  | 68                 | 97  | 73  | 94                | 49  | 77  |     |
| $s_{\bar{x}}$        |     | 25  | 26                 | 37  | 28  | 36                | 19  | 29  |     |
| p<                   |     |     |                    | --  | --  | --                |     |     |     |

Tabelle 81: Wirkung von Noradrenalin auf TPR (dyn · sec · kg · cm<sup>-5</sup>)

## Gruppe 1 (n = 7)

| Vor Noradrenalin     |     |       |       | Unter Noradrenalin |       |       | Nach Noradrenalin |       |     |
|----------------------|-----|-------|-------|--------------------|-------|-------|-------------------|-------|-----|
| $\mu\text{g/kg/min}$ |     |       |       | 0,1                | 0,2   | 0,4   |                   |       |     |
| Zeit(min)            | -50 | -30   | -10   | 15                 | 30    | 45    | 70                | 85    | 110 |
| $\bar{x}$            |     | 20063 | 18170 | 18918              | 22115 | 22398 | 19226             | 17129 |     |
| $s_{xi}$             |     | 3690  | 4030  | 5630               | 8167  | 5184  | 3178              | 2569  |     |
| $s_{\bar{x}}$        |     | 1507  | 1645  | 2298               | 3334  | 2116  | 1297              | 1049  |     |
| p <                  |     |       |       | --                 | --    | --    |                   |       |     |

Tabelle 82: Wirkung von Noradrenalin auf AaDCO<sub>2</sub> (Torr)

## Gruppe 1 (n = 7)

| Vor Noradrenalin     |     |      | Unter Noradrenalin |      |      | Nach Noradrenalin |     |     |     |
|----------------------|-----|------|--------------------|------|------|-------------------|-----|-----|-----|
| $\mu\text{g/kg/min}$ |     |      | 0,1                | 0,2  | 0,4  |                   |     |     |     |
| Zeit(min)            | -50 | -30  | -10                | 15   | 30   | 45                | 70  | 85  | 110 |
| $\bar{x}$            |     | 10,6 | 10,5               | 10,9 | 10,5 | 12,7              | 9,5 | 9,0 |     |
| $s_{x1}$             |     | 4,3  | 4,1                | 4,9  | 5,9  | 5,2               | 6,0 | 4,9 |     |
| $s_{\bar{x}}$        |     | 1,6  | 1,5                | 1,9  | 2,2  | 2,0               | 2,2 | 1,9 |     |
| p<                   |     |      |                    | --   | --   | --                |     |     |     |

Tabelle 83: Wirkung von Noradrenalin auf die rektale Temperatur ( $^{\circ}\text{C}$ )

Gruppe 1 (n = 8)

| $\mu\text{g/kg/min}$ | Vor Noradrenalin |       |       | Unter Noradrenalin |       |       | Nach Noradrenalin |       |       |
|----------------------|------------------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-------------------|-------|-------|
|                      |                  |       |       | 0,1                | 0,2   | 0,4   |                   |       |       |
| Zeit(min)            | -50              | -30   | -10   | 15                 | 30    | 45    | 70                | 85    | 110   |
| $\bar{x}$            | 36,90            | 36,84 | 36,74 | 36,88              | 36,96 | 37,01 | 36,94             | 36,90 | 37,00 |
| $s_{xi}$             | 0,63             | 0,57  | 0,67  | 0,55               | 0,57  | 0,60  | 0,65              | 0,57  | 0,44  |
| $s_{\bar{x}}$        | 0,14             | 0,12  | 0,16  | 0,11               | 0,12  | 0,13  | 0,15              | 0,12  | 0,07  |
| p<                   |                  |       |       | --                 | 0,05  | 0,05  |                   |       |       |

Tabelle 84: Wirkung von Noradrenalin auf die rektale Temperatur ( $^{\circ}\text{C}$ )

Gruppe 2 (n = 7)

| $\mu\text{g/kg/min}$ | Vor Noradrenalin |       |       | Unter Noradrenalin |       |       | Nach Noradrenalin |       |       |
|----------------------|------------------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-------------------|-------|-------|
|                      |                  |       |       | 0,1                | 0,2   | 0,4   |                   |       |       |
| Zeit(min)            | -65              | -35   | -15   | 15                 | 30    | 45    | 75                | 95    | 120   |
| $\bar{x}$            | 36,81            | 36,81 | 36,80 | 36,86              | 36,95 | 37,00 | 36,91             | 36,89 | 36,85 |
| $s_{xi}$             | 0,70             | 0,69  | 0,68  | 0,65               | 0,65  | 0,70  | 0,74              | 0,75  | 0,74  |
| $s_{\bar{x}}$        | 0,19             | 0,18  | 0,17  | 0,16               | 0,16  | 0,19  | 0,21              | 0,21  | 0,21  |
| p<                   |                  |       |       | --                 | 0,02  | 0,02  |                   |       |       |

## Lebenslauf

Geboren am 20.7.1947 als zweites Kind der Eheleute Seraphin und Maria Kramer.

Ab Herbst 1953 Besuch der Volksschule Walchstadt/Steinebach.

1958 Übertritt in die Oberrealschule der Maristen in Mindelheim.

Juni 1967 Abitur in Mindelheim; anschließend Bewerbung für einen Studienplatz für Humanmedizin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.

Oktober 1967 Beginn des Medizinstudiums an der Universität München.

Mai 1971 Beginn des experimentellen Teils der Promotionsarbeit unter Leitung von Prof. Riegel an der Universitätskinderklinik München.

Juni 1973 Hochzeit mit der Stud. phil. Christine Jordan.

Dezember 1973 Staatsexamen abgeschlossen.

Januar 1974 Beginn der Medizinalassistentenzeit: Stationen: Dermatologische Universitätsklinik München, Chirurgische Privatklinik Dr. Wohlfahrt, Gräfelfing, I. Medizinische Universitätsklinik München.

Januar 1975 Approbation; Übernahme durch die Universität München als Verwalter einer wissenschaftlichen Assistentenstelle; November 1975 Einberufung zur Ableistung des Grundwehrdienstes.

1. The first part of the report deals with the general situation of the country.

2. The second part of the report deals with the economic situation of the country.

3. The third part of the report deals with the social situation of the country.

4. The fourth part of the report deals with the political situation of the country.

5. The fifth part of the report deals with the cultural situation of the country.

6. The sixth part of the report deals with the international situation of the country.

7. The seventh part of the report deals with the future prospects of the country.

8. The eighth part of the report deals with the conclusions of the report.

9. The ninth part of the report deals with the recommendations of the report.

10. The tenth part of the report deals with the annexes of the report.

11. The eleventh part of the report deals with the bibliography of the report.

12. The twelfth part of the report deals with the index of the report.

13. The thirteenth part of the report deals with the list of figures of the report.

14. The fourteenth part of the report deals with the list of tables of the report.

15. The fifteenth part of the report deals with the list of maps of the report.

16. The sixteenth part of the report deals with the list of abbreviations of the report.

17. The seventeenth part of the report deals with the list of symbols of the report.

18. The eighteenth part of the report deals with the list of units of the report.

19. The nineteenth part of the report deals with the list of dates of the report.

20. The twentieth part of the report deals with the list of names of the report.

21. The twenty-first part of the report deals with the list of places of the report.

22. The twenty-second part of the report deals with the list of events of the report.

23. The twenty-third part of the report deals with the list of persons of the report.

24. The twenty-fourth part of the report deals with the list of organizations of the report.

25. The twenty-fifth part of the report deals with the list of institutions of the report.

26. The twenty-sixth part of the report deals with the list of departments of the report.

27. The twenty-seventh part of the report deals with the list of ministries of the report.

28. The twenty-eighth part of the report deals with the list of agencies of the report.

29. The twenty-ninth part of the report deals with the list of committees of the report.

30. The thirtieth part of the report deals with the list of commissions of the report.

31. The thirty-first part of the report deals with the list of councils of the report.

32. The thirty-second part of the report deals with the list of boards of the report.

33. The thirty-third part of the report deals with the list of committees of the report.

34. The thirty-fourth part of the report deals with the list of commissions of the report.

35. The thirty-fifth part of the report deals with the list of councils of the report.

36. The thirty-sixth part of the report deals with the list of boards of the report.

37. The thirty-seventh part of the report deals with the list of committees of the report.

38. The thirty-eighth part of the report deals with the list of commissions of the report.

39. The thirty-ninth part of the report deals with the list of councils of the report.

40. The fortieth part of the report deals with the list of boards of the report.

41. The forty-first part of the report deals with the list of committees of the report.

42. The forty-second part of the report deals with the list of commissions of the report.

43. The forty-third part of the report deals with the list of councils of the report.



